

5a

MED. 914

85-3-24

R. 200. 481

COMMENTA
RIA IN LIBROS GALE
NI DE DIFFERENTIA
FEBRIVM.


616-002.79

AVTHORE FRANCISCO VAL

G 14 C

lesio Couarrubiano, doctore medico, pri-
marioq; medicæ facultatis in Com-
plutensi Academia
professore.
(?)

R



CVM PRIVILEGIO.

COMPLVTI.

Apud Andream de Angulo.

1562.



Soy de la Librería
del Colegio
de la Concepcion
de Alcalá.

EL REY.



OR quanto por parte de vos el doctor Francisco de Valles Cathedratico de prima en la facultad de medicina, de la vniuersidad de la villa de Alcala de Henares, nos fue hecha relacion, diziẽdo que vos auays hecho dos libros de Medicina intitulos, Cõmentaria in libros Hippocrates de Ratione victus, in morbis acutis, y Cõmentaria in libros Galeni de Differẽcia febrũ, y porq̃ e rã muy vtil y necessarios: nos suplicastes os mã dasemos dar licencia y facultad para q̃ los pudiesdes imprimir, y priuilegio para q̃ por tiẽ po de veynte años, ninguna otra persona los pudiesse imprimir ni vèder, o como la nra merced fuesse. Lo qual visto por los del nuestro cõsejo, y en los dichos libros se hizo la diligẽcia q̃ la pragmatica por nos agora nueuamente fecha dispone, fue acordado q̃ deuiamos mã dar esta nuestra cedula para vos en la dicha razon, y nos tuuimos lo por bien: y por la presente os damos licencia y facultad, para que vos o quien vuestro poder ouiere, podays imprimir los dichos libros q̃ de suso se haze minciõ y para que por tiempo de diez años primeros siguientes, que corren y se quentã desde el dia de la data desta nuestra cedula en adelante vos el dicho doctor Francisco de Valles, o la per-

sona q̄ el dicho vuestro poder ouiere, podays
vender el dicho libro: y mandamos que perso
na alguna sin vuestra licencia, durate el dicho
tiempo de los dichos diez años, no lo pueda
imprimir ni vender, sopena de perder todos
los libros que vuerẽ impresso: y mas de, veyn
te mil marauedis, para la nuestra camara. Y
mãdamos que despues de impresso no se pue
da vender ni vendã sin que primero se trayga
al nuestro consejo, juntamente conel original
que enel fue visto: que vã rubricado y firma
do al fin, de Iuan de la Vega, nuestro escriua
no de camara, de los que enel nuestro conse
jo residen, para que se vea si la dicha impres
sion esta conforme al original, y se tase el pre
cio a que se ouiere de vender cada volumen:
sopena de caer e incurrir en las penas conte
nidas en la dicha pragmatica, y leyes de estos
reynos. Y mandamos a los del nuestro conse
jo Presidente y oydores delas nuestras audien
cias, alcaldes, alguaziles de la nuestra casa y
corte y chancillerias, y a todos los corregido
res, asistente gouernadores, alcaldes mayo
res y ordinarios, y otros juezes y justicias qua
lesquier, de todas las ciudades, villas y luga
res de los nuestros reynos y señorios, y a cada
vno y qualquier dellos: anũ a los que agora son
como a los que seran de aqui adelante, que os
guarden y cumplan esta nuestra cedula ymer
ced

ced, que así os hazemos, y contra el tenor y
forma della no vayan ni passén, ni consientan
yr ni passar por alguna manera. Sopena de
la nuestra merced, y de cinquenta mil mara-
uedis para la nuestra camara. Dada en el Escu-
rial a. 11. dias del mes de Março, de mil y qui-
nientos y sesenta y nueue años.

YO EL REY.

Por mandado de su Magestad.

Antonio de Erasso.

A 3 CAPVT

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
CAPVT PRIMVM.



Propriissima & precipua febrivm differentia secundum illarum essentiam sunt, alia vero secundum accidentium aliquod.

Quoniam autem & ipsorum accidentium non una est natura, sed alia quidem sunt propinquiora, atque ei quae diuiditur essentia magis propria, alia vero remotiora, magisque aliena: idcirco & earum quae hinc sumuntur differentiarum, nequaquam vnum est genus maxime igitur peccant, à proprijs & precipuis recedentes, deinde vero quicunque harum mentione facta, permiscent cum eis, equali honore omnes eas quae secundum accidens sunt, vtilis ab inutilibus haud discernentes. Non solum autem in ipsis differentiarum generibus, plurimi medicorum errauerunt, aut redundantes, quod & inutilem meminerint.

merint, aut deficientes, quòd nonnullas etiam
 vtilis præterierint: sed & in ipsa diuisione
 generum in proprias differentias, similiter er-
 rauerunt. Statim enim cum primum, ac
 præcipuum differentiarum genus ab ipsa
 diuidenda rei essentia summatur, ta-
 men videre licet nonnullos medicos vniuer-
 sum hoc genus prætermisisse: alios verò aut
 redundantes in diuisione fuisse aut deficien-
 tes.

VT Gale. ipse alibi docet, res est prorsum
 difficilis, platonique ac Aristoteli & theo-
 phrastotalis habita, genus in proprias differen-
 tias diuidere. Contingit enim facile, si is qui di-
 uidit logicæ artis valde peritus non sit, multi-
 fariam errare, præcipuè verò trifariam, aut
 quod missis differentiis, quæ ex rei diuiden-
 dæ essentia desumptæ sunt, per differentias
 ex accidentibus procedat, vr si quis diui-
 dens animal, mittens rationabile & irratio-
 nabile, quæ differentia secundum rei sub-
 stantiam censentur, dicat, animal aut est
 album aut non album, quæ differentia sunt
 accedentes, (nam ita soleo nominare eas
 quæ ab accidentibus capiuntur) peccatur se-
 cundo, quæquam differentiarum ab essentia

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

mentio fiat, non illarum solum (oportet enim earum meminisse seorsum inter diuidendum) sed cum ijs accedentes misceantur. Vt si quis dicat animalium quoddam est rationale, quoddam quadrupes, quoddam bippes, quoddam irrationabile. Tertio peccatur si quamquam diuisio fiat per essentia differentias solum, tamen consistitur ante differentias vltimas, in quibus solis plato iubet quiescere, vt ille dixit. Vt si quis diuidens elementum in vocale & consonans, putet se nihil omisisse. Qui ita diuidunt, sunt in diuisione deficiente quia earum, quæ ab essentia sunt, nonnullas omittunt. Qui secundo modo peccant, sunt redundantes differentijs, quia accidentes etiam annumerant. His omnibus modis, inquit Galenus, peccasse ante illum medicos, inuestiganda differentia, quæ est inter febres. Nam nihil refert dicere febrium differentias, aut febrium differentiam.

Quamquam Hippocrates sexto epidemion libro, optime diuisit. Dictio vero habet in hunc modum. Febres hæ quidem manu sunt mordaces, illæ vero mittes, quædam autem non mordaces sed increfcetes, aliæ vero acutæ quidem

dem, sed a manu denictæ, quædam sunt statim ardentes, quædam verò omnino debiles, siccæ, aliæ salsæ, quædã flatuosæ, aspectu græues, nonnullæ ad manum humidæ, aliæ rubicundæ valde: aliæ vehementer pallidæ, aliæ liuidæ, & aliæ istiusmodi.

Solus Hippocrates, inter Galeno antiquiores febrem rectè diuisit, quandoquidẽ differentias omnes ab essentia seorsum enumerauit, & accedentes seorsum. Nam est aliquando non inutile referre etiam accedentes differentias, verum illas per se, & post præcipuas, vt fecit Hippocrates sexto epidemiã parte 1. dictione 29. quam Galenus huic capiti inferuit, vt ab illa principium capiat inuentionis ad diuidendam febrem. Aggreditur verò diuisionem Galenus non præmissa diffinitione, quia cum res de qua agitur nota satis est ex ipso nomine, frustra quæritur diffinitio, quippe quæ nihil perspicuitatis præstat doctrinæ, & potest sermonẽ remorari, excitatis controuerſijs.

Evidentiſsimè enim in ijs, & ab ipsius rei essentia, simulque ab ipsa dignotione, in proprias differentias fecit diuisionem. Nam essen-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

etia febrium est in genere caloris præter naturam: differentia verò caloris & ex eo quod rationem maioris minorisque habent, & ab ipsa materia, in qua calor ille præter naturam accenditur, & à motus modo petuntur. Quas omnes coniungentes cum dignotionis modo scripsit, vt procedente sermone ostendemus.

EVidentissimè (inquit) Galenus, Hippocrates diuississe in præscripta dictione ex sexto epide. febrem per differentias ab essentia. Nā febris essentia est in calore præter naturā, in calore inquā solo: si siccitas cum calore præter naturā cōiūgitur, ea nō est pars essentia, sed accedens, quia calor præter naturā est igneus, & proinde desiccans: Sed neque est necessario accedens feбри, immo verò esse potest febris sine siccitate: vt si singas hominem, toto corpore laborantem intemperie tantum humida, corripī calore præter naturam toto etiam corpore, febricitabit manifestè. Nam calor præternaturam totius corporis, proculdubio est febris, tamen antequam febris humorem illum quo laborabat obsumpserit, satis magno fortassis tempore, febricitabit cum humore, ne dum sine siccitate. Quare si à Galeno prima particula aphorismorum commen.

16. dictum est, febris passio calida & sicca est, scire licet non eo esse dictum, quod febris essentia in calore sit, & siccitate, sed quòd febrilis calor semper sit sua natura desiccans, est enim necessario naturæ desiccantis, quia est igneus, quamquam, non arbitror necessario desiccet. Sed potest hoc, obiectu causæ alterius cohiberi, vt vsu ciborum, & potuum valde humectantium, & aëris humectatione, & aliarum causarum quæ perpetuò nos alterant. Ex quibus luce clarius fit siccitatem non esse in febris essentia, nam aliter non posset ab ea tolli, vt neque calor tolli potest. Rectè ergo Galenns libello secundo methodi cap. vltimo diffiniens febrem dixit, est tantus calor, quantus iam potest officere operationibus. Et octauo libro eiusdem operis (inquit) febris est calor immodice auctus, vt iam hominem molestia afficiat. Verùm est aliud quod diffinito hic opus habet, calor, is in quo febris essentiam collocauimus non tenet necessario totum corpus, sed aut solùm cor, aut saltem cum illo præcipua membra. Nam id Galenus ipse docuit clarius, quàm vt de illius opinione cõtentio esse possit, sexto Epyde, in commentatione eiusdem sententiæ, quam huic capiti inseruit, docuitque his verbis. Essentia verò febrili est, nõ
secun-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

secundum Hippocratem modo, atque præclarissimos medicos, sed etiam secundum communem omnium hominum consensum præter naturam calor, maximè quidem in totum animal effusus, sin minus, at omnino vel in plurimis partibus, vel in nobilissimis accēsus. Sæpius namque vniuersa cutis nullum euidētem præter naturam calorem, neque nobis exteriustangentibus, neque ipsis laborantibus præ se ferre videtur, sed in profundo corpore ipsi ægrotantes sentiunt, visceraque sibi incēdio flagrare aiunt. Hæc Galenus. Quare sicubi calorem totius corporis febrem esse dixit, illud vnum intellige, febrem esse calorem, qui nisi quid sit quod impediat, in totum corpus sese diffundit. Nam non ante febris est, quam cor præhenderit, à corde verò statim fit in totum corpus distributio, nisi inquā quid sit quod impediat, vt rigor aut interna inflammatio, aut calidi innati extremus langor. Verum hæc omnia disputata sunt à nobis latissimè quinto libro controuersiarum medicarū. Illinc ergo pete, si vis scire quæ in hac disputatione de febris essentia sunt difficilia. Hic illud vnum dicimus, essentiam febris in solo colore maiori quam pro natura insigniter (Id enim in omnium morberum finitionibus addendum est) consistere. Ergo ostendendū est,

hinc

hinc sumpro principio, Hippocratem illic omnes ab essentia differentias enumerasse. Caloris differentia ex tribus rebus solū summi possunt, intentione, motu, & materia. Has omnes complexum esse Hippocratem breui illa dictione, & deinde eas quę ex accideri quopiam desumptæ sunt adiecit, docet Galenus ipse in cōmen. eiusdem sententiæ, ex quo nobis petendus est genuinus verborum sensus. Cum Hippocrates (inquit) febres quidem aliæ manui mordaces, aliæ verò mites, significare vult, mordaces aut mites semper apparentes: cum subiicit, aliæ non mordaces quidem, sed post insurgentes, significat febres ab initio mordaces non visas, diutius iniecta manu mordacitatis sensum inferentes: contra verò ac istæ, illæ se habent, de quibus dicit, aliæ acutæ quidem sed à manu victæ. Ab initio enim acutæ apparent, paulatim acrimoniam remittunt. Quod verò acutæ appellantur febres, intellige non vt chronicis opponuntur, sed quia earum calor manui celeriter occurrit, & suum velocem motum manui ostendit. Itaq; prima diuisio in illa dictione est quadrimembris, & lata per differentias ex modo motus, quem calor tactui representat. Sequentia hæc verba: Quædam statim ardentes, quædā debiles, continent bimembrem diuisionem, per diff-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

differentias intentionis & remissionis latam. Scilicet alia sunt ardentis caloris, alia debilis. Ex dictis quæ licet tibi reperire in nuper citato Galeni commentario, satis constat, leonhartum fuchsum præter Galeni mentem in interpretatum esse dictam sententiam, in ijs commentarijs quæ in sextum epidemiæ vedit. Inquit enim primam diuisionem esse bipartitâ, & ex ratione maioris & minoris, contineri que his verbis, hæ quidem manu sunt mordaces, illæ verò mites: secundam esse quadripartitam, ex motu, & contineri his verbis: quædam autem non mordaces sed incrementales, alia verò acutæ quidem sed à manu deuietæ. Quædam sunt statim ardentes, quædam verò omnino debiles. Recessit apertè à Galeni sententia deceptus fortasse dictione illa, statim, vbi dicitur statim ardentes. Videtur enim ea dictio significare modum motus. Nō nego posse verba expositionem fulchrij pati, & sanè prodibit idem sensus: Sed refero Galeni interpretationem, à qua illa est satis diuersa. Illud vnum satis sit modo scire, dictis verbis duas diuisiones contineri, aliam ex intentione & remissione caloris, aliam ex modo motus. Tertia diuisio ex subiecta materia, continetur his verbis quæ sequuntur,

siccæ

LIBER PRIMVS. 9

siccæ aliæ salis, quædam flatuosæ aspectu graues, nonnullæ ad manum humidæ. Sunt nempe febres siccæ quæ in sicca materia sunt, cuiusmodi hecticæ. (Quamquam in codice græco basileæ deest dictio, ἀλμυρῶδες, i. salis, tamen apud Hippocratem reperitur) dicuntur verò hæc Salis, per metaphoram, quia calor corporis aridioris insuauitatem quandam facit in tactu, similem ei, quam salis faciunt in gustu. Aliæ sunt flatuosæ aspectu graues, in qua dictione, vt Galenus notat in commentario citato, quidam separant dictionem illam, aspectu graues, à dictione flatuosæ, quasi aliæ sint flatuosæ, aut inflatæ aut tumidæ, (hæc enim omnia significat dictio πρηφυώδες) aliæ aspectu graues, Sed Galenus ambo hæc copulat, legitque, aliæ tumidæ aspectu graues, qua dictione (inquit) sola pestilens febris significatur. tumidæ quia tales representantur, aspectu graues, aut terribiles, vel quia toruere intuentur, qui illa sunt infecti, vel quia intuentibus terribiles fiunt, maculata cute, aut obortis pustulis. Hæc est Galeni interpretatio, tam longe abest vt verè interpretentur, qui dictione hac spirituosæ videri graues, diarias significari dicunt. Sunt enim qui ita interpretentur, diarie spiri-

DE DIFFEREN. FERRIVM.

spirituose sunt, quia earum calor in spiritu est factus, sunt verò graues non re vera, sed videri graues, quia tales videntur, & vulgo & imperitis medicis. Sed cōtra est quòd Galenus, dictionem spirituosam non propter subiectā materiam interpretatur, sed ad tactum. Ita enim (inquit) febrem pemphigodea dictam esse spirituosam quæ ad tactum referatur. Iam verò febrem diariam videri grauem falsum est apertè, nam peritis non videri fatentur, imperiti nulla alia ex re iudicant morbi grauitatem, aut leuitatem, quam ex bona aut mala egrorum tolerantia. Sed vt licet videre apud Galenum primo de arte curatiua ad gla. cap. 2. signū febris diariæ quo ab alijs febribus differt, est facilis tolerantia non ergo est diaria febris videri grauis, sed potius est ad manum humida, est enim, vt hic ipse liber docebit, calor quidam occurrens tactui vaporosus, & cū suauitate quadam, vt calor substantiæ humidæ solet, cōtra ac qui in aridiori est materia. Hęc itaque est tripartita diuasio. Verūm, rogabis qua ratione dicimus has differentias sumptas esse ex materia: nam salsam esse, videri grauem, aut tactui humidam, non videtur significare materiam, sed modum quo tactus afficitur. Scire licet Hippocratem, & Galenus notat, tradidisse differentias sumptas ex essentia,

alias

alias ex motu, alias ex intentione, has quas modo declaramus, ex materia, sed illas coniunxisse cū dignotionis modo. Scilicet est id Hippocraticæ breuitatis. Is modo refert differentias ex materia, & interim nominibus ipsis significat modum dignotionis. Sicca salsa est hæctica, in qua calor est factus in solidis, ita appellata quia insuaus est tactui, contra humida ad manum est diaria, cuius calor est in spiritu, appellatur ita, quia velut ab humida substantia afficitur tactus. Tumida & videri grauis, significat febrem pestilentem, ac illius nomine omnem putridam, vno exemplo pessimæ putredinis insinuante nobis Hippocrate totum putridarum genus, quarum calor est factus in succo. Cuniunxit itaque Hippocrates dignotiones cum differentijs, quod & in duabus primis diuisionibus fecisse, facileprehendes. Expeditis his differētijs quæ ex essentia sunt, etiā addit alias quæ sunt ex accidenti quopiam. Dicens: Aliæ rubicundæ, alię pallidæ, aliæ liuidæ, hæ differētiæ manifestè sunt ex accidenti quopiam. Nam colorum magis sunt hæc nomina, quàm febrium. Quamquā diceres satis probabiliter, vltimas has differentias dici nominibus accidentium, tamen esse sumptas ex materia, ex specie inquā succi, atque esse subdiuisionem (vt dicunt) tertiæ

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

diuisionis, scilicet, febris à succo pendens, aut est sanguinea, quod faciei rubro colore significatur, aut biliosa, quod pallido, aut melancholica, quod liuido nigrove, aut pituitosa, quod albido. Sed utcumque dicas, hæc vltimæ differentia quamquam possint respondere differentijs ex materia, ex accidentibus sumptæ sunt. Verum hoc in loco nota, quod in quarto libro controuersiarum medicarum diximus cap. 20. febrium differentias quas Galenus tradidit non esse physicas re vera. Nam febris quod etiam illic monstratum est, nihil est aliud quàm calor præter naturam. Differentias maximè essentiam attingentes dixit Galenus esse ex intentione, aut remissione, aut motu, aut materia: quæ si re vera speciem permutarent, Differret specie calor paru⁹ à maiori, & calor auri à calore argenti, & calor meridianus à vesperino quo nihil est à philosophia alienum magis. Non itaque sunt re vera specierum differentia hæc, sed medicæ. Nimirum medici in artis constitutione respicientes finem, curationem scilicet, species sibi constituunt, quo ad possunt, eas, quæ sunt accommodatissimæ ad curationem peragendam. Dictæ verò sunt à Galeno hæc ex accidentibus, illæ ex essentia, non quòd aliæ illarum essentiæ sint re vera, ut rationale hominis. Sed quòd accipiantur ex
co

eo quod necessariò inest rei in qua consistit febris essentia. Nimirum essentia febris consistit in calore, huic necessariò accidit esse intenso aut remisso, & modo aliquo mouere tactum, & inesse alicui materiae, esse albo aut nigro non accidit calori, sed calido. Ergo hac ratione dicuntur aliae ex essentia, aliae ex accidenti. sed hae require loco citato quarti libri & rursus quinto libro nostrarum controuersiarum. Porro si vis scire verè essentiales febrium differentias lege caput primum eius compendioli quod de febribus iam in lucem edidi. Ego enim nunc commentatorein ago.

Porro quae à ratione maioris minorisque dicuntur, manifestae sunt, & in hoc genere differentiae, mos est medicus magnam & paruum febrem nominare: Verum improprie de rei qualitate quantitatis nomen efferunt. Itaque omnes facere consueuerunt, non solum in febre, sed & in innumeris alijs quae in qualitate essentiam obtinent, magna tamen & parua nominantur.

Magnitudo aut paruitas, si quis rigide uatur nominibus, soli accidunt quantita

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

ti. Nam ea tantum quæ quanta sunt dicuntur magna aut parua, maiora aut minora, æqualia aut inæqualia. Qualia potius dicuntur vehementia aut debilia, intensa aut remissa, similia aut dissimilia, docet id communis omnibus hominibus sermo, præterquam quod Aristoteles ita vitur nominibus in categorijs, tamen medici illa nomina ad qualitates etiam transferunt, vt in commentarijs etiam 12.1. aphorismo. Galenus ipse monet. Neque verò solùm medici id faciunt, sed vulgo ita loquuntur, febris est magna aut parua, & calor maior aut minor, si exactius loqui vis, dicito febrem vehementem aut debilem, intensiorem calorem aut remissiorem.

Quæ verò à materia sumuntur, in qua calor præternaturam consistat, maximè propriæ caloris præternaturæ differentiæ sunt. siue corpus ipsum cordis ille præhenderit, siue succos in eius ventriculus contentos: reliqua verò & tertia differentia est, vbi aërea essentia sola admodum incaluit, liquida verò & solida corpora etiam nunc incalescunt, sed nondum incaluerunt.

Differentias quas in Hippo. verbis deliteſcentes, adhuc ſcripſerat Galenus, ſcribit modo diſtinctè ſuo more. Atqui reliquis omiſſis, accedit ad maximè proprias, nam in harum declaratione verſabitur totum hoc opus. Eæ ſunt quæ accipiuntur ex materia, illæ enim ſunt omnium maximè propriæ calori ipſi, quia qua ratione eſt accidens, nihil eſt ei magis intimū, quàm ineſſe materiæ, vſq; adeò vt Ariſto. hac tm̃ ratiōe accidēs finiuerit. ergo maximè propriæ febriū differētiæ ſūt, quæ ex materia accipiūtur: hæ verò ſunt tres, quas antea etiā diximus, quia tres ſunt ſubſtantiæ in noſtris corporibus, in quibus caler poteſt eſſe factus, ſpiritus, ſucci, & membra. Atque ita febris poteſt eſſe ephemera, humida, ſive ex ſucco: aut hec̃tica. Sunt qui non intelligentes cur differentia ex materia ſint magis propriæ alijs, locum hunc ita interpretantur, inter differentias ex materia maximè proprias eſſe eas quæ ſunt in hac diuiſione, vt calor eſt in ſucco, aut ſpiritibus, aut membris. Sed hunc ſenſum non patiuntur verba ipſa, eſt enim ita ſcriptum. Ἀλλὰ δὲ πᾶρα τὴν ὑλὴν, εἴη το παρὰ φύσιν τοῦτο θερμὸν, οἷκε τὰται διαφορὰ παρὰ φύσιν θερμασίης εἶσιν. Id eſt differentia autem, (ſi verò ille ſenſus verborum foret, dicendum eſſet, τῶν δὲ διαφορῶν, dif-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

ferentiarū autē, aut εν ταις μὲν διαφοραις.
indifferentijs autem) secundum materiam
maximè propriæ sunt, & cætera, itaque dictio
neque est obscura neque amphibologica, sed
significat apertè quæ diximus.

*Neque enim parum differt aliquid inca-
lescere aut incaluisse.*

CVm dixisset paulo antè, tertia differentia
est vbi aërea sola essentia admodum in-
caluit, liquida verò & solida corpora, etiam
nunc incalescunt, sed nondum incaluerunt, in
horum declarationem dicit modò, neque e-
nim parum differt, aliquid incalescere & ca-
lesfactum esse. Mimirum, vt statim ipsemet di-
cturus est, quæcūque febris hominem teneat,
habent calorem omnes illæ substantiæ, spi-
ritus, succus, & substantia corporis. Sed si v-
nica febris est, vnica illarum habet calorem
factum, aliæ calorem qui adhuc fit. Multum
ergo refert, vt declaremus quid sit, calorē esse
factum, aut fieri adhuc. Non enim videtur
posse esse verum, quod à Galeno dicitur, cor-
pora solida incalēscunt, sed nondum incalue-
runt. Nam nihil quod mouetur est in integra
priuatione eius formæ ad quam mouetur, sed
est in actu imperfecto. Inquam sententiam di-
citur

citur ab Aristotele. 3. physicorum. cap. 2. motus actus quidam esse videtur, imperfectus tamen, propterea quod ipsum passibile imperfectum est, cuius motus est actus. Itaque non mouetur, quod nondum quidquam comparauit per motum, quia quod nihil omnino mutatum est, quiescit, ergo nihil potest incallescere, quod aliqua ex parte non sit calfactum. Hæc physica ratio euidenter monstrat, Galenum non appellare hic calorem factum, quemcunque calorem, qui genitus est in substantia quapiam, nam ita omnis febris est calor factus in cordis substantia. Non enim succorum calor, aut spiritus, est morbus, sed intemperies calida ægrotantis corporis. Sed calor hic qui febris est, per febres diarias, & eas quæ pendent ex succis, est in corde dispositio quædam ex interna causa, inflammato inquam spiritu, aut putri vstove succo, pendens. Per febres hæc ticas calor cordis est in habitu, eoque difficile separabilis, nullaque iam ex causa pendens sed fixus per se. Ergo hac in parte intemperies nondum facta est, quæ in dispositione consistit, ita appellata quia ex causa pendet, facta; in habitu, appellatur ita, quia non pendet ex causa, more earum rerum quæ iam non fiunt. Sed de hac re latius diximus in

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

commentario primi capituli libelli de inæquali temperie, illinc pete integram huius rei intelligentiam, si hac non videntur esse satis.

Ac discas euidentissimè id quod dicitur in huiusmodi exemplis. Cogita mihi calidam aquam lebeti frigido inditam, deinde ab ipsius vicinior lebetis corpus calefieri, nondum verò totum exquisite esse calefactum. Rursus finge in calidum atque ignitum lebetem frigidam aquam infusam, deinde calefieri quidem adhuc, nondum autem ipsam incaluisse, in horum secundo exemplo, prima febrium differentis, quam corpus ipsum cordis occupasse diximus in primo verò, ea quæ in succis, qui in ipso sunt consistit: reliqua verò & tertia exemplum omnino simile non habet. Sed clarioris doctrinæ gratia, animo concipe fabrilem follem, trahentem ad se aërem admodum calidum, deinde verò ab ipso calfieri adhuc, nondum autem incaluisse. Sed exemplum rei declarandæ naturam magis indicabit, si finxeris in folle contineri succum, atque adhuc magis si foramina follis, per quæ trahit atque emittit aërè, ita angusta feceris, ut succo quidem inuia, aëri

aeri verò peruia sint. Qua sane in re maximè differunt naturæ opera, ab ijs quæ homines efficiunt, nam in omnibus arterijs, per multa foramina spirantibus, permista est essentia aërea sanguini: ac nihilominus in ipso corde, vt quæ per eas omnes confluat.

EXemplis lebetis in quem aqua infunditur, & follis fabrilis, nititur Galenus nos quasi manu ducere ad intelligendum quæ ratione calor factus sit aliquando in spiritu, & in aliis substantijs fiat, & aliquando in succo factus, in reliquis fiat, aliquando factus in substantia cordis, fiat in alijs duabus. Auicenna fen. 1. 4. capi. 1. vtitur exemplo quodam magis ac comodato, balnei in quo sunt tria hæc parietes aqua, & aër possunt enim in eo calidi parietes reliqua calefacere aut calida aqua, aut calidus aër. Sed in hoc capite nihil iam scrupuli superest, præterquam quòd differentia hæc febrium malè videntur appellari acceptæ ex materia, cum caloris, qui febris est nihil possit esse materia præter membrorum substantiam. Siquidem, vt dictum est, essentia febris in calore rei viuientis consistit, calor enim excrementorum non fuerit morbus. Certè si quis rigide consideret res habet vt modo diximus. Non sunt illæ differentia ex materia, cui

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

febris inest, immo verò partim ex materia, partim ex internis causis. Spiritus enim inflammatus, & succus putris, causæ febrivm potius sunt, quàm materia sed Galenus modo non tam rigide disputat de febris materia, sed medice magis, & latiuscule, vt totus is calor qui tactu sentitur in febricitanti corpore, febris appelletur, quod ostensum etiam à nobis est in controuersiarum decissione. Modo illud vnum videtur expendendum, nū vere dictum sit à Galeno hoc in loco in quacunque febre simplici esse calorem factum in aliqua dictarum substantiarum. Quando quidem, cum factus calor sit qui est in habitu non pendens ex causa, talis verò non possit esse nisi cum rei ipsius calefactæ, subuersa iam est natura, ita vt innatum illi temperamentum corruptum sit, (nam aliter temperamentum illud aduentitium abscedente causa quæ conseruat, corrumpetur à naturali rei temperamento, quod si nondum euersum est, contra illud pugnat) videtur per febrem continentem quæ sine putredine est, nullibi esse factus calor, nam sanguis cum neque putris neque vltus sit, neque alio modo secundum substantiam alteratus, sed secundum qualiratem solum, calefactus nempe, non magis habebit factum calorem, quàm aqua
cum

cum ferbet, quam constat detracto igne deferbere. Ego sane non dubito, si sanguis nihil contraxit putredinis aut vstionis, cum calorem habere qui adhuc fiat, cur enim factus sit? Verum per eam febrem nullibi esse calorem factum non cogor concedere. Nam rem ita intelligo. Ea febris quodammodo diaria est, quodammodo ex succis, non tantum duratione aut dierum numero, ut plerique intelligunt, sed natura. Nimirum per eam ardent calefactique sunt spiritus, hique duas alias substantias calefaciunt. Verum à reliquis diarijs ita differunt, quòd in illis spiritus arduentes succos & membra calefaciunt, ambo perse, in synochis verò appellatis spiritus arduentes faciunt succos ferbere, atque illorum ferbore potissimum membra calefaciunt. Est apud Aristotelem quarto meteoron appositissimum exemplum. Cum quidpiam in testa elixatur & sartagine frigitur, constat tres substantias adesse, quas licet dictis tribus conferre, igneam exhalationem spiritui, succum succo, rem quæ frigitur elixatur ve membris solidis. Constat non minus has passionem ab ignea exhalatione proficisci, tamen quæ elixantur à succo ipso dicuntur pati, succo patiente ab igne, quæ friguntur, ab igne perse, ambo

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

ambobus scilicet re inquam ipsa, & succo simul patiētibz ab igne, non alio per aliud. Ita que per alias febres diarias omnia calefiunt simul & perse ab spiritu, quia sanguis nō erat paratus adeo ferbere: in synocha spiritus ferbefacit perse sanguinem, & calfacit per sanguinem ipsa membra. Hinc fit, vt quamquā diaria sit, longiori duret tempore, quia ferbor sanguinis valenter facit spiritus recalescere.

CAPVT. II.



*I*ncipit igitur hic calor prater naturā, quē febrem etiā nominamus alius ex alio eorū quæ dicta sunt, serpit autē & vnā cū eo quod patitur reliqua duo afficit genera. Facillime igitur à succis ad spiritū calor trāsmeat, minūz verò prompte vna cum spiritu succi accenduntur, quin etiam solidum corpus succis, aere aq; substantiæ promptius elargitur calorem, quā ipsum ab illis accipiat. Omnis enim substantia tenuium

tenuium partium facilius quàm ea quæ crassarum est partium, alteratur, est autem tenuissima aeris, crassissima verò solidorum corporum, in medio vtriusque, succorum. Nihil autem in præsentì doctrina refferit spiritum vel aerem dicamus. Nam de ipsis alibi exquisitius diffinitum est. Nunc verò sufficiet hoc cognoscere, quod arbitror Hippocrates ostendens dicebat. Continentia, contenta, & impotentia, continentia quidem ipsas solidas corporis partes appellans: contenta verò succos: impetum autem facientia, spiritus. Febrilis enim affectus alias ex alio prædictorum incipit, non permanet autem in eo genere quod primum affectus est, sed ad reliqua duo serpit: ac nisi prius solvatur, processu temporis illa quoque similiter afficit. Atqui hæc summa sermonis est. Sed oportet ea quæ dicta sunt simul demonstrare, & dignotiones vniuscuiusque generis febrium recensere. Statim verò de earum ortu dicere est necesse.

Accipit modo iterum Galenus celebratissimam illam febrium diuisionem ex materia, ex alio Hippocratis loco illam educens

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

educens . Moratur verò vsque adeo in declaranda hac diuisione , quia tres has differentias prosequitur est solum in toto hoc opere : Hippocrates ergo libro sexto epidemion sectione septima ita scripsit . Spiritus tantus , calor , frigus , crassities , tenuitas , siccitas , humor , plenus imminutus , & copiosior , à quibus mutationes , quales ex quilibus , prout se habent contenta , continentia , & impotentia . Quo sermone obscuro , nihil aliud puto significari , quàm mutationes omnes in nostris corporibus fieri , vt habuerint continentia contenta & impotentia : membra scilicet , succi , & spiritus . Igitur febres quoque fient calefactis , aut membris , aut succis , aut spiritibus . Vnde prodit præcipua omnium febrium partitio . Cæterum quamquã calor in vnica harum substantiarum sit , non manet in ea solum , sed reliquas inuadit . Nam inopinabile est , illarum quampiam esse valde calidiorem iusto , & reliquam mediocritatem retinere cum simul sint , atque adeo perse se mutuo peruadentes , tamen quoniam calorem bifariam esse posse in substantia aliqua antea dixit , factum aut non factum , & in ea substantia , à qua febris species sumitur , semper sit factus , bifariam poterit substantia calefacta duas alias afficere , aut calefaciendo
iplas

ipsas calore qui solum fiat, aut trahendo eas, etiam ad calorem factum. Prima illa affectio semper fit, semper enim in quacunque febre sunt tres substantię cum calore, secunda hæc non semper, sed cum fit febris permutatio, aut febris cum febre complicatio. De prima permutatione loquitur Galenus in primis capitis verbis cum dicit, incipit hic calor alias ex alio quæ dicta sunt, serpit autem & vna cum eo afficit reliqua duo genera: Sed vbi addit, facillime igitur à succis ad spiritum calor transmeat, minus verò prompte vna cum spiritu succi accenduntur, non disputat de permutatione febrium, sed de sola alteratione: nimirum spiritus, quia tenuissimus facillime calefcit, deinde succus, difficillime membrum. Proinde citius & facilius, calefacto succo calefit spiritus, quàm contra. Tamen si sermo esset hic de permutatione febrium, sermo non esset verus. Nam diaria frequenter permutatur in putridam, putrida nunquam permutatur in diariam, immo verò quod febre putrida laboret: nullus incidit in diariam, nisi accedat causa procathartica: tunc enim potest cum ea copulari. Itaque male ex hac sententia quæ etiam scripta est in quinto capite libelli de inquali intemperie, colligunt nonnulli, semper
fic: i

DE DIFFEREN. FEBRIV M. 7

fieri febrem diariam ante putridam, saltem cum putrida sit à causa procatartica, & putridam etiam ante hæcticam, vel saltem diariam ante hæcticam, ita vt hæctica à principio nunquam fiat. Quia, dicunt, accedente quacunque causa, necesse esse calefcere primùm substantiam, quæ facilius inflammatur, deinde aliam. Sed falluntur, nam Galenus quamquam dixit spiritum esse paratissimum ad incallescendū, non tamen dixit ad contrahendum calorem factum. Itaque lubens concesserim, accedente causa externa semper incallescere spiritus ante succos, sed non esse semper calfactos prius. Interim verò, dum omnes substantiæ incalescunt, nulla adhuc calefacta, non est febris quæpiam, etiam si calor sit intensissimus, magis quàm in homine ardente ira cui nulla febris superuenit. Sed de his in hoc ipso libro iterum dicetur, & in quinto controuersiarum fusius à me dictum est. In vltimis capituli verbis loquitur de secundo modo quo se hæc substantiæ afficiunt, vbi inquit, febrilis enim affectus alias ex alio prædictorum incipit, non permanet autem in eo genere quod primum affectū est, sed ad reliqua duo serpit, vt ex diaria fit putrida, ex hac hæctica. Quòd horum verborum hic sit sensus sequentia hæc indicant. Ac nisi prius soluatur processu temporis, illa quoque

que similiter afficit, αὐτῷ eodem modo, ac in prima substantia erat calor, videlicet factō calore quod verò à Galeno dictum est, nō permanet in eo quod prius affectum est, sed in reliqua duo serpit, ne intellige, quod non nulli barbarorum, vt tollant febrium concursus, cū calor in aliam substantiam transit, nō permanere in priori, id est, priorem destituere, sed intellige non consistere solum in prior illa substantia. Obiter Galenus in hoc capite tetigit naturam spirituum, refugit verò illius integram declarationem, tamquam ab hoc loco alienam, & in aliis locis satis declaratam, videlicet in opere de placitis Hippocratis & Platonis, & libro aduersus erasistratum, quod sanguis in arterijs contineatur, & obiter, vt hic, in multis aliis locis. Dicit verò in hoc capite illud vnum, nihil referre aërem illum appelles aut spiritum. Non quidem significans nobis, (quod fuchsius intelligit) spiritum sola crassitie differre ab aëre, differt enim etiā specie, atque ea mutatio qua ex aëre spiritus fit, ortus est vere. Nā qua ratione aër possit esse instrumentum primum nostræ animæ? Adde quòd si spiritus ab aëre factus, non differret specie ab eo nō essent spiritus ipsi, quamquam eiusdem essent facultatis, vt vitalis, aut animalis, vnius speciei Nam

DE DIFFEREN. FEBRIV M.
spiritus non fit ex aëre solùm, sed etiam ex sanguinis vapore. Sed qui ex sanguinis vapore fit, non est aër, aut ergo spiritus ipsi vitales inter se ipsos specie sunt diuersi, aut certe nullus spiritus vitalis est re vera aër. Galenus sanè libello, quòd sanguis in arterijs secùdum naturam cõtineatur, monstrat spiritum aëre esse crassiorẽ, speciei non meminit, quia ad inceptam illic disputationem nihil intereat. Vnde ergo colligis, illum dixisse sola crassitie differre? hic quoque dixit nihil refferre aërem dicas aut spiritũ, addidit vero caute admodum, in præsentì doctrina, dicens, nihil autem in præsentì doctrina refert, aërem aut spiritum appellare : significans luculenter, differre spiritum ab aëre reuera, sed ad præsentem doctrinam nihil referre illã differentiam declarari. Nam ad id quod modo dicitur, illud vnum oportet sciri, illum esse substantiam tenuem, quo scilicet facilius alijs inflammetur. Ergo nihil refert ad hanc doctrinã spiritum appelles aut aërem: nam vtroque horum nominum substantia tenuissima significatur. Sed caput præsens non indiget enarratione maiori.

CAPVT. III.

Quod



Quid igitur ex lassitudine,
 ira, mœrore, solis vstione,
 frigore, vigilijs, cruditate,
 ebrietate, & satietate non
 nulli febricitare conspiciū-
 tur, omnibus iam homini-
 bus perspicuum est, ab ipsius rei euidencia edo-
 ctis. Quinetiam pestilentem aeris constitutio-
 nem, asferre febrem, minime ignorant quicun-
 que intelligentia participant. Quemadmodum
 & versari cum ijs qui peste laborant, admodū
 periculosum esse. In commodum enim ne hinc
 capiatur, periculum est, veluti à scabie quadā
 & lippitudine: minime praterea tutum est, cū
 ijs qui tabe tenentur, conuersari, atque in totū
 cum omnibus qui putridum exhalant, adeo vt
 domus, in quibus decumbunt, grauiter oleant.
 Longa insuper experientia compertum est, eos
 qui exercitationum cōsuetudinem omiserint,
 alijs quibusdam morbis & maxime febrilibus
 corripī. Et quòd plenitudo vocata procreet fe-
 bres atque nonnulli etiam cibi prauī, ac me-
 dicamenta, & aestus circa canis ortum,
 atque alia huiusmodi, ab omnibus hominibus

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

(Vt ita dixerim) cognoscitur. Qui verò ab ipsis incorporibus nostris fiat affectus, ex quo febricitamus, hoc ignorant plerique hominùm & nonnulli medicorum, duplex autem talia ignorantium genus est alterum quidem quod ipsa dumtaxat experientia nritur, tanquam nulla ratione rei cuiusque natura inueniri possit: alter vero catus hominum est eorum qui sapientes videntur, ignorantia verò æque ac priores laborantes, sententiæ tamen opinionem habentes. Inscitia autem laborare eos contingit quia in methodis logicis prius non sunt exercitati, è quibus dignoscuntur ac discernuntur à demonstrantibus sumptionibus, verisimilia quidem sed quæ nihil veri aut inuenire aut demonstrare possunt. Huic verò inscitie, quia insolentia accessit, nonnulli ex eis in tantum stuporem atque audaciam deuenerunt, vt neque ea quæ omnes homines cognoscunt experientia ipsa edocti, febriũ causas esse fateantur. de quibus cū in libro de causis procatarticus nominatis abũde differuerim nihil opus est nũc mentionẽ facere vanæ, ipso rum loquacitatis. Neque enim contradictio-

nem

ne neq; sophismatū solutionem continentē sermonem hūc constitui, sed instituentem ac docentem, habentemque hypotheses in alijs libris demonstratas, ac febrium differentias docentem.

F Alluntur hoc in loco enarratores fere omnes, putantes Galenum velle hic docere causas generationis febrium diariarum, non enim magis hic agit de diariarum causis, quā putridarum, aut hæcticarū, sed de causis febrium indistinctè. Nam quamquam meminit causarum procatharticarum, quæ semper fere diarias solent committere, neque tamen illæ causæ solas diarias committere possunt, sed putridas etiam & hæcticas nonnunquam, neque Galenus meminit solum illarū quæ diarias faciunt magna ex parte, sed inter illas etiam aliquarum, quæ semper faciunt putridas aut fere semper, cuiusmodi aëris pestilens constitutio. Non ergo id est Galeno institutum, sed quod promissèrat, docere inquam modum quo febres fiunt, incipitque disputationem acceptis ijs quæ manifesta sunt, & ab omnibus citra controversiam conceduntur. Proindeque dicit: quòd quidē ex lassitudine ira, merore, solis vstione, frigore, vigilijs, cruditate, ebrietate, & facietate febris fiunt, expe-

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

rimentum quotidianum docet, quod etiam ex
 aere pestilenti omnes sciunt, quicūque nō sunt
 omnino ignari, non minus quā constat, peri-
 culosum esse versari cum ijs qui peste laborāt,
 inficiuntur enim hi hand obscurius, quā qui
 simul versantur cum homine scabie, aut lippi-
 tudine aut tabe, ea scilicet quæ fit ob pulmo-
 nis vlcera, (non enim omnis ariditas est mor-
 bus contagiosus) laborante, aut in vniuersum
 cum homine putridum adeo expirante, vt cu-
 biculum in quo decumbit grauitèr oleat. Lon-
 go etiam experimento constat, consuetæ exer-
 citationis intermissione multorum morbo-
 rum, eorum maxime qui cum febre consistunt
 solere esse causam: quod etiam plenitudo, &
 cibi prauus, & tempus æstiuum, & medicamen-
 ta, febres solent excitare. Hæc omnia, nulli du-
 bium est, febrium causas esse solere: sed qua
 ratione illarum quælibet id faciat, aut quam
 interiùs affectionem generent, quæ febris fiat
 (neque enim omnes eodem modo faciunt,
 sed aliæ adstringendo cutem, aliæ ad putre-
 dinem trahendo succos, aliæ mouendo spiri-
 tus, aliæ aliter) id non tam est manifestum,
 proindeque explicatione indiget. De modo
 quo contagium fit, & qui morbi sint contagio-
 si, dictum à me est, libro quarto controuer-
 siarum capit. vltimo, cui de sympathia & an-
 tipa-

tipathia titulum dedi . Vbi largissime omnia
problemata , quæ in hac disputatione sunt , dis-
solui . Modo illud vnum lubet repetere : nul-
lum contagium morbi fieri sine transmissu
rei alicuius , ab eo qui infectus est in eum qui
inficitur . Id verò constat , cum omnis natu-
ralis actio fiat per contactum . Ergo & fasci-
natio , & alia quævis sympathia inter diuersa
corpora , transmissu rei alicuius fit , & quæcun-
quæ causæ , sine rei alicuius transmissu red-
duntur , sunt nenix , & figmenta . Mittuntur
ergo semina contagij , quæ inquinamenta quæ-
dam sunt , ab ægrotante prius homine in eum
qui contagio afficitur . Illos igitur constat
morbos contagiosos esse , qui parti insideant ,
Ex qua in alios homines illa inquinamenta
mittantur , reliquos verò nequaquam . Sunt
duo corporis loca , ex quibus emissa inqui-
namenta , facillime in alio corpore recipiun-
tur : partes quæ ad cutem sunt , & quæ ad
thoracem . Quia ex cute effluunt vt ex par-
te extima , atque ita occurrunt statim vicino
corpori : ex thorace emittitur multa copia puri-
dorum vaporum expiratione . Accedit e-
tiam , quòd non satis est quo contagium
fiat , vt inquinamenta , quæ ex affecto flu-
unt corpore , vicinum tangant , nisi partem

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

etiam illam vicini corporis, ex qua ipsa fluunt contigerint. Nam si inquinamenta, quæ ex putrescente pulmone veniunt, hepati occurrerent, & non pulmone, læderet fortassis sic quoque, tamen pthisim non facerent. Vocamus verò contagium, corporis sani cum corpore ægrotante, infectionem similem. Ergo ut contagium fiat, necesse est inquinamenta quæ ex affecto sunt corpore, eidem parti occurrere, à qua veniunt, ut quæ ex pulmone pulmone, cerebro, quæ ex cerebro. Id verò solis dictis partibus potest accidere, quia quæ ab hoc expirantur, ab illo inspirantur facillime, & quæ ex cute prodeunt, cuti fiunt obuia, quæ verò ex alijs partibus exhalant, aut pauciora sunt, quam ut ad vicina corpora veniant integris viribus, aut cuti soli occurrunt, ex illis partibus quas respiratio attēperat, vel siquid venit ad eas partes ex quibus effluxit, est perquā minimum, & ab alijs alteratum prius. Superest ergo versari cū ægrotantibus, utcumque ægrotent, numquam esse utile, quia quamquam similes morbos nō transfundant, possunt aliter lædere: tamen cōtagiosos duplices tantū morbos esse, eos scilicet qui cū cutis sunt vitijs aut cum respiratio- nis corruptione. Solum itaque morbi ij qui affligunt thoracis partem, aut etiam caput, (nā cerebro etiam est sua respiratio) aut cutem
 conta-

contagiosi esse possunt. Quare cū asthmaticis, aut pthificis, aut perineumoniacis, aut elephan-
te, aut lepra, aut vitiligine, aut morbo gallico
laborantibus versari, admodum periculosum
est, cum pleuriticis, aut phreniticis, aut lethar-
gicis, aut coriza laborantibus, non est tutum.

Ex dictis satis iam liquet, febrem vt febris est,
non esse morbum contagiosum, neutrum e-
nim illorum per se habet, tamen aliquas illa-
rum species esse contagiosas, puta pestilentes.

Nam vt docet Galenus 3. de præsignis. ex pul-
sibus, signum inseparabile est ab illis fœtor an-
helitus. Scabies etiam, & omnia illius genera,
contagiosi morbi sunt, quia sunt cutis, lippitu-
do non minus, est enim palpebrarum oculi
inflammatio, quæ extimæ partes etiam sunt.

Acceditque oculos gratia rectitudinis intui-
tus, maximè omnium partium sua inquinam-
enta in alia corpora infigere. Contagium i-
raque hac ratione fit: qua ratione causæ om-
nes quas experimento constat febres facere id
faciant, non omnes sciunt, duplicis autem se-
ctæ medicos inquit rem hanc ignorasse, empi-
ricos, qui sola experientia contenti, nullius rei
causam scrutabantur, & quosdam alios qui
ex logicæ artis ignorantia, non distinguentes
probabiles rationes à demonstrationibus, sophi-
sticis quibusdam argutijs suasi in eam vene-
runt

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
rūt opinionem, causas procatharticas non esse
morborum causas. Verūmtamen horum er-
ror conuictus est à Galeno libello quem scri-
psit de causis procatharticis, & à nobis de eadē
re dicta sunt quæ oportuit sciri, libro quarto
controuersiarum, quæ modo nihil refert vt re-
petantur, sed veram doctrinam properat Ga-
lenus aperire, quod fiet iactis quibusdam fun-
damentis, quæ capite sequenti cōtinebuntur.

CAPVT IIII.



*Hypotheses igitur ipso-
rum sunt, calidum, fri-
gidum, humidum, &
siccum, esse corporū
elementa, & primos
morbos fieri ex horū
intemperie, è quibus
vnum esse etiam fe-
brem, postquam in corde calor quidam præ-
ter naturam generatur, differentia verò in
genere caloris, de quibus præsens tractat ser-
mo, à materierum differentia febrilem calo-
rem*

rem suscipientium, quæ tres genere sunt, sumebantur. Aut enim in ipso cordis corpore primo ipsum accendi dicebant, aut in succis, aut in spiritu. Precedere autem omnium febrium constitutionem, causas omnibus euidenter cognitæ: quas paulo antè commemorauimus, è quarum obseruatione empiricus quidè medicus ad curationem nonnihil iuuatur, rationalis verò ad ipsam rerum naturam accedens, per indicationes, ab illa tum ad futurorum prænotationem, tum ad curationis inuentionem iuuatur, vtens omnibus quidem per experientiam inuentis, multa verò ipsis ex rationali methodo adiiciens, quæ igitur sunt per vtrâque partem inuenta, experientiam dico & rationem, alibi indicauimus: qui verò à singulis procatharticis causis in corpore consistat affectus, qui febrem accendit, nunc dicere propositum est.

Hypotheses has nō tam oportet declarare, quàm recipere ad dicenda, sunt enim per se manifestæ satis. Illud vnum indiget animaduersione, quod ex causis
mani-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

manifestis rationales medicos iuuari dicit ad cognitionem futurorum, & ad curationem. Intelligendum siquidem est eas causas quę durant adhuc in corpore simul cum affectu, indicare posse curationem, vt bubonem, & cruditatem, & vstionem, & constipationem curis, tamen eas quę iam abscesserunt, vt ira & exercitatio, quę cum iam abscesserint febrile in corpore reliquere affectum, ad præcognitionem eorum, quę circa ægrotantem timeri aut expectari debent, posse aliquid præstare, tamen ad curationem nullam indicationem præstare posse per se, sed tantum per id quod accedit, per eos scilicet affectus quos in corpore reliquere. Hoc docet Gal. lib. 4. metho. cap. 3. qua assertionem nulla est verior aut euidentior per sese. Nam illud tantum dici debet indicare aut conindicare (nam indicationis nomine ambo hæc intelligo) cuius causa aliter agitur circa ægrotantem, ac ageretur, nisi illud intercederet. Verū causa eius quod iam præterijt, atque cuius nihil adhuc superest, nihil variat curationis modus. Nam finge duo homines febricitare eiusdem generis febre, atque vehementia æquali, robur quoque esse his æque vehemens, sint eadem ætate, eisdem rebus assueuerint, eandem regionem inhabitent, cœperit ille ex ira febricitare, hic ex

exercitatione, quę ambę causę iā conque-
 rint manente febre, an non eadem curatione
 vtendum est? quid enim interest, hac aut illa
 causa egrotantem esse læsum, si diuersas cau-
 sas idem corporis affectus consequutus est?
 Cæterum Argenterius Castellonouanus vir
 acuto sanè ingenio, qui cum non esse studiosis
 hominibus iurandum in cuiusquā verba, ne-
 que antiquos autores pro dijs habendos, rectè
 censeat, tam nimiam licentiam arripuit vt nō
 sine multis erroribus singula Galeni placita
 studeat euertere. Accusat hac in parte eū cō-
 traditionis, quòd cū 4. methodi dixerit cau-
 sas procatharticas nō indicare ad curationē,
 quòd neque adhuc permaneant, neque re ali-
 qua indigeant, tamen concedit nono eiusdē
 operis libro, temperamentum quod fuit antē-
 quam homo laboraret, indicare curationem,
 atque consuetudinem, & victum qui ante ces-
 sit, & ætatem. Itaque (inquit) si consuetudo &
 hæc omnia indicant, indicent etiam & omnes
 causæ quantumuis elapsę sint, indicet etiam
 tempus quo quis incidit in morbum, quod ta-
 men indicare negat etiam Galenus loco cita-
 to. His argutijs adeò exultat Argenterius vt
 Galenum increpet vt nugacem, cū tamē hæc
 sua argumenta vt alia quam multa si res intel-
 ligatur facilè dilui possint. Nam quantū in-
 terest

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

terest inter innatū corpori temperamentū, ætatem consuetudinem, & inter procatharticas causas quæ iam elapsæ sunt? Certè febricitantem læsionis principium accepisse ab ira aut perfrigeratione, aut omnino sine euidenti causâ, ad coniectandum qualis affectus hominem prehenderit, non parum facit, sed re planè intellecta, nihil in curatione permutandum est gratia causæ, sed gratia illius quod in corpore ingenerauit: tamen hominē esse hoc temperamento natura sua, aut hac ætate, aut hac consuetudine, non modo ad facilius assequendum, quali teneatur affectu facit, sed hoc planè perspecto, curationis modum facit variare. Nam temperamentum natium, ætas, & consuetudo, sunt in numero rerum naturalium, ac proinde per morbos seruari debēt, quare addunt, aut detrahunt viribus medicamentorum, vt in hanc aut in illam partem inclinantia, cum morbo habent similitudinē (vt temperamentum calidum, ætas iuuenilis, vsus calidorum cum febre) aut dissimilitudinem, vt temperamentum frigidum, senilis ætas, frigidorum vsus cum coriza. At (inquit) hæc non manent per morbos, tamen indicāt. Quæ quæso non manent? an non inanet ætas? iā verò temperamentum quod erat antequam æger incideret in morbum, id quoque manet,

net, aliquatenus permutatum. Nam per morbos qui fiunt, temperamenta innata non sunt omnino euerfa, sed euertuntur. Consuetudinem ipse medicus debet per morbos conseruare, vt si non alia ratione, hac saltem curationis ratio permutetur. accedit, quod consuetudo non est ipse vsus, sed natura quædam aduentitia vsu comparata, quæ manet vsque dum aut longa vsus intermissione, aut contrario vsu deletur. Dicimus enim verè consuetudinem habere ambulandi, etiam eum qui sedet. Verùm hæc diffusè satis docuimus libro octauo controuersiarum med. cap. quinto, cui titulum dedimus de consuetudine, & natura, hic obiter dicta sint propter calumnias argenterij.

CAPVT V.



Quum igitur nunc videamus, non vnum modum, neque generationis, neque auctioris caloris, quandoquidem neque ipsius ignis, sed vel propter motum, vel

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Vel propter putredinem, vel propter consuetudinem cum altero calore, vel propter suppressionem calidi efluvij, vel propter permissionem substantiæ calidæ, vel quodam ex fonte effluentescentis aut genitæ, scilicet ut ad sensum nostrum, vel agentis calorem, omnino est necessarium & febrivm causas in dictos modos reduci. Veluti protinus vstio, siue ipsius solus actio, talem habet appellationem, siue ipsa quæ in nostro corpore fit passio, siue quæ iam est facta, est quidem ea ipsa calor præter naturam, febris tamen nondum est, nisi concalescerit cor. Totum sanè hoc genus causæ ex consuetudine fit cum re calefaciente, siue sol, siue ignis, siue pharmacum sit, quod calefacit extrinsecus oppositum, aut appropinquans, aut contingens, aut utcumque aliter quispiam nominare velit. Ira autem velut ferbor quidam, & vehemens motus est irascibilis facultatis, in corpore ipso cordis residentis. Concalescit autem cum illa aliquando spiritus, est cum & sanguinis substantia, atque si parata sint corpora quæ susceperunt, ad diutius retinendum calorem, etiam si cordis motus sedetur, manent

nent hæc præter naturam calida, & febricitare hominem necesse est. Talis igitur febris principium habet motum & feruorem caloris insiti, quæ autem ex tristitia fit, non item feruorem, sed tantummodo motum. Quæ vero ex lassitudine, principium quidem & ipsa habet motum plurimum, musculorum, & reruorū, & ligamentorum, & articulorum, quæ quidem prima incallescunt, communicatur vero inde calor per continuum ad cor, & tunc febricitant. Quæ vero propter densitatem cutis accenditur febris, qualis maximè adstrictis & refrigeratis accidere consuevit, collecto in corpore mordaci effluuiο gignitur, disflantur enim semper animalium corpora duobus modis, abeuntibus quidem foras quotidie vaporosis fuliginosisque excrementis, attracta autem intro, refrigerante, & ventilante naturalem calorem aërea substantia. Cū igitur causa aliqua fortis condensans cutem prædictos meatus constrinxerit, sæpe in plethoricū affectum inducit, quando effluuium vaporosum ac vtile fuerit: est cum & in febrem inducit, quando acre ac mordax fuerit: & hinc

D præci-

DE DIFFERENT. FEBRIVM.

precipue, quia nihil intra corpus trahitur refrigerans, calor augetur. Acre autem ac mordax excrementū ijs effluit qui natura vitiosis succis magis abundant, aut ijs qui prauos cibos ingerunt, & frequenter cruditate laborant, præsertim, si post tales cibos, aut limosam, aut cœnosam, aut lutosam, aut palustre, aut stagnantem, aut alio quouis modo corruptam, aut putrefactam aquam biberunt. Eodem modo euenit & immoderate laborantibus, aut vigilantibus, aut cogitantibus, aut acris medicamenta frequenter ingerentibus. Cibos igitur prauos dico & natura tales, quemadmodum cepæ, allia, nasturtium, porrum, brassica, ocimum, urtica, & quicunque alij vocantur siluestres, veluti etiam & apud nos lapsanæ, & qui etiam natura boni sunt, ob putredinem verò quandā, prædictis æqualem, aut etiam sæpenumero maiorem, prauitatem contrahunt, quemadmodum triticum, ordeum, & aliæ omnes fruges esui aptæ, partim ob temporis longitudinem ad putridum affectum deductæ, partim situ propter prauam repositionem repletæ, partim verò à primo or-

tu vitia. Talibus igitur edulys & nunc. co-
 Eti vefci plurimi propter famem, alij quidem
 interierunt à putridis & peftilentibus fe-
 bribus, alij verò exanthematis scabiosis ac le-
 profis correpti funt. Cum igitur plenum fue-
 rit corpus talibus fuccis, nulla autem obftru-
 ctio in aliquo vifcerum fuerit, libere autem
 ventiletur ac refrigeretur per cutem totum
 animal, fanum quidem eft, fed lubricam &
 fallacem falutem habet, quando autem vel
 externa facies adstringitur, vel meatus pro-
 fundi obftruuntur, ex adftrictionibus quide
 nunc dictum, ex obftructionibus autem fla-
 tim dicendum februm genus fequitur. Nihil
 igitur mirum, cur ex ijs qui cruditate labora-
 nerunt, nonnulli quidem febricitarunt, alij
 verò non, nam plenis iam fuccis vitiosis, &
 ijs qui malè diffilabantur intempeftivè labo-
 raverint, aut balneis immodèftius vfi funt,
 promptum erat febricitare, qui verò bonis ple-
 ni fuerant fuccis, ac bene diffilabantur, &
 quieverunt, ventriculo & hepate robufti,
 non poterant febricitare. Manet enim illis
 tunc circa ventriculū & hepar quicquid cor-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
corruptum est, & spatio temporis paulatim
coquitur, atque bonum efficitur. Quemad-
modum & ijs qui vehementiores motus, aut
æstiuum solem sustinent, aut balneo dulcium
aquarum vtuntur, corrupti cibi in vniuersum
habitum corporis transsumuntur. Sic & eos
quibus corrupti cibi deorsum lati sunt, febris
non est sequuta, nisi aliã ob causam fiat, vt si
sepe surgendo in lassitudinem inciderint, aut
phlegmone ventriculi correpti fuerint.

Vlt Galenus modo docere, vt vltima præ-
cedentis capitis verba significarunt, qui
affectus in nostris corporibus fiat à singulis
causis manifestis, cum febris sit. Non enim il-
læ omnes eodem modo faciunt, sed diuersis.
redegit ergo omnes causas caloris libello de
causis morborum ad quinque genera. Omnia
enim quæ incalescunt, id pati dixit, aut pro-
pter motum, aut propter putredinem, aut pro-
pter viciniam rei calefacientis, aut propter
constrictionem, aut propter cibum calidum.
Itaque quæcunque causa calefacit, aliquo ho-
rum quinque modorum facit. Quod Galenus
postquam hæc ita proposuit in principio ca-
pitis, decurrens per singulas causas, aut saltem
per

per multas earum, ex quibus febris solet oriri, inductione monstrat. Ut estus solis, & res omnis calida extrinsecus occurrēs; vicinia rei calfacientis est causa: ira & metus, motu, animi scilicet. Constrictio cutis, cohibitione calidi effluuij. Vtus prauorum ciborum, corruptione aut putredine. Itaque hic est capitis huius discursus: Quandoquidem febris nihil aliud est quàm calor, eedem erunt cause febris quę caloris. Proinde ergo repetit hic illa eadem quę libello de causis morborum de caloris causis erant dicta. Quod illic dixit (est caput 2. lib. de causis morborum) propter constrictionem, hic vocat retentionem calidi effluuij, quia constrictio non aliter potest facere calorem, quàm retentione substantiæ calidæ, quæ efflueret. Quod illic dixit, propter cibum calidum, hic rem magis distinguens, dixit propter permissionem substantiæ calidæ, velut ex quodam fonte efferuescentis, aut genitiæ ad nostrum sensum, vel augmentis calorem. Nimitum sub hac differentiæ quinta oportet intelligi cibum, & potum, & medicamentum calidum quodcunque interiùs assumptum, & quidquid interiùs efferuescit. Atque ita quinta hac differentiæ tam latè patente, nomine motus, non opus erit intelligere & motus corporis & animi, sed motum secundum

DE DIFFERENTI FEBRIVM.

dum locum. Nam erit omnis animi perturbatio calorem faciens, motu innati calidi, aut ferbore, aut utroque. De causa quæ motus calorem facit, dictum abunde est à me libro quarto cōtrouersiarum cap. de morborum causis. Illud nunc philosophis omnibus concedamus, ne huc transcribamus demonstrationes, motum esse causam caloris, de putredine etiam, quòdque res omnes quæ putrescunt calore præternaturam afficiuntur, dictum ibidem est, & latius adhuc in commentarijs 4. libri meteoron Aristoteli. An dictæ modo caloris causæ numero quinque, ad pauciores reduci possint, disputant nonnulli, dicentes putredinem posse silentio præteriri, ubi dicta sit adstrictio, & cibum, & potum, ubi dicta sit vicina rei calidioris. Tamen nos in sequentibus dicemus, quod in quinto libro cōtrouersiarum cap. vltimo monstrauimus, & libello de inæquali intemperie ex ipso Galeno confirmauimus, non semper putredinem nasci ex obstructione. Cetera verò, multò distinctius loquitur Galenus, alterationem à rebus extrinsecus occurrentibus viciniam appellans, à rebus verò interiora peruadentibus, permissionem. Itaque leuis est hæc quæstio, & minime necessaria. Illud satis constat, nihil à Galeno superflue hic dici. Nā si ad pauciora

membra causas caloris reduxisset, loqueretur
 obscure, & non tam apertè. Iram ferborem es-
 se, & motum vehementem animi, satis con-
 uenit inter omnes. Diximus nos de illius essen-
 tia, & vi multa in quinto libro controuersiarum.
 Irascibilem facultatem residere in corde om-
 nium philosophorum est opinio, nam de alia-
 rum facultatum concupiscibilis inquam & ra-
 tionalis sedibus est controuersia, tamen irasci-
 bilem, quæ eadem est vitalis nuncupata, nul-
 lus nisi in corde collocauit, nisi fortè vnus Pe-
 lops medicus, qui vt Gale. inquit. 6. de plac.
 omnium instrumentorum originem cerebrum
 esse putabat, contra prorsum ac Aristot. qui
 omnia deducit à corde. Platon tamen, cuius
 sententiam in 2. libro controuersiarum con-
 firmauimus, irascibilem solum facultatem in
 corde collocat. Tristitia reuocat intorsum ca-
 lidum innatum, tamen non feruescit, immò
 verò per se feruorem sedat. Adstrictio cutis,
 qualis fieri solet ex refrigeratione, aut à medi-
 camento aliquo, aut vi adstrictoria balnei ad-
 strictis, retentione calidi effluuij febrem facit.
 Verùm hæc effluuij retentio, non in omnibus
 febrem parit, sed in eis qui acerbis redun-
 dant excrementis. Nam quibus talia
 non sunt, potius fit ex cutis densitate ple-
 thora, quàm febris. Colligere verò solent

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

excrementa acris & mordacia, qui natura sua sunt abundantes malis succis (vocat hos Galenus cacochymos). & qui cibis mali succi utuntur, & assidue laborant cruditatibus, & multo magis qui post ingestos malos cibos putres aquam bibunt (solut esse putres aqua limosa aut cœnosa, palustris, aut stagnans). & iis, qui immodice laborant, aut vigilant, aut meditantur, aut assidue acris medicamenta ingerunt. Vt hinc constet, quantum ex re nonnullis, qui multis medicamentis assidue, non adeo magna causa obgere, ut prius. Pravi cibi & natura tales sunt, quicunque sunt pravi succi, cuiusmodi Galenus multa refert, allia scilicet, cæpe, nasturtium, brassica, radium, verrica, lapland, & in summa agrestia omnia odorata, talia omnino omnia pravi succi esse docet Galenus lib. de cibis bonis & malis succi. Verum licet tibi horum omnium capita legere apud Gal. in opere de alimentorum facultate (habere enim libellum, in quo pleraque propria capitula) non illorum nullam per te ipsum experies. Nasturtij & lapland capita sunt 7. de simpl. medi. facultate, ut non opus sit huc illa omnia transferre, sed illud tantum dicere, hæc omnia interius assumpta in pravi succos mutari quibus multos esse coactos, velci, per longam quandam famem, in caritate annona;

quæ

quæ multas nationes romano imperio subdi-
tas afflixit; & eos lapsos esse in multos morbos;
qui prauorum succorum sunt soboles, narrat
Galen. ipse libello dicto de cibis boni & ma-
li succi. Vbi in primis nota, multo aliter hic ac-
cipi nomen famis, quam in apho. illo secunda
sectionis, vbi famis laborandum non est, hic
enim significat caritatem annonæ, in aphorisi-
mo vero defectum cibi, non tamen vere dixe-
ris, vbi est caritas annonæ laborandum non
est. Potest enim aliquis, cara alioqui annona,
abundare, & laborare. Nomen hoc ^{Ex vñ} ~~Ex vñ~~ ^{ue}
non vñico modo, à Galeno vsurpatur, sed ali-
quando speciatim pro quadam specie pustula-
rum, de quibus dicam statim, aliquādo latius
patente appellatione, pro omni cuius macula,
vt patet ex libro de atra bile, vbi elephantem
inter exanthemata recensuit, his verbis, sed &
alia quoque pluribus non febrientibus exan-
themata percutem crassescentem, siccescen-
temque oriri videmus, vñque natura melan-
cholici humoris redundantiam foras extrudē-
te, cuius generis est is quem elephantem nomi-
nant. Itaque hoc Galeni loco, etiam elephas
est exanthema. Sed speciatim, quæ sint exan-
themata à græcis vocata dicit Celsus lib. 5. cap.
28. ita scribens. Modo circa totum corpus par-
tem ve aspredo quædam sit similis his pustu-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

lis, quæ ex vitica, vel ex sudore nascuntur
 ἱξανήματα græci vocant, eaque modo rubent,
 modo colorem cutis non exedunt, nonnunquã
 plures similes varis oriuntur, nonnunquam ma-
 iores pustulæ liuidæ, aut pallidæ, aut nigræ, aut
 aliter naturali colore mutato, subestque humor
 ex hac descriptione satis bene videtur mihi col-
 ligere multi neotericorũ ἱξανήματα esse quas
 hodie variolas & morbilos vocamus. Vt inter
 cætera similitudo quæ illis cum varis intercedit
 abunde declarat. Vt hinc variolæ nactæ sint
 appellationem. Hæc ergo exanthemata in ves-
 centibus, præannonz caritate, præiussu cibis
 oriebantur, vt hinc satis constet, falsam de va-
 riolarum causa nonnullos, inter quos est Hie-
 ronymus Fracastoreus opinionem concepisse,
 putantes menstrui sanguinis, ex quo geniti su-
 mus ebullitione tantum nasci. In infantibus e-
 nim ex dicta causa fieri non est improbabile,
 fiunt enim in illis sæpissimè, tamen nonnunquã
 etiam & in adultis ex præuo victu oriuntur, vt
 constitutiones quædam tales fiant, per quas po-
 pulariter illæ vagantur, & omnis ætatis tam vi-
 ros quàm fœminas afficiunt. Hæc exanthema-
 ta non perpetuo eiusdem formæ sunt, sed mul-
 tiplicis, vt ipsum etiam cellum dicentem audi-
 nimus. Decidunt verò nonnunquam ex illis re-
 fectis fursuracea quædam potissimum com-
 scal-

scalpuntur, quæ gratia similitudinis cum scabie scabiosa exanthemata appellantur, alia quidem liuida, alia nigra sunt, vt celsus etiam notauit, quæ quia cutem, vt lepra, maculant, leprosa vocantur, reliqua huius capitis nulla egent commentatione.

CAPVT. VI



Orrò in obstructionibus meatuum, & succorum stipationibus, (distuli enim dicere de hac re) animalia febri citant putrida febre, promptissime enim putrescunt quacunque calida simul & humida, & multa sunt in calida regione, nisi forte diffilentur ac refrigerentur. Nihil igitur mirum cur plethoras sequantur febres: etenim & obstructiones multa sunt, & vniuersum corpus, difficul.

DE DIFFERENT. FEBRIVM.

difficulter per spirabile per eiusmodi affectus. Quemadmodum per aliam plenitudinem ad facultatem cito veniunt ad corruptionem succi non victi neque bene cocti, utpote facultate illos elaborante, existente debiliore. Proinde & adulia quacunque glutinosa sunt & crassi succi, morbosiora, infarciri enim & stipari humorem ex ipsis provenientem, proprius est. Sed quid igitur? Nonne contraria ratione extenuantia & acria morbosa sunt? videntur enim similiter febribus alterari reducentes, in alterutro genere victus, quoniam prius dictum est, cacochimia esse talia omnia. Cacochimia igitur causatur: putredinis autem quacunque sunt glutinosa & crassa, fiunt febrium causa. Inflammata quoque particulae putredinis causa accendunt febres. Stipatum enim in ipsis quod influxit, quando calidum fuerit, quia non bene diffatur putrescit. Quando igitur exacte biliosa fuerit fluxio: erisipelatosus calor partem occupat, quando vero sanguinea, phlegmonosus, quod autem ex ambobus mixtum est, erysipelas fit phlegmonosum, vel phlegmon erysipelatosus. Nomen quidem

dem ab humore vincente accipiens, cognomen vero ab altero acquirens. Febris autem ex his omnibus communitatis ratione accenditur. Semper enim ab ea quæ calefacta est, continua illi pars calefit, donec ad cor affectus perueniat. Calefit enim simul continua pars à carbunculis, qui à calido manifeste sanguine, sed propter vstionem magis melancholico, generationem habent.

Q Vi dicebant Galenum tertio capite incipere disputare de causis febrium diariarum, in hoc sexto dicunt illum transgredi ad causas putridarum. Sed res non ita habet, neque illic coepit agere de solis diarijs, vt monstrauimus, neque hic agit de solis putridis, vt caput ipsum monstrat, in quo docetur modus generationis febrium, quæ gratia continuitatis sunt ab inflammatione, erysipelate, & carbunculo, quas in octauo capite docet nonnunquam esse diarias, nonnunquam putridas, atque adeo tunc esse diarias, cum quam hic scripsit generationem habent, puta per continuitatem. Galeni ergo multo præstantius est artificium, prius scilicet disputat de febrium communibus causis, deinde de singulis generibus perse. De causis febrium incepit disputare di
cto

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

Et capite. Et adhuc perstat in proposito. Dixit
 proximo capite angustia viarum esse duas spe-
 cies, aut enim esse στενωσις (ita vocat pororum
 cutis adstrictionem) aut ἐμφραξις .i. profundo
 rum meatuum obstructionem, docuitque ad-
 strictionem retentione calidi effluuij febres fa-
 cere, modo venit ad secundum, atque adeo de
 reriorem angustia modum, puta ad obstructio-
 nem, docetque hanc per putredinē esse febriū
 causam. Nam cum nihil sit quod adeo nationū
 rerum calorem conseruet, quā mediocris vē-
 tilatio, & putrefactio sit natiui caloris extin-
 ctio, merito quæ in loco obstructo, & imperspi-
 rabili reposita sunt, promptissimē putrescunt:
 potissimum si per se sunt ad putredinem parata
 cuiusmodi sunt calida & humida. Verū quod
 à Galeno dictum est, promptissimē putres-
 cunt quæcunque calida simul & humida sunt,
 & multa, in calida regione, animaduersione in-
 diget. Nam quæ calida & humida, & in ca-
 lida regione sunt, promptē putrescere, & à phy-
 losophis omnibus & à medicis est receptissi-
 mum, sed quod multa etiam facilius putrescāt
 quā pauca, aduersum videtur Aristoteli, qui
 quarto libro met. ca. i. scripsit, rem magnam à
 putredine magis vindicari quā paruum. Cæ-
 terum in enarratione illius loci, diximus quod
 hic breuiter repetendum est. Quando multitu-
 do

LIBER PRIMVS.

do facit, vt res ipsa sibi obstruat ventilationis
viam, multitudo est causa putredinis facilio-
ris, cum verò non obstruit, multa tardius pu-
trescunt paucis. De his ergo dixit Galenus,
& multa, quia de succorum obstruentium
multitudine sermo instituebatur: hac ratione
febris corripuntur promptè, qui multitu-
dine abundant, quamquam diuersa ratione
putrescunt succi in laborantibus plethora .i.
multitudine replente vasa, aut laborantibus
multitudine grauante vires. Nam illis accidūt
multæ obstructions, & putredines quoque:
his verò quia succi minus elaborantur à facul-
tate, quàm pro tanta copia, quare cum non
possint manere in alterati, putrescunt. Accedit
causa alia, de qua mox dicam. Verùm hæc de
laborantibus multitudine ad facultatem con-
sequentia sermonis obiter dicta sunt: hic de
multitudine quæ facit obstructions, est præ-
cipuus sermo, qua qui laborant promptis-
simè incidunt in febres, & promptissimè læ-
duntur à cibis glutinosi & crassi succi quam-
quam & ab extenuantibus & acris læduntur.
Videntur enim in vtroque victu, puta vsu cras-
sorum, & vsu acrium promptè lædi, qui redun-
dantes succis sunt, quamquam id contraria ra-
tione, ab illis, quia augent obstructions, ab his
quia

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

quia sunt cacochymia, & talia, in corpore alio
 qui non satis perflabili, quia est plenum, pu-
 trefcunt statim. Ex dictis satis constat, non ef-
 se legendum, vbi Galenus inquit, φαίνονται
 γὰρ ὁμοίως αλισκομένοι πυρετοῖς ἢ πλεονάζον-
 τες ἐν ἐκατέρῳ τῷ γένει διαίτης vt legit leoni-
 cenus. Videntur enim à febris similiter infe-
 stari, qui vtrâque victus rationem nimium
 sequuntur, quam lectionem sequutus etiâ est
 fuchsius verbis tantilum euarians, dicit liqui-
 dem, qui alterutro victus genere frequentius
 vtuntur. Nos verò prædictum verborum sen-
 sum assequuti non ita dicimus, sed πλεονάζον-
 τες pleni aut redundantes, succis scilicet,
 videntur similiter alterari febribus in alteru-
 tro victu. Nam quamquâ verborum contex-
 tus sensum alium fert, non minus apte quàm
 hunc & est etiam is sensus verus fert tamen
 hunc quoque, & quadrat maxime cum insti-
 tuto. Quorum enim cum in hoc capite propo-
 situm sit dicere de obstructionibus meatuum
 diceret modo de acribus succis, nisi modum
 quo hæc lædunt redundantes succis, quibus
 meatuum obstructiones sunt, significaret? ac-
 cedit quòd in quinto capite, quod huic est pro-
 ximum, dixit, ingestis malis succis & in ventri-
 culo corruptis, eos, qui pleni iam erant & ma-
 le

le diffilabantur, febricitare, eos verò qui bene diffilabantur, maxime, si quieuerunt, perseuerasse sine febre. Modo ergo hoc idem asserens nō indistinctè dicit, à cibis acribus febricitare qui ijs nimium vtuntur, & redundates succis, qui acribus cibis vtuntur. Partes etiam laborantes tumore aliquo præter naturam ex calida fluxione, (has enim omnes appellat Galenus hoc in loco inflammatas particulas, cū statim subiungat, has aliquando laborare erysipelate, aliquādo phlegmone speciatim dicta, aliquando phlegmone erysipelatoſa, aliquādo erysipelate phlegmonosa. Et paulo infra mentionem facit carbunculi, qui in hac significatione est phlegmone, cuius acceptionis meminit ipse Gale. 4. de ratione victus in acutis commen. 21.) causa putredinis faciunt febrem, quanquam hæ febres plerumque sunt in genere diariarum, cum scilicet communicato calore cordi per continuas partes fiant; calor vero in ipsa particula fit succo illic putrescente, quia calidus est, & in obstructa particula conclusus. Carbunculum fieri ex sanguine valde calido, & propter adustionem facio magis melancholico, docetur libro de tumoribus præter naturam, & 14. methodi, & docebitur etiam rursus. 2. capite libelli secundi huius operis. Disputant in capitis præsentis enarratione multi, an omnis

E

putre

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

putredo fiat ex obstructione, ego quoniam huic
 quæstioni caput proprium dedi in quinto libro
 controuersiarum, non est quod hic quidquam
 dicam, præterquam quod exigit capitis enarra-
 tio, scilicet Galenum hic non dicere putredi-
 nem omnem fieri ex obstructione, sed obstru-
 ctionem facere putredinem. Quare nihil no-
 bis repugnat qui dicto in loco confirmaui-
 mus, fieri posse putredinem non in alijs corpo-
 ribus solum, sed etiam in humanis sine obstru-
 ctione, neque solum sine obstructione, sed etiã
 sine prohibita ventilatione. Nam interest quã
 multum sine obstructione aut sine prohibita ve-
 tilatione dicere, quod illic ostendimus, & mo-
 do attingemus. Potest ventilatio difficilis fieri
 sine omni obstructione : nam in multitudine
 ad vires (hoc enim est quod paulo antè dicere
 distuli) fieri potest vt absit omnis obstructio, ta-
 men difficilis ventilatio non aberit, cum pro-
 prium illius signum sit pulsus paruus, inæqua-
 lis inæqualitate multorum ictuum. Cum ergo
 membrorum calor pulsu ventiletur, fiet in eo
 affectu ventilatio difficilis, non quòd via de-
 sit aut obstructa sit, sed quòd ea non satis di-
 lateretur. Accedit itaque iam alia causa putre-
 dinis in hoc affectu, præter eam quam Galenus
 modo scripsit.



*Alidiores autem ambien-
tis nos aeris constitutiones,
quales maxime circa canis
ortum sunt, per inspiratio-
nem quidem manifeste cor
ipsum calefaciunt, extrinse-
cus autem circumfusa corpori, totum ipsum ca-
lidum efficiunt, ac praesertim arterias, ut quae
non nihil substantiae ipsius ambientis aeris tra-
hant, è quibus omnibus simul affici cor necesse
est, & ubi immodice incallescit, primū & ma-
xime febrilem affectum obtinere, atque toti
corpori immittere, in pestilenti verò aeris sta-
tu, inspiratio plurimum est causa, sit enim &
aliquando ob eos qui sunt in corpore humores
ad putrescendum paratos, cū breuem aliquam
occasionē ad febris originē ab aere ambiēte ac-
ceperit animal. Magna autē ex parte, ex inspira-
tione incipit aeris circūstātis à putrescibili eua-
poratione vitiat. Putredinis autē principium,
vel cadauerum multitudine non crematorum,
quemadmodum in prelijs contingere solet, aut
ex aliquorum, vel lacuum, vel paludum, aestatis*

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

tempore euaporatione: contingit autem quandoque præcedere ambientis aeris caliditatē immodicam quemadmodum in ea pestilentia quæ athenienses inuasit, vt thucydides inquit, sed in tugurijs suffocantibus æstatis tempore habitantium corpora corruptione laborant, at quia humores corporum ex victus prauitate erant putredini obnoxij, hinc febribus pestilentibus origo data est, forte autem per continuum ex ethiopia quædam putredinis fluxere contagia, his, quorum corpora erant ad patiendum parata, febrium causæ futura.

R Etulit Galenus paulo ante inter causas febrium aërem ambientem, qui non aliter quam vicinia rei calidæ febrem facit, si calidus est, & putredine, si simul est putris. Dixit non minus in tertio capite febrem pestilentem ab aëris pestilenti constitutione fieri, hoc docet modo quâ ratione fiat, possit enim fortassis videri improbable ex aëre tanta mala in corpore generari: verum tamen consentaneum satis est: non enim solum aere vtimur, vt ambiente & loco in quo degimus, sed illius substantiam vsque ad cordis penetralia, inspirando & pulsando, trahimus, itaque calidiores aëris

ris constitutiones dupliciter fiunt febrium caussa, manifeste quidem per inspirationem, ita enim calidus aer cor ipsum contingit, minus manifestè, calefaciendo simul totū corpus, cui circumfusus est aër, & præsertim arterias, vtpote nonnihil substantiæ ipsius aëris trahentes. Quibus omnibus coeuntibus, inspiratione inquam & attractione per arterias, & contactu per corpus totum aëris calidioris, necesse est cor primum & maximè incallescere, & calorem in totum corpus transfundere, id verò est febris. Eodem modo cum aër pestilentem constitutionem habet, inspiratione potissimum facit febrem pestilentem. Constitutio pestilens est, cū aër est putridus, aut paratus ad putredinem. Putrescere solet aër, largis imbris præcedentibus, & subsequenti ingenti calore: aut quia ab exhalatione putrida est contaminatus. Hæc exhalatio ex paludibus, aut ex corporum inhumatorum multitudine solet prodire. Paratus putrescere est aër quicūque calidus & humidus præter naturam. Aër qui putris iam est, plerosque homines solet inficere, et si illi non sint alioqui valde parati ad putredinem, qui verò nondum est putris, sed paratus putrescere, eos tantum inficit, qui humores habent in corpore ad putredinem aptos, hi enim homines corripi solent febre pestilenti, et si ab aëre exiguum febris illius

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

principium acceperint. Cæterū utcūque homo febre pestilenti corripiatur, aeris constitutio in causa est. Nam quamcunque febris causam vel lis fingere, nisi aeris constitutio pestilēs accedat febris pestilens non erit. Namque ut Gale. ipse docet. i. epid. part. i. cōm. i. febris pestilens est, quæ multos homines tollit, & populariter grassatur, inuaditq; plærosque homines. Causa ergo pestis in rem aliquam omnibus hominibus cōmunem reijci debet, non in aliquibus peculiarē, est verò cōmunis omnibus solus aër, hūc enim tantummodo nullus potest effugere, nisi solum mutet. Vnde satis liquet eas febres, quæ ex vernalibus fructibus proueniūt, non esse pestilentes, nisi forte hinc sumpto initio, putridæ ex laborantibus corporibus, & rebus alijs putrescentibus exhalationes, aerem ipsum infecerint. Nam melones aut pepones aut similia alia imprudentes & inopes ingurgitant, diuites & prudentes, non ita. Nulla itaq; febris pestilēs fit nisi ex aeris pestilentis constitutione, si verò nō sumus oblitī eorū quæ paulo antè diximus, mōstrantes nihil esse, quod res citius trahat ad putredinē, quā intranspirabilitatē, satis cōstat nullos facilius peste correptum iri, cum ea est in aëre constitutio, quā eos qui obstructis sunt poris, & in locis intranspirabilibus, cuiusmodi sunt qui suffocantia tuguria degunt, quod vel

ex

ex eo loco quem ex thucydidis lib. 2. belli pelo-
ponesiaci refert Gal. licet intelligere.

Oportet enim huius meminisse semper to-
to hoc sermone, q̄ nulla causarum sine patien-
tia aptitudine agere potest, alioquin omnes qui
sub æstiuo sole commorantur, febricitarēt, aut
qui nimio motu exercentur, aut vini potu gra-
uantur, aut ira excandescentes, aut tristitia af-
fecti, febricitarent, alioqui etiam, vt arbitror,
circa canis ortum omnes ægrotarent, ac in pe-
stilentijs morerētur. At vt diximus, magnam
in generatione ægritudinum partem habet, eius
qui passurus est, habilitas corporis. Supponatur
igitur, vt in exemplis, in ambiente quidem æ-
re nonnulla pestilentia semina contineri, ac ea
quæ ab ipso corpore continguntur, nonnulla qui-
dem esse varijs superfluitatibus plena, idem ex
seipsis ad putrescendum parata: nonnulla autē
pura atq; inutili materia carētia, ac primis qui-
dē adiūgatur in multis corporis partibus obstru-
ctio foraminū, atq; ea quæ plethora vocatur, et
vita otiosa in multis crapulis, ac rei venereæ vsi-
b' immoderatis, atq; his, quæ necessario oīa quæ

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

nuper diximus, consequuntur: cruditatibus: reliquis verò omnibus corporibus, puris ac superfluiatibus omnino carentibus, adsint præter hæc bona, libera in omnibus spiratio meatibus, cum obstructionibus atque adstrictionibus carent, exercitia etiam sint moderata, victus temperatus, ac deinceps his suppositis, cogita quomodo utraque corpora affici sit necessarium ab eo, quem inspirant, aere pestilenti. An non rationabile est, illa quidem statim à prima inspiratione principium putredinis sumere, ac plurimum in malo procedere? Eorum verò quæcunque vacua sunt excrementis, & pura, quædam nullo modo, quædam vero paululum laborare, ac facile ad naturalem habitum habere regressum? sic & cū aeris temperatura à naturali habitu ad caliditatem atque humiditatem immodice fuerit conuersa, pestilentes quidem oriri morbos est necessarium, plurimum verò eisdem laborare, quicunque fuerint superflua pleni humiditate, quemadmodum qui modicis laboribus se exponit, ac victu utitur moderato, in omnibus huiusmodi dispositionibus nullam omnino sentit offensionem.

Per

PER duas Hypotheses docet Galenus, qui homines facillimè corripiantur peste, & qui minimè, referens interim omnia, quæ faciunt ad facile patiendū aut difficulter. Primumque accipit illud axioma, nullam causam agere sine dispositione eius quod patitur. Est id principium à philosophis omnibus sine controuersia concessum. Nimirū nō quod liuet est natum agere in quodlibet, sed oportet inter agens & id quod patitur analogiā quandam esse, quod quia principium est, nō aliter quàm ab experimento confirmat Galenus. In ijs quæ in ambabus hypothesibus dicuntur nihil est intellectu difficile. Multorum excrementorum redundantia, illorum putredine, obstructio pororū & plenitudo, prohibione transpirationis: Otiosa vita, multæ epulæ, & ebrietates, & immodicus vsus veneris, cruditatibus, fiunt pestis causæ, cum alioqui in aëre est talis dispositio. Contraria contrarijs rationibus prosunt. Constitutis duabus contrarijs hypothesibus, inquit Galenus, priores statim in primâ inspiratione putredinem contracturos, & multum in illa facturos progressum. Posteriorum verò, eorum inquam qui sunt vacui excrementis & puri, & facillè perspirabiles, & reliqua habent quæ in secunda hypothesi dicuntur, quosdam nullo modo, quosdam le-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

leuiter illa febre laborare. Ex hoc loco rursum intelligo, Galenum opinari fieri posse putredinem sine obstructione. Nam aliter qui tales essent, quales qui in secunda hypothefi describuntur, ne leuiter quidem laborarent pestilenti febre, hæc enim non possit esse sine putredine. Verum res habet ut diximus, est putredinis maxima causa obstructio, sed neque sola, neque necessaria. Proinde qui obstructione carent, corripì quidem possunt putridis febribus, sed leuissimè laborant. Quod aëris constitutio, calida & humida, pestilens sit, licet intelligere ex Hippocrate 3. apho. & 1. & 3. epide. multisque alijs in locis.

Hic sermo in vno quidem exemplo prolatus est, sed nihilominus in omni genere causæ veritatem complectitur, & quicumque integrè in eo vult exerceri, de præincipientibus causis legat librum. Equidem ego in præsentia prolixitati parcens, vno capite vniuersa comprehendens, finem sermoni constituam. Oportet siquidem in omni causarum genere, diligenter aduertere, ex qua maximè potentia egrotare contingat, deinde corporum dispositiones: tam quæ eisdem consentiunt, quam

quam quæ aduenſantur conſiderare, illud pro
 comperto habentes, quod quacunque con-
 ſentientes ſunt, facillimè laeduntur: contra-
 riæ autem ac renittentes, quantum viri-
 bus ac magnitudine contrarietas valet, tan-
 tum inuietas perdurare contingit. Vidi ego
 aliquando in tali temporis ſtatu, qualem, ait
 Hippocrates, in cranone fuiſſe, non paucos
 carbunculos graſſari per populum, quorum
 erat generatio eadem, omniaque alia quem-
 admodum ſcribit Hippocrates exquisitè ſi-
 milia: & quidem quacunque in tertio libro
 qui epidemia inſcribitur, de peſtilenti aëris
 ſtatu ab Hippocrate referuntur, in altero ei-
 dem ſimili pari modo euenerunt, erat autem
 eorum ſumma, vt oſtendit Hippocrates ipſa
 putrefactio, quod cum nos præuidiſſemus, ſta-
 tim ab initio quacunque corpora humida vi-
 debamus, omni via exiccare conabamur,
 Quæ verò ſicciora, in his antiquū habitū con-
 ſeruabamus. At in quibus ſuperfluitates re-
 dūdabāt, hæc purgationibus ſanabamus: ob-
 ſtructiones autē foraminū aperire, atq; abſter-
 gere ſtudebamus. Sed hæc quodammodo artus
 curati-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

curatiua propria esse videntur, neque in ambiguo est, quin plenius de hisce sit à nobis in eo loco dicendum. Nunc verò de ipsis volui facere mentionem, cum eum prosequeremur sermonem, in quo quemadmodum ab eadē causa inualecente, nonnulli quidem à febris corripuntur, nonnulli autem illæsi perseuerant, exponeremus. Cum enim corporum dispositiones dissimiles sint, ac multiformes, quædam faciliè alterantur, ac patiuntur à causa in ipsa operante, quædam insuperabiles, ac impassibiles omnino existunt, quædam cum difficultate patiuntur. Ad huius verò rei demonstrationem coacti etiam sumus curationis meminisse, non aliter affecti, quàm Hippocrates qui quodam in loco per similem modum vulgatissimum illud dictum cōscripsit, ostendit autem curatio. Est igitur & quæ præ custodia dicitur curatio quodāmodo, sed ipsa videlicet nomina apud medicos sæpius cōfunduntur, sicut enim in altero libro est à nobis ostensum, omne medici opus est, errorum, qui circa humanum corpus eueniunt, correctiuū. Sed nihil ista subtilitate sermonis hoc

in

in loco indigemus. Siue enim in duo nomina diuidas totam, curationē, ac præcustodiam, siue ambo in vnum colligas, curationem nominans, non paruam coniecturam affert eorum dispositio, qui à pestilentibus, atque in populum grassantibus morbis affici prohibentur, quod non æque omnes ab eadem causa patiantur, vna si quidē ac prima est in omnibus communis intentio, quod corpus quā maxime superfluitatibus vacet, atque optime spiraret, secundo loco post hoc, vt præpotenti causæ, quod ad fieri potest, aduersetur, at quibus eorum contraria insunt, celerrimē capiuntur, ac quā maxime laborant.

Scripsit Galenus libellum de causis procatarticis, in quo disputat aduersum sophistas quosdam, qui non intelligentes quod modo dicitur, nimirum causam nullam agere, nisi in id quod paratum est pati, quantunius causa potens sit, contendebant: externas causas non esse febrium causas, quoniam dicebant, si æstus esset febris causa, omnes in æstatis tempore febricitarent, atque eodē modo de reliquorum singulis argumentabantur.

Sed

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Sed non est quòd hæc longius percontemur, cum à Galeno de illis habitus sit longus sermo, potissimùm cum ne pueri iam ignorent, ridiculas esse illas argumentationes. Illud vnum sciri oportet, quod toto illo libello monstratur, causam nullam afficere posse corpus quopiam modo, nisi illud commode dispositum sit. Deinde ita se debet medicus exercere, vt Galenus hic monet sapientissimè, vt cognoscat scilicet, quæ sint ad morbi cuiusvis generationem facilem facientia, & quæ ad difficile, vt cū mali alicuius periculū instat, sciat corpus ita disponere, vt quàm minimè fieri possit eo afficiatur (vt gratia exempli, sciens Galenus multò antè, cum ex ijs quæ ab Hippocrate scripta sunt, tamen etiam proprio ratione & proprio experimento, calidam & humidam aëtis constitutionem pestem minari, & corpora excrementis plena, & male dissolubilia promptè ea corripere: quam primùm anni decursus hæc minabatur, corpora humida exiccabat, plena euacuabat, impura expurgabat, obstructa aperiebat, hæc vt faciamus interim monet: est enim hæc quoddammodo curatio. Nimirum præcautiō à morbis, optimus comparandæ sanitatis modus est. Sed opportunum fuerit vt quod ad præsentem tractationem facit quàm maximè, & alio in loco

loco Gal. dixit, hic nos apponamus. Quæ scilicet corpora sint ad febres paratissima, & quæ minus. Loquemur verò hic de temperamenti. hoc docet Galenus octauo libro metho. capitibus octauo & nono, cuius sententiam conatus est Auicena exprimere fen. prima 4. verum non effecit. Immo scripsit hac de re nimis obscure & inculte. Cum nouem sint corporum temperies, quatuor simplices, totidem duplices, vnica mediocris, quatuor citius corripuntur febre, quàm temperata, quatuor difficilius, atque hoc ipso quo hic scribentur ordine.

Calida & sicca

Calida & humida

Calida tantum

Sicca tantum

Temperata

Frigida & sicca

Frigida tantum

Humida tantum

Frigida & humida.

Cali-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Calida & sicca omnium citissimè corripitur febre, quia illius naturæ, quæ calor siccans est, maximè est analogia. Calida & humida secundo loco, quia quanquam ex dicta analogia ratione, non deberet ante calidam tantum recenseri, tamen humor cum calore facit ad facilem alterationem, potissimum ad ardorè gratia copiar sanguinis. Calida tantum recensetur antè siccam tantum, quia quamquam hæc duæ singulis qualitatibus congruunt cū febre, & singulis discrepāt, tamē calor multo plus facit ad facilem passionem, & quia est qualitarum potentissima, & quia febris essentia in calore consistit, siccitas accedit illi, non vt essentia pars. Mediocris temperies quatuor has statim sequitur. Nam reliquæ quatuor longiùs absunt à calido & sicco affectu, quàm mediocris. Vt hinc satis cōstet, vanum omnino esse eorum dogma, qui temperatum hominem omnibus causis resistere plus quàm alios omnes homines asseuerant. Verùm hæc in primo libro cōtrouerfiarum latissimè docuimus. Frigida & sicca tanto minus congruit cum febre, quàm temperata in oppositione calidi & frigidi, quanto in alia oppositione humidi & sicci plus, vt videri alicui possit, tam promptè incidere in febres quam temperatam, verùm nō facit, sed aliquanto tardiùs : quia, vt dixi, non
facit

facit tantum ad hanc passionē siccitas, quantum facit calor, aut impedit frigus. Dices tamen hac ratione oportuisse recenseri humidam tantum antè frigidam tantum. Quia nō vsque adeo impedit humor quàm frigus. Ita sanè haberet, nisi per humidam tantum, redundarent plures crudi succi, impediētes ardorem, quam per frigidam tantum. Ergo septimum locum tenet frigida tantum, octauū humida tantum, nonum frigida & humida. Hac enim omni ratione est à febre alienissima. Perpende tamen dictum hic esse has naturas hoc ordine in febres incidere; non quod in quāscunque febres hoc incidunt ordine (neque enim in putridas ita incidunt) sed quod in februm plura genera, diarias scilicet & hecticas; & quod in febres eas quæ omniū februm facillimè generantur, puta in diarias. Sed si roges speciatim in putridas febres quæ natura est paratissima, & quæ deinde, aliis excogitandus est ordo, quem Galenus non scripsit ego tamen ita scripserim.

Calida & humida

Calida & sicca

Humida tantum

F

Cali

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Calida tantum

Temperata

Frigida & humida

Frigida tantum

Sicca tantum

Frigida & sicca.

Nam calor & humor sunt putredinis cause

maximè, ergo analogia putredini natura est ca-

lida & humida. Secundum locum habet ca-

lida & sicca, non analogiæ causa, sed excre-

mentorū calidorum, quæ habet, humida tan-

tū. & calida tantū, singulis qualitatibus sunt a-

nalogæ, verū plus facit ad putredinē redun-

dans humor, quàm sine illo calor. Eadem ra-

tione, frigidam tantum colloco antè siccam

tantum. ~~Et~~ Tenus respondimus de paratis ad

febres putridas. Si quis rursus distinguens am-

plius illarum genera, interroget, quæ naturæ

sint ad tertianam, quæ ad quotidianam,

quæ ad quartanam, quæ ad continentem pa-

ratissimæ, alij ordines excogitandi erunt, sed

satis fuerit hebes qui ex dictis non poterit

hos

hos per se ipsum excogitare, vel saltem ex ijs
 quæ dicentur modo. Calidus & humidus pa-
 ratissimus est ad febres continentes, colligit
 enim hæc temperies multum sanguinem ex
 quo febres has prouenire ex sententia Galeni
 sumus in secundo libro monstraturi. Vt tem-
 peries aliqua ad hanc propius accesserit, aut
 ab hac longius haberit, ita ad eam febrem pa-
 ratior erit, aut minus parata. Temperies me-
 diocris vt nullo morbo afficitur promptè, ita
 ad nullum est ineptissima, sed habens se me-
 diocriter. Temperies frigida & humida est
 paratissima ad quotidianam, alia vt propius
 aut minus ad hanc accedunt. Calida & sicca,
 si multum calida est, ad tertianam est aptis-
 sima, quandoquidem biliosa est hæc natura,
 vt & ipsa febris, si verò parum calida est &
 valde sicca, ad quartanas febres. Hæc enim
 natura, quantum in ipso temperamento agi-
 tur, multam congerit melancholiam. Non
 enim, vt plerique putant, frigida & sicca na-
 tura membrorum melancholiam multam ge-
 nerat. Quæ enim frigida est, vtcūque habeat
 patientes qualitates, serosa est aut pituitosa, nõ
 melancholica. Frigus liquidè facit incoctione,
 quare crudos vocatos succos generat, eos inq̃
 qui citra sanguinẽ sunt, cū verò multa siccitas cū
 modicè exuperatẽ calore est coniuncta gratia

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

siccitatis fit densus sanguis, & gratia caloris, partis tenuis bona portio absunitur, fitque ita melancholicus succus. Vnde luce clarius patet, id quod libro primo controuerſiarū diximus, male à quibusdam appellatione succorum distinguere temperamenta corporum, cum melancholicum hominem dicunt, frigidum & siccum se putantes dicere. Sed à quibus temperamentis qui succi proueniant quarto libro controuerſiarum abunde monstratum est. Quod verò hæc quæ de melancholica temperie modo diximus, ex sententia Galeni sunt, abundè declarant verba illa tertij de sympt. causis, sed & alteratricis potentie intemperies, quæ ad calidius sit versa, alias biliosum, alias melancholicum efficit excrementum, ad frigidius verò mutata vel pituitosius vel aquosius facit excrementum. Sed hæc satis iam definita sunt.

CAPVT VIII.



ED quoniam pestilentium februm mentionem feci, quæ omnes à putredine ortum habent, operiprecium

praeium uidetur, ut hoc loco sistentes, sermo-
 nem de antiquo dogmate consideremus, om-
 ne febris genus ex putredine fieri asseueran-
 tem. Siquidem eius sententiae esse periclitatur
 omnis ab atheneo chorus, viri tum in ceteris,
 quae ad artem pertinent, tum praesertim in fe-
 brium contemplatione minimè contemnen-
 di. De quibus ego magna ex parte illis consen-
 tio, nisi quod eas quae ephemera nominantur,
 excipio. Neque enim videtur mihi hæc humorū
 sequi putredinem, sed qui quidem ex solis in-
 cendio febricitat, ab agentis causae caliditate
 affici natura aptus est: qui vero ex ira, &
 huic feruorem aliquem eius, qui circa cor,
 sanguinis fieri est necessarium, non tamen e-
 tiam putredinem: sic es qui supra modum ex-
 ercitatus est, vehemētior caliditas præter na-
 turam sine humorum putredine in corpore ac-
 cenditur, & cui cutis adstricta est, cum prius
 acriores superfluitates per eam euaporarent,
 postquam retentæ sunt, ac coaccervatæ, inci-
 dit in febrē, nulla interueniente humorū putre-
 dine. Et quæ in inguinum tumoribus, graeci
 (Βυβωνία appellant) febres oriuntur, om-

DE DIFFEREN. FERRIVM.

nes sunt malæ exceptis ephemeris, quodam in loco, inquit, Hippocrates & quidem eius partis tumor ex genere est inflammationum, & ad hoc assentior illi, qui de putredine, sermoni: eius enim ratione inflammationibus, quæ græci φλέγμονας vocant, febricitare contingit, non ea quæ erasistratus opinabatur. Sunt tamen quedam febres in inguinum tumoribus à genere ephemerarum, quemadmodum & aliæ quedam non facile tractabiles morbos ex ulcere, aut inflammatione, aut abscessu, aut aliqua huiuscemodi altera in visceribus dispositione ortum habentes ostendunt. Differunt autem quæ in inguinum tumoribus febres oriuntur, ab his quæ humorum putredine eueniunt: quæ vel in aliquo viscerum, aut in cauis & maximis vasis ortum habent, quoniam quæ in inguinum tumoribus fiunt, concalescunt semper partes cōtinuas, donec usque ad cor febrilis attingit calor, non peruenit autem ad ipsum putrida fuligo, sed ibidem permanet in loco inguinis circumscripta sola alteratione per continuum facta, usque ad cor perueniente calore, quo maxime

me modo in his, qui solis calore deuruntur, aut
la situdinem patiuntur, à primis partibus ca-
lesfactis vsque ad vitale principium caliditas
permeat. In putredine autem humorum quæ
fit in vasis magnis, aut in visceribus, quidam
veluti fumus ex putrescentibus humoribus
ad cordis ventriculos tendit. Et quidem in
tumoribus inguinum omnes simul humores
putrescere solent, siue per vnum, siue per duos
continuos dies, vt qui in vicem adhæreant,
atque in vno loco concludantur, at qui in vi-
sceribus sunt, vasisque magnis, vt quæ conti-
nuò fluant, suoque contactu vicinos ad putre-
dinem trahant, spatio temporis putridum ca-
lorem accendunt. Vna autem ratione, quem-
admodum in extrinsecis omnibus, quæcunq;
præter naturam ex quauis causa calefiunt, si-
quidem imputrescibile sit, quod calefit, veluti
lapis, vel lignum, aut tale aliquid aliud, eo vs-
que durare caliditas solet, donec paulatim re-
frigerentur. Quod autem putrescere natura
aptum est, semper ad continua dispartitam
continet caliditate. Quemadmodum aliquando
in agro cõspexi, excrementa iumentorum simul

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

ac columbarum, quadam ex parte à sole adeò
vehementer calefacta, quod instar fumi mul-
tam euaporationem in sublime emittebant
non parum mordacem ac dolorificam. & si
quis proximè accessisset; nares, oculosque la-
dentem, ipsa etiam excrementa tangentibus
adeò calida sentiebantur, ut qui longiore tem-
pore manus & pedes admonisset, exurere-
tur, non tamen continuò huiuscemodi casus
perdurabat, sed in die qui sequebatur, quic-
quid superiori die ad summum feruoris perue-
nerat, refrigerabatur, quod autem huic conti-
nuum erat, dum prima pars, quæ calorem con-
ceperat, in summo esset feruore, ipsum interim
paulatim successum, mox Priori feruore re-
mittente, interim incalebat, atque afferuescebat,
& paulo post, priori parte refrigerata, ipsum
summum feruorem obtinebat, hocque rursus de-
feruescebat, dum pars continua paulatim suc-
cedeatur, quæ paulo post vehementius accen-
sa, ad summum feruoris perueniebat. Hic au-
tem circuitus in vnius fere diei spatio perage-
batur, adeò ut res quotidiana febris, quam
græci amphimerinum appellant, propriissimum
esset

esset exemplum. Quod si duabus diebus ac noctibus idem circuitus factus fuisset, tunc febris tertiana eo modo esset exemplum, & si tribus quartana, & quatuor quintana. Siquidem & quintana febris existit: ego enim nondum liquido vidi, neque huiusmodi circuitum, neque alium qui ultra quatrduanum protenderetur, sed de febribus, quæ per circuitus accessiones habent, postea dicitur.

HActenus disputauit Gale. de causis febriū indistinctè, modo incipit disputare de singulorum generum causis, estq; caput hoc octauum de generatione diariarum, caput nonum de generatione putridarum, deinde differet de earum notis, quibus expletis, ad finem libri huius de generatione & speciebus & signis hæcticarum differet. Ergo vt dicat modū quo diariæ febres generantur, refutat opinionem athenci, putantis febres omnes fieri ex putredine. Cæterum est quod expendamus illa verba quæ in principio capitis per transgressionem dicuntur à Galeno. Sed quoniam febrium pestilentium mentionem feci, quæ omnes à putredine ortum habent. Nam videri possit alicui falsum (quod hic asseritur) omnes febres pestilentes à putredine habere ortum, quandoquidem

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

videtur hinc sequi, omnes eas esse in genere putridarum, tamen Galenus ipse. 3. de præfagatione ex pulsibus prolixè disputauit de hæcticis pestilentibus. Nonnulli hic dicunt febres omnes pestilentes habere ortum ex putredine, aëris scilicet, verum tamen ego sensum hunc non probō, quamquam quod asserunt verum sit: nam oportet vt antecedentia consonent cum consequentibus, & vt contextus ipse sit consonus. ergo eodem modo Galenus asserit pestilentes febres habere ortum ex putredine, quo athe-næus assererat febres omnes. Hic verò non ex causæ externæ putredine, sed internæ, febres produci putabat. Itaque ego intelligo, febrem omnem pestilentem pendere à putredine, etiā eam quæ hæctica est. Scilicet hæctica pestilens, est per quam ipsum cordis alimentum putrescit. Nam aliter qua ratione putemus differre has hæcticas ab aliis hæcticis? Sed hæc explicata sunt, & monstrata, quinto libro. Contro. hic satis fuerit locum enatrasse. Itaque inquit Galenus, non omnes febres fiunt, vt putauit athenæus. ex humorum putredine, sed excipio diarias. Poruisset etiam hæcticas excipere, verum hic loquebatur de febribus fientibus, postmodum, vt dixi, ager de factis, & habitualibus seorsum. Non itaque febris diaria pendet ex humorum putredine, sed ab externis causis fit, vt so-

lis

lis ardore, ira, constrictione cutis. Et quia solis ardore febricitat, ab ipso efficientis causæ calore, (inquit Gal.) alterari solet, ne intelligas membrum illius à sole ipso incalescere, nulla interius substantia facta calida, ut videtur verba ipsa significare, sed nullo interius humore calore habituali affecto. Solus enim spiritus in his febricitatibus inflamatur, & cordis substantia inalefcit, citra humoris alicuius putredinē. Quanquā nonnullę febres diarię causam habēt in humorū putredine, quales sunt quę ex inguinū tumoribus pēdēt, cæterū & in illis, putredo habet vicē causæ externæ. Nā ex bubonibus possunt fieri febres diarię & putridę, diarię sūt ex particula inflamata, cū nulla putredo ad cor trāsmittit sed solus calor per cōtinui alterationē (atq; ita patet putredinē vicē habere causæ externæ) putridę fiunt cū fuligo putrida (inquit Gal.) nō cōrineretur in ipso loco inflamato, sed ad cor ipsum peruenit. Proinde inquit, viscerū inflammationes putridas febres solere facere, quod ab illis & ppter viciniam, & viarū amplitudinē, fuligo putrida semper cor attingat. Hęc Galen. sed monstratum à me est, libro quinto Controversia. capit. 23. febres omnes, quę ex inflammatione aliqua pendent, & vere febres accidentia sunt, esse in genere diariarum, quoque putrida febris sit, non esse satis, internam aliquam

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

aliquam inflammationem esse, nisi putredo venis comunicetur. Ergo non satis est, ut febris ex inflammatione pendens putrida sit, fuliginem putridam usque ad cor ipsum venire, nisi humores venarum infecerit: id quod nunc quoque hac ratione monstrabitur. Fuligo nisi humores infecerit, non potest reddere urinam crudam, at verò crudas urinas apparere primas, est proprium & inseparabile signum febris putridæ, ut docet ipse Gale. cap. 11. huius libri, ergo fuligo transmissa solum non facit putridam febrem, nisi humores inficiat. Quia verò ex interna inflammatione raro non venit ad cor tanta fuligo, ut humores vitiet, raro non febris pendens ex interna inflammatione transit in febrem morbum & putridam: quamquam nonnunquam per totam pleuritidem vidimus in urina signa coctionis perseverare, quo casu febris in genere diariorum est, durans tamen tam multum tempus propter præsentiam causæ. Sed quæ febres sint febres morbi, & quæ accidentia, & ut dignoscantur, ac reliqua omnia ad hanc rem attinentia, loco dicto docuimus. Modo ita hunc locum enarramus, cum putrida fuligo cor ipsum attingens humores vitiat, febres putridas facere. hoc quidem accidere ex inflammatione interna nihil mirum, immò verò raro non accidit, quia copiosissima fuligo incorvenit, tamen ab externa in-

flammatione venientes fuligines humores corrumpere, & putridas febres facere, malum est cum enim fuligines non possint venire valde copiosæ, signum est humores ad corruptionem esse paratissimos: fient ergo febres malignæ, atque ita optima ratione iuxta hanc meam sententiam dixerat Hippocra. quarta aphorif. 53. ex adenum tumoribus febres omnes malæ, præter diarias. Neque tamen quod à Galeno dictum est, febres diarias fieri à bubonibus continui alteratione, tollit quo minus fuligo venire possit ad Cor manente adhuc diaria febre, possunt, siquidem ambo fieri, alteratio per continuum & transmissio fuliginis, vt ex corruptis in ventriculo cibis diaria febris fit, quâquam ad cor fuligines ex corrupto cibo veniant, neque prius putrida sit febris, quam corruptio humoris in venis & arterijs inuadat. Tandem, si humores non putrescunt, cor patitur calorem, vsque dum causa procathartica euanescente ipsum paulatim refrigescit, vt accidit rebus quæ à re aliqua calefiunt, & non putrescunt, vt lignum, lapis, aut ferrum, si verò humores putrescunt, febris iam fit pendens ex illorum putredine, atque ita magna ex parte per intervalla repetit, quia illi per partes putrescunt, vt sterquilinia solent, sed quia exemplum stercoris dilucide scripsit Gal. & putridarum differentius liber secundus dica-

DE DIFFERENT. FEBRIVM.
tur est, modo hæc sufficiunt.

CAPVT. IX.



Vmorum autem putredo, quæ in vasis fit, similis est ei quæ in inflammationibus atq; abcessibus accidit, alijs collectionibus, duplex quidem secundum genus, ex duobus autem generibus miscella alia tertia secundum speciem euariat, quâdo & innumerabiles miscellæ modi in eo, quod magis & minus reperiuntur, at duorum generum, alterum quidem fit superante natura, alterum verò superata, & superante quidem sicut in inflammationibus, & similibus collectioni tum moribus omnibus pus: in humoribus autem qui inueniuntur atque arterijs continentur, quoddam, quod puri proportionem respondet, subsidens in vrinis. At talis quidem putredo, non simpliciter putredo existit, sed aliquid in se continet co-
Etionis

ctionis. Nam adhuc vi coquendi vasorum remanente, qui interim putrescit humor: ad talem peruenit alterationem. Sed & alterum est putredinis genus, cum ea vis cui coquendi officium est demandatum, adeo imbecillis facta est, ut nullam amplius facere possit in putrescente superfluitate ad optimum transmutationem. Quod quidem contingit nonnumquam cum eadem vis ad vltimum imbecillitatis peruenierit, etiam si id quod putrescit, mediocriter sit viciatum. At fieri potest interdum, ut vis quidem ipsa non omnino sit imbecillus, humor vero putrescens, maxime sit vitiatus. Huius superfluitatis putredo neque consistere, neque aut colorem aut odorem habet vnum, sed semper secundum substantiam permutatur, ac multis modis euariat illud quod putrescit. Altera autem putrefactio quam & concoctionem esse diximus, semper ad vnam puris speciem terminatur, colorem ac consistentiam suscipit, & odorem. Superante vero integre ipsa natura optimum fit pus conspectui album, & crassum, & versus quaque simile sibi, lene autem tangenti, ac minime fetidum. Si vero semi putridum fuerit, tertium in tali

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

ali transmutatione genus, quod paulo ante diximus, fit. Dictum verò & illud est, quod multiforme huiusmodi genus existit: nam in eo quod magis & minus suscepit coctionem, est innumerabilis differentia. Sæpius enim cum colore album factum sit, vel foetidum odorem, vel tenuem substantiam obtinet, sæpius verò non album aparet, sed liuidū: atq; in his omnibus magis ac minus infinitis modis euariat. Quotcunque verò in abscessibus putredinis sunt differentia, totidem & in febribus, quæ ex putredine accenduntur, sunt eorum quæ in Urinis apparent formæ. Optima verò Urina quæ ex putrescente humore coctionem à continenti vasse suscipiente, perficitur est: quæ album & lene & æquale & minime foetidū sedimentum habet: pessima autem est, quæ in omnibus; maxime contrario modo se habet: quæ verò intermedia existit, quanto proprius ad alteram accesserit, tanto aut melior aut deterior existit. Sed de Urinarum differentia in commentarijs de crisi bus dictum est.

Differit

Differit Galen. de solis putridis, hæ enim pē
dent solæ ex putredine humorum, quæ fit
in vasis. Galenus hoc in loco apertè vocat
putredinem alterationem materiæ morbificæ,
vt cumque ea cedat, siue inquam morbus salu-
tari sit, & fiat bonum vrinæ contentum, (con-
tentum enim in vrina ex materia ipsa morbi
generationem habere in febricitantibus mon-
strarum à me est lib. 3. Controuersia .capit. 24.)
siue lethalis, & fiat malum, siue in tumore præ-
ter naturam suppuratio fiat, quas alterationes
solet innumeris alijs in locis coctiones appella-
re. Quæ res nonnullos barbaræ rim impulit, o-
pinari, materiam morbificam per incrementū
morbi salutaris, & in suppuratione inflamma-
tionis, simul quoque & putrescere, idque duo-
bus motibus. Quoniam vero hi duo motus, co-
ctio inquam & putrefactio contrarij sunt, vt
illorum rationes declarant, videtur plerisque
hæc sententia absurda, proinde ego vtrorumq;
rationibus pensatis, incommodisque ex il-
lorum opinionibus accidentibus, rectè mihi vi-
deor excogitasse, ipsamque Galeni sententiam
hac in parte attingisse, eam materiam neque co-
qui neque putrescere solum, atque vt quis dixe-
rit, coqui simul & putrescere quodammodo,
moueri scilicet alteratione quadā, vnica illa qui-
dem, sed inter illas media, ita vt quantum ab-

G est

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

est à ratione coctionis, tantum accedat ad putredinem, quam sententiam & aperuimus multo latius, & confirmauimus quantum oportuit, lib. 5. Controuer. cap. 4. & in commentarijs quæ in quartum librum metheorō Aristor. scripsimus. Modo illud vnum monstrandum est, ex præsentī Galeni capite, maxime sententiam hanc ellici posse: Quod satis eius verba declarant. Primum differre incipiens de hac alteratione putredinem illam vocat, paulo infra inquit atqui huiusmodi putredo non simpliciter putredo existit, sed etiam aliquid concoctionis habet statim altera, inquit, putredo quam & concoctionem esse diximus. Itaque coctionem & putrefactionem, inquit, continere, atque partim esse hoc, partim illud, aut ergo duæ hæc simul fiunt, aut media quædam alteratio, quæ quodammodo est vtrumque. Illud non posse accidere euidenter ratione monstrauimus dictis in locis, sed modo melius fuerit Galenum hæc dicentem animaduertere. Quod si verò (inquit) semi putridū fuerit, tertium genus in tali transmutatione, quod paulo ante diximus, consistit. Itaque tertium genus alterationis vocatur à Galeno suppuratio, haudquaquam duo motus simul. De vrinarum differentia agit Galen. sermonis cōmuniōe coactus, verum proprius locus apud illum

illum eius disputationis est caput duodecimū
 primi de crisi- bus. Nam liber de vrinis est spu-
 rius. Ego compendiolum quoddam de vrinis,
 iam edidi præter multa quæ in com. pronostici
 dixi, & de vrinis & de puris conditionibus.

CAPVT. X.



Ebres autem quæ in humo-
 rum putredine accendun-
 tur, alias ab ephemeris o-
 portet existimare, neque
 earum discretio difficilis
 est, quamquam nonnullis
 videatur esse impossibilis. Nos verò hoc mil-
 lies re ipsa probauimus, prima accessione fini-
 ta lotum hominem, ac mediocri cibo refectū,
 ad consueta opera transmittentes, vt qui alte-
 ram febris accessionē sensurus nō esset. Neq;
 nos nostra æstimatio fefellit, Vnum verò hoc
 est februm ephemerarum præcipuum indi-
 cium ab aliqua incipere causa euidenti ac ma-
 nifesta quæ antè præcesserit, quas omnes
 medici iuniores vsitato vocabulo proca-
 tarticas, sine præincipientes appellant.

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

*sed et si hoc inseparabile sit talium febrium, in
 dicitum tamen earum proprium non est, nam et
 aliarum quadam ex causa manifesta fiunt,
 quæ ante præcessit. Inseparabile verò & pro-
 prium est, coctio in vrina statim die prima, ac
 præterea pulsus ad magnitudinem, ac celerita-
 tem effatu dignam accidentes, ita vt frequen-
 tia à proportionem deficiat secundum extero-
 rem quietem. Est autem magis inseparabile ac
 proprium, quod nullo modo ad celeritatem ea
 pars pulsus, quæ systole dicitur, tendit, et si ali-
 quando contingat hoc, minimum ac vix perce-
 ptibile existit, parumque à naturali tenore mu-
 tatum, Sed & caliditatis suauitas proprium at-
 que inseparabile est huiusmodi febrium indi-
 cium. Inseparabile quoque, æqualis atque inco-
 pressus ascensus in caliditate ac pulsibus simul,
 non tamen proprium, cum & alijs quibusdam
 adsit, sicuti etiam consistente febre mediocri-
 tas, neque enim hoc etiam est proprium, quam-
 quam his maxime inest: ac melius quidem fue-
 rit, hac quæ per incrementa & vigores com-
 munia sunt, quod diarijs maxime insint, inter
 propria collocare, fieret enim hoc pacto, & si
 nequa*

nequaquam sit, rei ipsius forma quin etiam
 & pulcherrimum, atque exquisitissimum hu-
 iusmodi febrium, adhuc & proprium simul
 atque inseparabile signum, sicuti & cum sudo-
 re, aut rore, aut omnino cum aliquo optimo va-
 pore declinatio, ubi integra febris cessatio se-
 quatur, hæc quidem est communis febriū epha-
 merarum indicatio. Nam postea de earum sin-
 gulis speciatim dicemus.

CAput hoc continet signa febrium diariarū
 quarum cognitionem haud quaquam dif-
 ficilem esse dicit Gale. quamquam primo
 ad glauco, cognitu difficiles esse dixit, ceterū
 hoc rethoris est. nunc proposita rei difficultate
 captare attentionem, nunc animum facere le-
 gentibus. Scire licet, signum inseparabile non
 proprium, esse quod rei omni conuenit sed nō
 soli: Proprium non inseparabile, quod soli sed
 non omni; Proprium & inseparabile, quod om-
 ni & soli. Ergo incipere à causa procatartica, in-
 separabile est à febre diaria. Nā si est febris dia-
 ria, incipit à causa procatartica (causa procatar-
 tica est quæcunque euidens & manifesta cau-
 sa) non tamen est illi proprium, non enim si ex
 causa procatartica incepit, statim est diaria.
 Nihil enim prohibet propter humorum ad pu-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

trudinē apparatus, ex procatartica causā putrida excitari ante aliud febris genus, id quod in sequenti capite fiet manifestius. Secundum signum est coctio primo die apparēs, propriū & inseparabile, quia nulli putridæ potest addesse. tertium est magnitudo & celeritas pulsus, ita vt externa quies longior multo sit, quā pro magnitudine aliarum partiū, & ita à proportionē deficiat, quod proprium etiam est, ac inseparabile. Quod vt intelligatur, sciri oportet, quietēs pulsus, non fieri, vt quidam putant, per accidens causa motuum contrationum, sed per se & à facultate, ac propter eosdē vsus propter quos motus ipsi, puta externa quies propter tractionem aëris vt dilatatio, interna propter expurgationem vt constrictio. Ergo cum crescit vsus dilatationis, crescit etiā externa quies multum, nisi simul crescat vsus constrictionis: tunc enim anticipans constrictio detrahit de tēpore quietis externæ. Proinde ergo per diarias febres, crescit quamplurimum externa quies, quia trahēdi aëris est magna necessitas, expurgandi fuligines minima. Eadē prorsum causa accidit quartū signum scilicet contractionē minime in celeritatē crescere: Quod etiā propriū est, quia in putridis necessario crescit celeritas illius: est etiā inseparabile quia nulli diariæ, soli cōsistēti crescit

hæc celeritas, vel si interdum crescat id minimū est: quod additū puto, propter nonnullas diariarū, in quibus fuligines quædā aëris colliguntur, quales sunt febres ex cōstrictione cutis, & ex cruditatibus. Eodē modo sentiendū est de quinto signo, quod est suauitas caloris, est scilicet propriū & inseparabile, quia putredinalis omnis calor, est mordax, nulli verò diarię est mordacitas, aut ea est quā minima, in ijs qui ex cōstrictione cutis, aut ciborū corruptella febricitant. Est aliud signū æqualitas & ascensus liber ac incompressus, facilisq; (hęc enim significat nobis dictio ἀλιωτος) tum pulsus tū etiā caloris. Scire oportet calorem dici æqualē hic, eo q̃ non habet manifestā inæqualitatē. Nā si exactē loquaris nullus calor fies est equalis, vt mōstratū est in cōmen. libelli de inæquali intēperie. Pulsus æqualitas, si integrā æqualitatem significat, vt neq; collectiuā neq; in eo. dē ictu, neq; in parte aliqua pulsus inæqualitatē admittat, propriū & inseparabile est febris diarię. Nā à nulla febriū putridarū potest abesse inæqualitas ea, quæ à Galen. appellatur febrilis: Ea est inæqualitas eodē ictu secundum partes dilatationis. Hanc abesse à solā diaria docet. i. de art. cur. ad gl. c. 2. (hęc li. 3. cōt. explicuimus) equalitas tñ hoc in loco significat solā collectiuā, cū qua nihil phibet cōiūgi inæquali

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

febrilem quando Gal. inquit, equalitatē pulsus & caloris, & vtriusque liberum accensum, quāquam signum inseparabile sit à febre diaria, nō tamen esse illi propriū, quia hæc quibusdam putridis insunt, vt continētibus, & alijs ardētibus & tertianis etiā exquisitis, potissimū in augmento & statu. Nā in plerisque principiis putridarū caloris & pulsus est compressio, & in nullis nō est compressio aliqua, verum per augmenta & vigores cōmunia sunt hæc multis febribus. Cæterū inquit Gal. hæc quæ per augmenta potissimum & vigores communia sunt, possunt vocari quodāmodo propria, nō q̃ solis diariis insint. sed q̃ illis insint potissimum præ alijs omnibus febribus. Ex dictis nullis nō intelligit, in quāto errore sit fucsus, qui ita legit, ac melius quidē fuerit, hæc quæ cōmunia sunt q̃ per incrementa ac vigores diariis maximè insint, inter propria collocare. qui duobus modis peccat primū nō reddit verba greca fideliter, deinde proponit rē cuius in cōmentatio nullā potuit probabilē causam reddere. Nā græcus codex habet. και κατὰ τὸν γε τὰ κοινὰ τὰ ὑποκατατάσσονται εἰς τε καὶ τὰς ἀκμὰς, ἐν τῷ μάλιστα ὑπὸ ἔρχεται τοῖς ἐφημέροις, ἰδιὰ τιθεῖται. Id est, & melius quidē fuerit hæc quæ cōmunia sunt per incrementa & vigores, eo q̃ præcipue ephemeris accidāt inter propria colloca-

collocare. Eundem sensum expressit leonice
 nus, quamquam subobscore, ita dicēs & me-
 lius sanè hæc, communia existunt, marescen-
 te febre, ac consistente, quoniam magis ophe-
 meris insunt, inter propria reponere. Fusius
 ergo volens emendare, corrumpit locum. Nam
 quo pacto non sit absurdum dicere, hæc signa
 propria diariarum fieri, eo quod per incre-
 menta & vigores illis potissimum insint, cum
 alijs etiam febribus per incrementa & vigo-
 res potissimum insint. Quod si per incremen-
 ta & vigores superant diariæ alias febres, per
 initia multo magis superant, iam verò si tem-
 pora tēporibus his conferre, multò plus supe-
 rant his signis incrementum & vigor, tempus
 principij, in quibusdam putridarum, quam in-
 diarijs. Legendum itaque est vt diximus. Vi-
 goris etiam mansuetudo est dicto modo pro-
 prium & inseparabile signum diariarum, quia
 illis præcipuè inest. Significat mansuetudo vi-
 goris hic, haud quaquam remissionem calori-
 ris (is enim intentissimus est) sed tolerantiam
 facilem, & caloris suauitatem. Vltimum signū
 est proprium & inseparabile, inclinatio cum
 sudore, ac madore, aut quodam vapore sua-
 ui, quam vno die naturali factam perfecta in-
 regritas excipit. Nam vt Gal docet: cap. 1.
 de arte medendi ad glauc. & nos sumus in-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
Secundo libro huius operis monstraturi, in nu-
la alia febre pulsus ad naturalem habitum re-
uertitur.

CAPVT XI.



*Iterum Verò febrivū
genus, quod epheme-
ris ex aduerso distin-
guitur, nullum quidē
nomen cōmune sora-
titum est. Sunt autē
duæ primæ differen-
tiæ, quæ non obscu-
ram habēt specierum discretionem. Nā quæ-
dam ex istis in putredine humorum accēdun-
tur, quædam Verò ipsas solidas occupant ani-
malis partes, atque eas hecticas febres appella-
runt, vel quando firmæ ac fixæ sunt, quemad-
modum habitus, aut quando ipsum corporis
habitum comprehenderunt. Sic enim vocare
consueuerunt solidas partes, humidis ex aduer-
so distinguentes. Indicia Verò febrivum, quæ
humorum ratione accendūtur, hæc sunt. Pri-
mū quidem non inseparabile sed propriū,
hic* *quod*

quod nulla earum quæ præincipientes causæ dicuntur, eas antecedit, neutri enim aliorum generum hoc incst. Quoniam ephemera omnes à procatarticis, siue præincipientibus causis originem habent: hecetica autem quando sine his generantur, nunquam ab anitio inuadere consueuerunt: adeò ut ubi quis sine præincipiente causa cœpit febricitare, scire oporteat huius causam in humoribus esse. Illud verò nō nunquā vsu venit, quod aliqua ex præincipientibus causis sui ratione febrē accēdit ephemera. Subsequitur autē altera ex putredine humorū, qñ q̄ afficit corpus, ad id habile fuerit, hoc est qñ impurū extiterit, ac superflua materia redundans. Hæc enim cū in ephemeris immoderatū calorē cōtraxerit, atq; hinc putrescēdi principiū acceperit, alterā speciem febrī succēdit, priore desinēte. Vnū verò propriū simul atq; inseparabile in omnibus successionis inditiū, q̄ febris ephemera quietē integrā subsequētem nō habet. Comingit verò aliquando ubi ephemera febris consistit aliquod permutationis inditium ostendi. At multo magis cum iam cœperit declinare, quo tempore, id quod paulo antē dicebamus,

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
*ea tranquillitas abest, quæ adesse deberet.
Hæc quidem sunt permutationis inditia.*

Hic scripsit Galenus signa febrium putridarum. Primum initium est incipere sine causa procatartica, hoc verò nō est inseparabile. Nonnullæ enim putridarum vt in superiori capite diximus, incipiunt à causa procatartica, est tamen proprium: nulla enim aliarum febrium potest incipere sine illa, nisi fortè hectica alijs superueniens, incipiens verò à principio, non potest. Hic disceptant enarratores, quid sit apud Galenum ab initioprehendere, aliquem morbum, dicunt enim nonnulli, illud non esse inuadere à principio, ac nullo alio morbo prægresso, sed primis tribus, quatuorve diebus inuadere, quandoquidem (dicunt) Gal. febres putridas aliquando à causa procatartica incepisse dicens, eas inquit, fieri accensa primum febre diaria, deinde ea in putridam permutata propter humorum aptitudinem ad putrescendum. Itaque Galenus febres eas putridas incepisse dicit, quanquam prægressis diarijs fierent. Accedit quòd idē Gal. 10. meth. cap. 5. loquēs de muliere quadā ægrotante (inquit) hanc quarto die vidimus, deprehendimusque ab initio febri-

citare.

citare hectica febre, cum ea quam humorum putredo excitauerat coniuncta. Ergo (dicunt) Galenus eo q̃ quarto die iam teneretur hectica, affirmauit mulierem ab initio illa laborasse. Docent itaque Hi nullam hecticam posse ab initio generari. i. nulla alia febre pregressa, posse tamen quodammodo inuadere ab initio. i. primis diebus, atque tunc quoque ex causa procathartica malum incepisse. Eodem modo dicunt putridam non posse fieri à causa procathartica, nisi per mediam diariam, tamen quod primo die permutatio fiat, perinde medicos loqui, ac si ex causa procathartica à primo insultu incepisset, hæc dicunt quidam. Tamen vt libro quinto controuersiarum docui hi docent falsa, & Gal. malè interpretatur. Monstratum enim illic est, hecticam febrem posse fieri à principio, ibidemque argumentis quæ à contraria opinione sunt, respondimus. Modo hæc duo oportet vt mōstrentur, posse putridā fieri à causa procatartica nulla alia febre præcedente, deinde Gal. ab initioprehendere, nihil aliud esse quàm nullo alio morbo præcedente. Deinde locum enarrabo. Primum ergo ita monstro: potest fieri febris putrida nulla alia prægressa, sine causa procathartica, ex sola præparatione humorum, ergo potest fieri à causa procathartica cum humo-

tum

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

rum præparatione, ab ipso primo insultu, ac nulla alia prægressa febre. Adde quod nullus est in artis operibus, tam parum exercitatus, qui non viderit sæpe, oberratum aliquod in iunctu, consequutū esse febrem incipiēte à rigore. Cum ergo quæ à rigore incipit, putrida sit à principio, constat ab errato fieri putridā nulladiaria prægressa. Iā verò Galenū ubi dicit, à principioprehendit, intelligere nulla alia prægressa, constat etiam. Nam si esset incipere primis diebus, posset hectica fieri à principio sine causa, procathartica, quod ille negat, dicens: hectica quoties sine ea consistit nunquā ab initioprehendit. Quod verò posset ita incipere hectica, hinc intelliges. Potest fieri, permutatio diariz in hecticā primo die aut secundo: ergo potest fieri causi in hecticā quarto die, quo facto cum causum non sit opus incipere à causa procathartica, fiet quarto die hectica sine causa procathartica, id verò erat à principioprehendere, ergo potest hectica sine causa procathartica ab initioprehendere. Non est ergo apud Galenum ab initioprehendere, aliud quā nullo alio morbo prægresso: Quod si ad mulierem illam ex decimo meth. quarto die venit, cognouit coniecturis illam à primi diei initio hectica laborasse. Sed nunc tempestivum iam est, ut lo-

cum

cum enarremus. Primum (inquit Galenus) initium putridarum est incipere sine causa procathartica, quod quidem non est inseparabile, quia non valet hæc consequentia, est febris putrida ergo incœpit sine causa procathartica, cum possit fieri putrida ex tali causa, ut nuper à me monstratum est: tamen est proprium: nulla enim alia febris potest fieri à principio sine causa procathartica. Valet ergo hæc consequentia, incœpit sine causa procathartica, ergo est putrida. Obiter hic Galenus nos monet, cuiusdam permutationis frequenter contingentis, diariæ scilicet in putridam, & signa docet, ad cognoscendum permutationem hanc fieri. Monuit verò nos huius permutationis, potius quàm aliarum quæ solent accidere, quia cum primo die aut in initio secundi fiat, facile sit decipi, putantes à principio fuisse putridam. Oportuit ergo hæc, hoc in loco doceri, quo præcipuè de diariarum & putridarum dignotione agitur. Igitur inquit, ubi enim excrementa in diarijs febribus plus æquo calefacta sint, atque deinceps initium putredinis inde acceperint, alterum febrium genus accendunt priori sedato. Ex his ultimis verbis, colligunt, nonnulli barbarorum, non posse putridam febrem cum diaria componi, quandoquidem Galenus inquit, putridam succedere priori sedata, quod si tamen simul

DE DIFFEREN. FERRIVM.

esse possent, non opus esset priorem sedari, ut alia succederet. Nos verò libro quinto controuersiarum confirmauimus contrariam sententiam, posse inquam quancunque febrem cum alia quacunque componi, exposuimusq; locum hunc, succedere aliud genus februm (putridam scilicet) priore (diariam intelligit) sedato, non statim ac secundum genus incipit, sed sua hora: quia verò diaria est breuissimi temporis inquit Galenus, sedata priore febre, ut solet, aliam succedere. Itaque ex praesenti loco neque quod ad incæptionem neq; quod ad complicationem februm attineat, video desumi posse quidquam ijs sententijs, quas dicto in libro cõfirmauimus, aduersum.

Febrem verò à rigore initium sumere, ubi neque ardor solis, neque frigefactio valida præcesserit, qualis præsertim per niuem facientibus iter contingere solet, aut qui aliter in vehementi frigore diutius commorantur, proprium. Et hoc existit signum, febriū, quæ ex putredine accenduntur humorum, non tamen inseparabile, neque enim omnibus inest, quemadmodum neque horrores ipsi sunt ab huiusmodi febribus inseparabiles, sicuti neque

neque ab initio propriè.

DE rigore & horrore dictum est à Galeno secundo de sympt. causis, & in secundo huius operis dicitur, à me dictum est libro quinto controuersiarum: modò illud vnum dicam, rigorem fieri horroris intensiōe. Incipere febrem à rigore exclusis vehementi frigore aut ardore est proprium putridæ febris: tamen non est inseparabile. Quandoquidem nō omnis putrida febris incipit à rigore. Horror verò neque proprium neque inseparabile est. Ex his satis liquet, posse fieri vt febris incipiat à rigore & vt sit diatia, scilicet cum eadē manifesta causa facit & rigorem & febrem. Quod de horrore dictum est à nullo video rectè enarrari. Dicunt enim quidam horrorem neque proprium esse putridis febribus, neque ab eis inseparabilē, quia non omnes putridæ ab eo incipiunt, & quædam diatiæ incipiunt, puta quæ ab æstu aut frigore initium capiunt. Sed hi perinde dicunt de rigore. Nullum ergo dicunt discrimen inter rigorem & horrorem, quod tamen oportet dici. Alij dicunt horrorem non esse proprium febris, quia potest fieri horror, cui nō succedat febris. Quasi verò non possit etiam fieri rigor, cui nulla succedat

H

cedat

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

cedat febris. Neutri itaque horū mihi videntur quidquam dicere, quod aliter possimus de rigore, atque de horrore sentire. Mihi verò ita videtur: posse febrem diariam incipere ab horrore multis de causis, quibus non possit incipere à rigore, & ab illis etiam causis à quibus diaria cum rigore fit, posse fieri cū horrore, & illis quidem multo leuioribus: proindeque voluisse generatim cum quibusdam limitationibus rigorem proprium dicere putridarum, horrorem verò non proprium. Pro horrore enim plurimis limitationibus erat opus. Nam ex rigore non potest incipere febris diaria, nisi sit ex solis ardore, aut vehementi frigore, ex horrore autem incipere etiā potest quæ ex satietate, & quæ ex ciborum in ventriculo corruptione, & quæ ex leui frigore, aut calore fit.

Inæqualitas verò pulsuum atque caloris, siue in principijs, siue in augmento contingat, est huiusmodi febrium generis proprium inditiū, non tamen Erysipsum inseparabile multa enim & sine insensibili inæqualitate incipiunt, atque ad consistentiam accedunt.

Inæqualitas sensibilis caloris, est propria putridarū, non quæcunq? Nā diaria febris in æqualis intemperies est. Inæqualitas collecti-

un pulsus, est, non inseparabilis à febre putrida. Nam inæqualitas febrilis, quā in superiori capite explicuimus, inseparabilis ab omnibus putridis est.

Iā Verò multo minus neq; illud. Si neq; accessiones plures faciant, veluti insultus, Quod superaccendi vocamus.

Habere multas accessiones, est repetere per circuitus.

Quæadmodū neq; pulsus cōpressio (sic autē vocāt, cū incipiente accessione satis paruos, atq; inæquales eos habent.) neque enim hoc ipsum ab hisce febribus est inseparabile, non tamen alicui alteri generi febrium commune sed proprium istarum, ac peculiare: sicuti & inæqualitas ipsa, nisi alicuius accidētis ratione superueniat sepe. Vbi enim succus aliquis vitiosus in ore ventriculi fuerit accernatus, qui ipsum aut mordeat, aut refrigeret, parui simul atq; inæquales, & paruitas quidē in frigidis, inæqualitas verò in mordacibus accidit. At vbi euomuerit hæc ambo protinus cessāt. Cum verò ipse ventriculus omni noxa vacat, ad propositum febrium genus pertinent huius modi pulsus.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Pulsus parvus & inæqualis appellatur compressus, qui per putridas febres solet apparere, potissimum per initia accessionum. Est proprium signum putridarum, nisi alicuius symptomatis ratione fiat. Nam ratione febris ipsius, à nulla alia fieri potest, quàm à putrida. Itaque pulsus compressus, non accidens ratione alicuius symptomatis, est signum proprium putridarum febrium: tamen non est inseparabile, in multis enim febribus, etsi putridæ sint, nunquam pulsus is apparet; cuiusmodi sunt continentes. Symptoma verò nulum est, quod euentius eum pulsum faciat, quàm affectio oris ventriculi, ab humore prauo mordere, aut refrigerante, quamquam humorem esse mordentem, aut refrigerantem, differentiam habet in pulsu: refrigerans siquidem paruos magis quam inæquales, mordens inæquales magis quam paruos facit pulsus. Ergo considerandum erit apparente per febrē pulsu paruo & inæquali, an dolor ventriculi adsit, aut tale aliud symptoma: si nulum adest, febris putridæ inuasionem agnoscere licet. De pulsu qui affectum stomachū sequitur scriptū est à Galeno 4. de causis pulsuum cap. proprio.

Maximum Verò inditium febrium putridarum est, qualitas caloris. Nihil enim in eo
suauē

suaue, neque moderatum, neque vllō pacto similis est ei qui in ephemeris sentitur, sed, vt & ab optimis ante nos medicis est dictum, mordax quodammodo potius existit, tactuique sentitur molestus: at vt fumus oculos, ac nares, sic ipse tactum videtur errodere. Sed in principijs quidem accessionum, vt in quibus calor adhuc suffocatur, ac superfluitates intus succenduntur, non statim admota manu discernitur. At per moram prædicti caloris species ex profundis partibus effertur. Quod cum animaduerneret Themison, existimauit (vt mihi quidem videtur) hoc esse omnibus febricitantibus proprium. Sed de hoc quidem in proprio huius sermonis loco à nobis rursus considerabitur. Prædicta autem caloris species, quæ appositam manum pungit, atque erodit instar medicaminis acris, est putredinis humorum progenies, quæ manifestè quidem sentitur in crescentibus, ac consistentibus febribus: non manifestè autem neque statim in incipientibus.

Themisonē medicū cuius i. meth. cap. 7. mētisnē fecit, reprahendit modo q̄ calorē mor-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

dentē more acris medicamēti, inseparabilem esse ab omnibus febribus putauerit, cum tñ is calor putredinis seboles sit, coq; in solis putridis appareat, sitq; putridarum inditium, maxime propriū & inseparabile. Calor siquidē hecticus videretur habere tale quiddā, non tamē est exacte talis, sed calor quidam (vt ita dixerim) aridus, non errodens.

Propriū verò inseparabileq; est gñi febriū ex humorū putredine accensarū, cōtractionis pulsū velocitas: euidētius quidē in incrementis, nō obscure autē in inuasionibus & vigoribus apparēs. Accidit autē ipsis per initia quidē paruus, simul ac velox pulsus: in vigoribus simul magnus ac velox. Sic etiā quæ in exteriori quiete est frequētia, in huiusmodi febribus perspicua existit, neque diarijs neque hecticis similis.

Addit signū aliud febriū putridarū. q̄ propriū & inseparabile esse dicit, velocitatē cōtractionis pulsū. Hāc em̄ superius diximus subseruire expurgādis fuliginibus, quarū magnā copiam in putridis febrib⁹ necesse est colligi, minimā in diarijs & hecticis, vt pote quæ sine putrefactione cōsistūt. Addit dictis, signū hoc maxime apparere in incrementis febriū putridarū, sed

sed nō obscurè in illarū inuasionibus, & vigore. Quod tñ videtur falsū Nā in accessionibus febriū plus fuliginū colligitur interiūs, quā cū iā calor emerſit, vt in augmēto, aut viget, vt in statu. Nō aliter quā in cōgerie lignorū viridiū, cui suppositus est ignis cōtingit, scilicet, in initio est fumi plus flāma minus, deinde flāma emergente, euaneſcit fumus. Accedit sentētia Galeni ipſus ex libro 2. de præsatione ex pulsibus cap. 1. vbi ita scripsit. Ergo celeritas contractionis inditio erit. fuliginosorum excrementorū ingentē colligi numerū, expurgarique id tēporis, quando cūq; inueniatur: tarditas contra, neq; eius multū excrementi coacerbari, eoque neque requirere euacuationem. Magna enim copia ex putrescentibus humoribus accerbat, qui febres accendūt necessariò: cū corpus bonos humores habeat pauca omnino: in alijs affectibus qui medi inter hos sunt, proportionē singulorū affectuū, inter edendū & dormiendū plus per vigilias & medias minus. Eadē planè ratione, pro ciborum natura, in illis qui prauos humores gignunt plus: in ijs qui probos, minus. In febribus ad eundem modum, in accessionibus plus, in alijs temporibus minus. Hæc Galenus. Si ergo, vt apertè dicit, in accessionibus plus fuliginis colligitur, in alijs temporibus

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

bus minus, apparebit manifestius in accessio-
nibus celeritas constrictionis, quā in alijs tem-
poribus, contra ac in praesenti loco docet. In-
telligendum antè omnia est, non idem esse
constrictionem esse velociorem, aut constri-
ctionis velocitatem magis apparere, Galenū
quæ in praesenti capite non dixisse constri-
ctionis velocitatem maiorem esse in augmen-
to, & minorem in principio & vigore, sed in
augmento eidentius apparentem, in reliquis
temporibus non obscure. Deinde cōsideran-
dum, Galenū non esse vsum eadem dictio-
ne, quæ principium significet in hoc capite, &
in eo quod citauimus ex secundo de praes. ex-
puls. Nimirū hic dicit *ἐταργέεσθαι μὲν ταῖς
ἐπιδιδόσεσι φαίνομενον*. Illic verò *ἐν ταῖς ἐπι-
σημασίαις πλεον*. At verò *ἐπίδοσις* signi-
ficat quod inuasio aut accessio. *ἐπίσημασία*,
non tam significat accessionem, quā anno-
tationem. Est verò febris annotatio, vt proce-
dēt hoc ipso sermone dicemus, tempus exa-
cerbationis febrium, vt si gratia exempli fe-
bris aliqua continua reliquis horis similis sui
sit, praeter quā quod tertio quoq; die habeat
sex horarū, in signe augmentum, dicimus febrē
illā habere tertijs diebus annotationes, atq; to-
tū id sex horarum tempus, annotatio dicitur
non

non minus proprie, quàm illius exacerbationis principium. Ergo si ubi in præscripta dictione vertit interpres in principiis plus, verisset in annotationibus plus, fortasse locus non repugnaret præsentì. Nam non est dubium in annotationibus (intelligo nomine annotationis omnia tempora particularia annotationis) plures colligi fuligines, utpote aucta putredine, quàm in reliquo tempore, quo mediocrem illum tenorem seruat febris. Sed, quamquam Galeni verbis videtur factum iam esse satis, quia argumentum quod sententiæ Galeni adiecimus leue non est scire licet, ipsius principij paroxysmorum duas esse partes, est enim principium aut accessio, cum calor ad interna refugit, & humor nondum incæpit, aut modo incipit putrescere, quo tempore nondum est collecta fuligo multa, & cum iam incæpit totus fere humor putrescere, tamè calor nūquam prodijt, quo tempore quam multum est fuliginis, & plus etiam quàm in augmento. Nam si ligna viridia imponas igni, in principio statim fumum incipit eleuare, sed non quàm multum, cum verò iam cremari incipiūt ligna, copiosissimus fumus editur, antequam inflammetur, quum primum verò incipit micare flama, incipit euanescere fumus, ut cum iam maxima flama est, nullus aut minus est fumus. Ita in ipso accessionis principio pulsus fit parvus & non ce-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

ler, qualis per refrigerationē (de hac parte lo-
 quutus est. 12. lib. met. cap. 3. dicens, ceterum
 duplici ratione verum esse quod dictū est cō-
 perietur, vna q̄ euidenter in accesionibus ap-
 pareat & tardiores & rariores quā pro natura
 liipforum habitu pulsus fieri) deinde antequā
 magnitudo crescat, quod increscentis febris
 inditium est, crescit extreme celeritas constri-
 ctionis, quæ à principio augmenti ad statū vs-
 que decrescit. Ergo in prima parte accesionis
 minor est velocitas constrictionis quā in au-
 gmento, sed in extrema parte accesionis, ma-
 ior etiam est quā in augmento: quæ tamen ne-
 que in ea accesionis parte est tam euidenter ap-
 parens, quam in augmento. Non q̄ maior ce-
 leritas non sit, sed q̄ cōstrictio difficile cogno-
 scatur in paruis & crebris pulsibus, facillimè
 in maximis & rarissimis vt docetur primo de
 dignoscendis pulsibus cap. 5. Quare celeritas
 constrictionis minus manifestè cognoscetur
 in vigoribus febrium putridarum, quia eo tē-
 pore minor est, quā in antecedentibus tempo-
 ribus, & in principij vltima parte, quia pulsus
 & paruus & crebor, in quo etiā exercitatis est
 cognitu difficilis constriction: in prima parte
 principij, ambabus de causis, & quia celeritas
 parua est, & quia pulsus quoq; est paruus in-
 cremētis cōtractis de causis est cōstrictio ma-
nife-

manifestius apparens. Accedit autē ipsis (inquit Galenus) pulsus parvus simul ac velox, in vigoribus simul magnus ac velox. Secūdū hoc de pulsu vigoris nihil est difficile, quod inter initia parvus simul est ac velox, causam esse dicit Fuchius, q̄ parvus sit, refrigerationē & diminutionē vsus, q̄ velox facultatis robor, quod ad huc manet. Tamē fallitur manifeste. nā cū facultate adhuc forti vsus minuitur, prius amittitur velocitas quā magnitudo, vt contra propter augmentū vsus, constante vi prius cōparatur magnitudo quā celeritas. Ergo dicēda alia ratio est. Pulsus habet in accessionibus magnā constrictionis indigentia, & paucā dillationis, proinde habet cōstrictionē magnā & magnæ cōstrictioni succedit etiā magna quies interna (quietes enim sunt propter eosdē vsus ppter quos motus, interna ppter expurgationē externa propter tractionē aëris) quo fit vt præpropere moueātur arteriæ ad trahendū aerē quia scilicet facta est magna intermissio vrgētur, quia verò vsus est paru⁹ nō mouētur multū. Itaq; fit dilatatio celeris & parua, quia illi⁹ indigentia est vrgēs magis quā magna. Fecit vrgentē longitudo priorū tēporū, magnā facere non potuit, & accedit frigiditas aëris, quæ quia membra eo tempore multum offendit, cito facit arterias à dilatatione desistere.

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

Ex dictis satis manifestum est, in putridis febribus, crebritatem in quiete externa maiorem esse quam in alijs febribus. Nam cum constrictio sit in illis maior necessitas, anticipas constrictio detrahit de tempore externae quietis.

Maxime verò proprium est talium febrium urinae cruditas, & obscura concoctio, proprium est inditium febrium ex putredine natarum, neque enim cruda, neque obscure concocta in diarijs febribus apparet. Atque alterutrum quidem eorum seorsim dictum, proprium est febrium putridarum inditium, ambo autem simul dicta per disiunctiuam propositionem, omnino inseparabilia sunt. Huic enim febrium generi primae urinae, vel omnino cruda, vel obscure concocta existunt. Magnum verò atque effatu dignum concoctionis inditium, in primis urinis nunquam apparet, excepta ea quae fit ex diarijs mutatione, de qua antea diximus.

Quae signa cruditatis integrae sint, & quae concoctionis obscurae, & quae concoctionis manifestae & quae perfectae, docet Galenus. 1. libro de crisi bus cap. 17. Hoc ergo ex illo loco requirere, ut quod praesens locus exigit intelligas. Primas urinas crudas esse proprium signum est febrium

febrium putridarum, obscure etiā coctas esse signū eb illarū propriū, quia neutrum horū abest aliis febribus, illis enim accidunt in principiis vrine manifeste coctę: sed neutrū illorū est propriū putridarū neutrū enim accidit ne necessario, sed potest alterutrum apparere. Itaque quodcunque illorum est signum propriū, & non inseparabile, tamen si ambo cūm distictione sub vno signo comprehendas, erit signū propriū & inseparabile. Nam primas vrinas crudas esse aut obscure coctas, necessariō accidit putridę cuicumque, & nulli aliarum. Addit dictis Galenus, effatu dignum coctionis inditium in primis vrinis, nunquam apparet, excepta ea quę fit ex diarijs mutatione, qua tamen exceptione videtur nō esse opus. Nam quibus mutatio ea fit, quum primum est iam febris putrida, sunt vrinę crudę aut obscure coctę, ante quam sit, diaria est, quare & tunc temporis primę vrinę febrium putridarum sunt crudę, aut obscure coctę. Sūt qui in huius loci enarratione dicunt, nonnullas febres putridas incipere à materia cocta, quod dicunt Galenum docere 17. cap. 1. de crisi bus, vbi inquit, febres quasdam esse statim ac incipiunt vigentes: atque ita inquit, quomodo igitur in primo die febris in statu consistere cognoscetur? Quomodo aliter quam si statim habuerit signa coctionis? Itaque dicunt

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

dicūt cum ex diaria sit putrida, signa manifesta coctionis addesse posse in primis vrinis, etiā cum est putrida. Res prorsum falsa, & quā tum ego opinor, minime intelligibilis. Nam qua ratione homo febricitet febre putrida, nisi humores putrescant, aut qua ratione humores putrescant si in primo principio cocti manifestè sunt? Finge quantū lubet hominem bonis succis abundantem febre corripī, an nō satis constar, prouos illos succos putrescere incipere? non enim aliter febris putrida sit: ergo coctionē illam deponunt. Atque si febris illa ad statū est peruētura, necesse est noua quadā coctione, quā diximus putrefactionis etiā esse participem, coctā fieri. Illa igitur ipsa coctione, qua cocta futura est in statu (est quidē illa coctio quā in morbis expectamus) incipiet coqui, nō enim, arbitror, sit quod nūquam incipit, incipiens coctio est obscura, ergo in temporibus cuiusuis febris putridæ coctio obscura, antecedit manifestam. Non nego posse in primo die coctas vrinas apparere, sed primas vrinas coctas esse. nimirum potest tempus obscuræ coctionis tam breui transigi, vt uno die coctæ vrinæ sint, illas tamen crudæ in primo ipso die antecesserunt: Quod luce clarius docuit Galenus ita fieri in. 17. cap. dicti libelli, his verbis. Neque enim fieri potest vt morbus

bus aliquis proprium statum recipiat, nō præcedente principio, aut accensu: extreme verò breue vtrunque horum temporum sæpe fieri contingit. verum de hac re libello. 10. controuersiarum copiosius disputauimus. Quid ergo pro huius loci enarratione dicendum est, Galenum excipisse febres permutatione à diaria factas, non quòd in illis primæ vrinæ febris putrida, sed quia primæ vrinæ febris, coctæ sunt monet verò hoc, ne quis putet, si accersitus ad febricitantem primas vrinas coctas viderit, certo se scire modo illum putrida nō laborare, sed intelligat fieri posse, vt febris modo putrida sit, & in principio febricitationis coctæ aparuerint vrinæ, scilicet, facta ex diaria in putridam permutatione, atqui merito id monet, quandoquidem modum quandam incipiendi febrem putridam hunc esse dixit.

Ad iam dicta propositarum febrium inditæ accedit etiam hoc, quòd in vigore paroxismi symptoma quoddam ardentis febris appareat: quoniam etiam si symptoma hepialæ & lipyriæ, quemadmodum etiam semiterciana, vel typhodis, vel cuiusdam alterius talis febris, quæ propria quidem sunt huius generis febrium

quæ

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

quæ ex humorum putredine accenduntur, non tamen inspirabilia : atque idcirco , Vbi ipsa non adsunt , ex alijs dignoscuntur : si verò affuerunt non solum genus talium febrium, sed & vnam aliquam ex ipsis speciem indicabunt.

Quid sit febris lypiria, & hepiala, & semitertiana, & febris ardēs, & typhodes, in secundo libro audies, in quo de putridarum differentia acturus est Galenus: modò illud vnum intellige, omnia signa quæ speciei alicuius febrium putridarum sunt propria, esse signa propria febris putridæ, sed nō inseparabilia. Nam quod propriū est vni speciei, quæ est sub aliquo genere, nunquam potest esse extra illud genus, etsi non in omnibus est quæ sunt sub illo genere, sed in sola ea specie, cui est proprium. Quare quod de signo febris ardentis, epyalæ, lypiriæ, semitertianæ, & typhodis, dictū est, loco exempli dicitur: fortasse quia hæ febres habent maxime insignia symptomata. Idem dices verissimè de signo proprio tertianæ, & quoridianæ, & quartanæ & cuiusvis alterius putridæ speciei febris.

Quorsum ergo Galenus dixit, si in vigore paroxysmi symptoma adest ardentis febris, aut hepyalæ, aut lypiriæ, & cætera: nunquid si in
augmen

augmento paroxilmi, aut inclinatione, adest symptoma hepyalæ, non est evidens febrem esse putridam? est certe, in quocunque tempore talia signa appareant, putrida febris, sed quia Galenus de permutatione febrium diariarum in putrida cœpit disputare, ad quas in vigoribus diariarum solet plerumque fieri transitus, dixit, si in vigore paroxilmi, tamen tu intellige simpliciter. Galenum loqui de permutatione dicta febrium, palam faciunt hæc verba quæ sequuntur,

Et quidem inclinatio ad integritatem non desinat, siue cum sudore, siue etiam aliter fiat è duobus alterum, vel transmutationis proprium est signum, si priora omnia febrium diariarum fuerint indicia: sin nullum ex ijs fuerit, febrem quandam ex ijs quæ ex humorum putridine consistunt, statim ab initio inuasisse ostenditur.

SI febris non inclinat, qua hora solet inclinare diaria, aut et si inclinet, non soluitur, qua hora solet solui, si antecedentia signa diariæ fuerunt facta est permutatio, sin minus ab initio inuasit putrida. Hæc continet hæc dictio. interim nota, interpretare eodem Galeno, febrem inuadere ad initio, esse, nul

DE DIFFERENT. FEBRIVM.

la alia prægressa febre, quidquid alij dicant.

Si verò prima nonnunquam die pulsus durus sentiatur, considerandum erit, numquid cōcretio quædam ex frigore, aut siccitas, aut tensio conuulsifica in corpore laborantis, aut phlegmone quædam, aut scyrrhus sit, probè scientes quod ex ijs solis pulsus durus efficiatur. Nam quantum errauerit archygenes circa notionem, ac dignotionem duri pulsus, in opere de pulsibus abundè monstrauimus, in quo exercitatum esse oportet, cum qui in præsentili libro versari velit, ac potissimum in ea parte, quæ de pulsum dignotione agit. Etenim pulsum nomina, ac omnia ipsorum significata, & vniuersum numerum, vno volumine enarrauimus, quod de pulsum differentia inscripsimus: quo nam verò modo vnūquemque dignoscere oporteat, in alio opere, quod in quatuor libros digestum est, explicatur, quod de dignotione pulsum inscripsimus quemadmodum alterum deinceps volumen, quatuor libros in se complectens, de causis pulsum effecimus: & quartum à iam dictis, de prano

prænotione ex pulsibus, non solum verbis, sed etiam re ipsa, huiusmodi speculationis utilitatem indicantes: ac si quis nobiscum ad ægros accessit, horum librorum speculationem re ipsa ostendentibus: huic tamen alia persuasa sunt, tum etiam illud, quod durus pulsus, neque proprius neque inseparabilis sit talium febrium. Sed de hoc nunc non est dicendi tempus. Nam prædictis libris, & in alijs octo in quibus archygeni librum de pulsibus expendimus, abunde huiusmodi symptomata demonstrata sunt. Pulsus durus neque proprius, neque inseparabilis est cuiuspiam generi febrium, neque diaræ, neque putridæ neque hæcticæ, consistit verò magna ex parte in hæcticis, atque interdum in alijs duobus generibus propter symptoma quodam: in diarijs quidem, ubi ex vehementi frigore febricitauerint, si tensio quadam nervosa simul insit. Accidit verò nonnunquam ob vehementem solis aestionem, vel astitudinem simul, vel alimenti inopiam, vel immodicam vigiliam, vel vacuationem, quando ob alimenti defectum hæc quoque constiterit. Febribus autem putridis pulsus durus inest, ubi aliquot viscus phlegmone

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

laborat, aut induratum fuerit, & ob sympto-
ma quoddam coniunctum, nempe nervosam
aliquam tensionem, aut siccitatem. Fict enim
hoc quoque modo durus pulsus, quemadmodū
& ijs qui intempestive frigidam biberūt: aut
qui frigida se labarunt, & aliquot molliores
fructus largiter commederunt. Febris autem
ratione, & qua febris est, nunquam pulsus du-
rus fit, neque in diarijs febribus, neque in pu-
tridis: neque enim quando ex phlegmone fe-
bricitant, eadem ratione & febris sequitur,
& pulsus durities: sed febris quidem ex hu-
morum putredine, durities autem ex tensione
quæ fit propter vasorum repletionem. Vt e-
nim summatim dicatur, duricies tunicis arte-
riarum accedit, vel propter concretionem,
vel tensionem, vel siccitatem. Concretionem
igitur vehemens refrigeratio efficit: tensio-
nem verò phlegmone & scyrrhus, & nervo-
rum phlegmonibus proportionè respondens
affectus, siccitatem verò diutinæ vacuatio-
nes, vel propter fluxum ventris, vel leuitatē
intestinorum, vel dysenteriam, vel diurnas
vomitiones, vel aliud istiusmodi. Et diutina
fames

fames, atque ardentes febres diutinae, & ve
in vniuersum dicatur, quaecumque vehemen
ter exiccant solidas ipsius animalis partes,
veluti & hæcticae, de quibus nunc dicere est
tempestiuum ab earum generatione exor
sis.

Q Vandoquidem inualuerat Galeni em
pore opinio archigenis, prorsum falsa,
pulsus durus signum inseparabile esse
februm, oportuim fuit in hoc libro, in quo
de signis febrium agebatur, hunc errorem ex
tirpare, potissimum verò in presenti loco, in quo
ad signa ethicarum transgreditur, quarum vi
detur maiori quadam ratione, haberi pulsus
durus, signum inseparabile. Tamen re vera
inquit Galenus nullius generis febrium est in
separabilis pulsus durus. Id monstrat, quia nul
li adest necessario, quod inquit se monstrasse
re ipsa, & experimento, in egrotantibus. Quod
si lib. 4. de causis pulsuum capi. 10. videtur di
cere, pulsus hæcticus durus esse, constat il
lic loqui de pulsu marcescentium, tamen he
ctica aliud est à marcore, ut sequenti capi. di
cemus itaque nulli febre est proprius, neq; in
separabilis: immo verò inueniri potest sine o
mni febre: si scilicet adest aliqua causa duri
tiei pulsus: quæ sunt quinque, concretio ex fri

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

70
 gore, & desiccatio, & tensio cōuulsua, & phlegmone, & scyrrhus. quæ quinq; causæ ad tres tantum reduci possunt, concretionē, desiccationem, & tensionem. nam phlegmone & scyrrhus non aliter faciunt durum pulsum, quam tendendo arteriam. potes etiā, si vis, tres has causas in duas redigere, duritiem arteriæ, & tensionem. Nam concretio & siccitas quia arteriam indurant, faciunt pulsum durum. quin immo, si sub vno nomine vis duritiem, quæ verè durities est, & tensionem, duritiē appellare, dices cum ipso Galeno primo de causis pulsum, duri pulsus vnicam esse causam, duritiem arteriæ. Verum modo distinctioris doctrinæ gratia, dicimus duri pulsus tres esse causas: concretionem, siccationem, & tensionem: constat hæc sæpe accidere sine febre: ergo sine omni febre potest esse pulsus durus. Nulla præterea trium causarum, necessariò adest cuiuspiam generis febrium: nam si quæpiam, maxime siccitas hæctica febris, sed neque hæctica necessariò habet in arteriis tantam siccitatē, ut duræ arteriæ sint, ergo à nulla febre est inseparabilis pulsus durus. Potest quidem adeste cuiusque febris generi pulsus durities, immo & frequenter adest, tamen id nō fit ratione febris, sed symptomatis cuiuspiam aut alterius affectus cum febre coniuncti: ut indi-

riis solet esse durus, cū ea fiunt ob vehementem solis vstionem, hæc enim desiccant, vel ob lassitudinem. (Quo nomine hic defatigationem debes intelligere, non vt quidam male interpretantur lassitudinem tenuiā. Nam illic haud dubie cœperat loqui de causis, siccitate & arefactione indurātibus pulsum, vt de vstione, de fatigatione cibi inopia. Quod verò hanc lassitudinem intelligat Gal. cū ex lassitudine, diariam febrem nasci dicit, intelliges ex his verbis ca. 2. li. 1. de arte cur. ad gla. eorū autē qui ex lassitudine in febrem inciderunt, cutis est siccior, quā in alia aliqua ephamera febre) vel ob inopiam alimenti (Constat siquidem cū alimenti defectus est, corpora sicciora fieri) vel ob vigiliam immodicā, vel vacuationem. Addit Galenus. quando ob alimenti defectū hæc quoque constiterint, significans vigiliā immodicā & vacuationem, tunc efficere duritiē pulsus, quū ob alimenti defectū fiūt. Quāquā ego nollem intelligi ex hoc loco, vigiliā immodicā, & immodicā vacuationē, nō aliter posse duritiē efficere, quā vbi ex defectu cibi proficiscūt, sed tūc efficere potissimū. Nā oīs vigilia per halitū digerit, & siccant, vt Gal. docet. 2. de ratione vict. in acutis com. vltimo. Tamē constat tūc tēporis siccātū iri corpus maximē, cū homo præ fame vigilat. Ergo omnis vigilia po-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

test arteriam siccare, si immodica est, verum ea maximè; quæ fit ob alimenti defectum. Vacuatio quoque eodem modo omnis, exiccat, sed omnium maximè ea, quæ ob alimenti defectum fit. Fit enim vt ex aliis vacuationibus, plerunque superflua humiditatis vacatio, ex penuria alimenti, naturalis membrorum humiditatis resolutio. Febris etiam putridis solet accidere pulsus durus, non tamen sui ratione, sed aut phlegmonis, aut scyrrhi, in viscere aliquo consistentis. Hi enim tumores distentione arteriæ faciunt durum pulsum, vt etiam tensio aliqua nervorum, sicum febre coniungitur. Itaque nulla febris, quæ febris est, habet inseparabilem pulsum durum, sed à quacunque causa, quæ arteriam indurat, aut distendit, fit, siue cum febre sit, siue sine febre: vt pulsum durum habere solent, qui intempestive biberunt frigidam, aut frigidam se lauarunt, & aliquot fructus molliores ingesserint, eos scilicet, qui frigidiores sunt. Quia hæc omnia refrigerant, refrigeratio verò concretionem facit. Itaque vt dicatur in summa, causæ duri pulsus longe diuersæ sunt à febre. Nam vt dictum iam est, durus pulsus fit aut à concretionem, aut tensionem, aut siccitate. Concretionem facit refrige-
ratio

ratio vehemens : tentionem verò phlegmone & scyrrhus, & neruorum phlegmonibus proportionem respondens affectus (id est conuulsio) siccitatem verò diutinae vacuationes, vel propter fluxum vètris, aut lyenteriam, aut dysenteriam. Nominis fluxus ventris intelligit hic Galenus, fluxum quem alias diarthraëa solet appellare. Quare miror quid in mentem venerit fuchsio, vt *ἐκφυα γαστρί* defluxum à superioribus in ventriculum interpretetur, cum neque nomen quidquam tale significet, neque ille defluxus à superioribus in vètre, sit euacuatio. Vomitiones etiam diuturnae, & diutina faimes, & ardentes febres, pulsum durum faciunt. Verum id febres non semper faciunt, sed cū adeo desiccāt vt indurēt arterias. Eodem modo faciunt febres hecτικές, ad quas iam vertit stilum Galenus.

CAPVT XII.



*Enerātur igitur hecτικές
vocatae febres duobus mo-
dis, magna quidem ex par-
te ex ardentibus febribus,
quae prorrogātur adeo, vt
spatio temporis humorem*

I s corpo

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

corporis cordis consumant, vel etiam si adhuc multus permaneat. Illa igitur non solum he-
 Etica sunt, sed etiam iam morasmodos: quæ
 Verò adhuc manente humore fiunt, vbi cordis
 corpus occupauerint, hinc maximè accendun-
 tur, quemadmodum lucernarum flamma ex-
 ellychnio. Atque vna quidem ipsarum gene-
 ratio à nobis exposita est: reliqua autem est,
 vbi statim ab initio inuaserint, primam ge-
 nerationem diarijs similem habentes ex tri-
 stitia, ira, & plurima lassitudine, vna cum v-
 stione solis factis. Has igitur febres curare ne-
 quaquam difficile est, quæ verò ex eis in ma-
 rasmodum deuenerunt, ex inscitia medicorum
 qui adhibiti sunt, eas non solum nõ facile, sed
 etiam curare impossibile est, vbi iam consi-
 stunt exquisitæ, non adhuc incipiunt. Si qui-
 dem natura ipsarum calida & sicca est, quũ
 cor simile aliquid patiatur, quale in lucerna
 ellychnium, quamplurimum vstum fuerit.
 Nam ita tostum frangitur atque dissoluitur,
 & continuitas præ cruditate perditur, ut ne-
 que si affundas copiosum oleũ, flammam multã
 rursus accendere queas. Parua enim & infir-

ma circa ipsum flāma circumuoluitur, ac semper minor fit, donec extingatur.

HOc duodecimo capite docet modos, quibus hæcticā febrē contingit generari, & qua ratione differat inter hæcticā febrē, & eam quæ marasmodes iam appellatur, & exquisitū marasmū: sequēs caput, decimū tertium ordine, cōtinebit species febris hæcticæ, & signa: febrē hæcticā esse calorē habentē factū esse in corde, antea diximus: explicuimus etiā in principio huius sermonis, & in commentarijs in libellum de inæquali intēperie, quid sit calorē esse in fieri, & habere factū esse. Monstratū non minus antea est, & multò adhuc fufius in quinto libro controuerfiarum medicarū, fieri posse à principio hæcticā febrē, nulla alia febre, & nullo alio morbo pregresso. Ostensum enim etiā est paulo antè, Galenū cū morbū incipere à principio dicit, idem significare, ac si nullo alio prægresso dixisset. Verū dicta oīa cōfirmat præfēs locus, quo dicitur, hæcticā febrē duobus modis gñari, aut ex febre ardēte, quæ spatio tēporis humorē cordis cōsumere, vel à principio ipso ex causa procathartica, vt ex tristitia, ira, aut lassitudine simul cum vstione. Primus ille modus est, qui magna ex parte contingit, secundi
huius

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

huius scripsit Galenus ipse exemplum. 10. metho. cap. 4. in hanc ipsam sententiam, ita dicens. Quippe vel in febres ardentes ex ea incidunt, à quibus, nisi prius mors occupet, in hæcticas migrant, atque ab ijs in marasimum, vel protinus ab initio, ardentibus præteritis, in hæcticas, maximè tamen (ut dictum sæpius est) siccos & calidos affectus, statim à principio hæctica corripit, sicuti mulieri accidit, quæ aurumno ex tristitia & vigilijs febricitare cœpit, perseveravit autem ad plurimū hyemis. Hanc quarto die (ut scis) vidimus, deprehendimusque statim hæcticam esse febrem. Vides constantem Galeni assertionem, quamquam non desunt qui contrarium oppinentur, dicentes apud Galenū idem esse incipere à principio, & fieri in primis diebus: itaque ideò non nullas hæcticas, vocari factas à principio, quòd secundo aut tertio die facta ad eas permutatio sit. Idque confirmant ex ijs quæ modo hic transcripsimus Galeni verbis: Scilicet illam mulierem Galenus dicit à principio febre hæctica laborasse, quia quarto die febre tenebatur. Sed hi paralogizantur manifestè. Nā quopactò intelligunt, quia Galenus quarto die illam febre hæctica laborantem vidit, illam non ab ipso primo die ea febre laborasse? sed rogabis, si incipere à principio, est à primo insul-

tu, quomodo Galenus asserit, febre hectica à principio laborasse, quàm non antè quartum diem vidit? an quia ex relatu cognouit hectice febris inditia semper adfuisse? sed quâdo hic sensus refutatus satis à nobis ipsis est, & Galeni opinio confirmatissima in locis citatis, modo prætereo, enarratis solum his Galeni verbis: (hoc enim solum præsentis loci est) febres hecticas duobus modis fieri, aut succedentes alijs aut à principio: sed venio ad reliqua. Dicitur est à Galeno septimo libro meth. cap. 6. contineri in omnibus membris humorẽ quendam, roris more sparsum, quo membra nutriuntur. Hunc humorem inquit modò, absumi per febres hecticas, cumque, quamquam absumitur, tamen manet modo mediocris eius copia, febrem hecticam tantum esse, cum verò totus hic ros, aut totus fere consumptus est, febrem esse iam marasmodem. Venit per hunc affectum cor in talem dispositionem, qualem patitur funiculus combustus absumpto oleo. Confer enim Galenus cor nostrum lucernæ: substantiam funiculo, oleum rori, calorem flammæ. Quam comparitionẽ, offendes apud Aristotelem, sæpius ut quàm referri possit. Febres hæc miasmodes appellantur, quia est hectica febris cum marcore cõiuncta, sed quid sit exquisitus marcor, statim dicet. Fe-
bres

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

bres hecticas cum nondum ad marasmū ceciderunt labi, nō inquit esse difficile curare (curationis totius modum docet libro 10. meth.) eas verò quæ iam marasmodes sunt, prorsum esse insanabiles. Nimirum vt dictū est. 7. meth. cap. 5. siccitas si prorsum sit cōsummata, insanabilis est. Id verò patet manifestè, nam si sanari posset, nihil prohiberet senes repuerascere: non enim ratio differendi, est annorum qui iam effluxere numerus, sed siccitas temperamenti. Itaque in marasmode febre, cor simile aliquid patitur, quale in lucerna ellychnium, quando plurimum vltum fuerit: nam ita tostum friabile fit, & continuitas præ ariditate perditur. Verū hęc intellige bono modo: nam antequam nostra membra, quæ vere solida sint calore liquecant, aut cōminuantur, peribit animal, vt dicitur decimo meth. capite vltimo. Causa qua prorsus consummata siccitas est insanabilis, est, quia si qua ratione sanari posset, id fieret nutritione vberiori, hęc verò non potest fieri corrupto iam temperamento: præterquam quod neque ipsa membra iam tentant, ad humidiorē quā ipsa sunt, substantiam, cibos transferre, sed sibi similes facere.

LIBER PRIMVS. 71

Febris quidem exacte marasmodes huiusmodi existit, quæ non quidem est idem morbus cum pathemate, quod est marasmus. Hoc enim in ijs qui consenuerunt absque febre accidit, extincto in ipsis nativo calore: quæ sanè potissimum mors est molestia carens, ac secundum naturam, & siccitate contingens, quemadmodum & ijs qui præter naturam tabescunt, illa species quam philippus ex morbo senium appellat, in quam multos vidimus, non solum senes, sed etiam pueros incidisse. Febris autem marasmodes non siccum solum, sed & calidum pathema est. Extinguitur verò in hoc multò celerius, qui in animali est calor, atque totum tabescit corpus instar arboris extremè arefactæ, vel ob temporis longitudinem, vel flamma vicinitatem, vel vehementem ac immoderatam siccitatem: sed de vniuerso marasmi affectu, qualis nam sit, seorsum scriptum est.

Marcor aut marasmus est extrema siccitas, qui nunc est cum febre, & febris est marasmodes nunc cum frigore, & hic est duplex aut qui secundum naturam fit in valde senibus, aut qui præter naturam, in eo affectu, quem philippus medicus

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

dicus appellauerat senium ex morbo: scilicet est siccitas & frigiditas confirmata ex morbo. Marcores omnes trahunt ad mortem præ siccitate, tamen vt Galenus inquit, Celerius in marcote cum febre exinguitur naturalis calor, quàm in frigido. Quia calor ipse præternaturam, desiccât ad huc amplius mēbra. Proinde consulit Galenus 10. meth. laborantes febre marasmode, quando nulla iam alia spes salutis est, frigida lauare, vt ad frigidum marcorem transferantur. Ergo marasmodi febris, à marcote solo, ita differt. Conuenit etiā marasmodi febris quam plurimum cum febre colliquante, quia in vtraque consumuntur membra. qua ratione differant docet Galenus capite vltimo, decimi libri meth. dicens portiones quæ in marasmode colliquantur, calore solutus semper diggeri, in colliquante cōfluere in ventrem. Marasmus itaque duplex est, calidus, & frigidus. Leonhartus Eulchius hoc in loco tertium dixit, neque calidum neque frigidum, verum ego non puto fieri posse tantam siccitatem, sine calore, si cū febre est, aut sine extinctione calidi innati, si sine illa: Galenus certe 6. de tuenda val. non longè à principio ita inquit, monstratum est in opere de temperamentis, nullam intemperiem solam diu consistere, sed ipsam sibi aliam addiscere.

cere. Quare si Galenus lib. de mar. cap. i. dixit, si solū siccatur corpus esse simplicem marcorem, id dixit ut essentiam marcoris explicaret, quæ in sola siccitate cōsistit, loquutusque ex conditione, an ita accidere posset, non definiens quod modo nos addidimus. Quod à Galeno dicitur: quæ sanè mors potissimum est molestia carens, ac secundum naturam, animaduersione indiget. Nam mōstratum à me est in com. capitis primi quartilibri metheoron Aristotelis, re vera nullam mortē esse secundum naturam id est à principijs intrinsicis, neque omnino sine molestia. Ostensum id etiam est in i. cap. 6, lib. centro. sed ut in locis illis dixi, secundum naturam hæc mors dicitur, quia secundum rerum naturam necessario fit in omnibus quæ generantur, est etiam cum minima molestia, quia cum in eo statu constitutus iam homo est, minima alteratio illum tollit. Sed hæc require ex dictis locis, & ex libello Galeni de marcore, in quo de eo seorsum scripsit.

CAPVT XIII.

Febrium autem hecticarum, quandoquidem duplex est genus, ut nunc definitum
K est

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
est, inditia deinceps dicamus. Febris quidem
hæctica quæ cum marasmo incidit, cognita
proptissima, & facillima existit: nā priusquā
tangas pulsum, & calorem, oculos immodicē
cauos videbis, quasi in quibusdā foveis recon-
ditos, ob totius humidæ eorū substantiæ con-
sumptionē: ita vt etiā osiū quibus palpebræ ad-
herēt eminētia appareant. quinetiam lipitudi-
nes in ipsis visuntur sicca, et quidam se alidus
affectus, qualis maximè inest eis qui per multū
pulverem, in sole calido, tota die iter fecerunt
flos ipse præterea viuidus coloris perijt, idque
toti faciei accidit, et immoderatus quidā sca-
lor, totius cutis, quæ circa faciem est, apparet,
ac potissimum eius quæ circa frōtem existit,
vt propter siccitatem dura, ac intenta sit. Nō
tamen palpebras plurimū atollere possunt, dor-
mitantibus similiter semper affecti quin etiā
magna ex parte conuiuent, quemadmodum
qui dormitant. est autem, non somnus, ipsorū
passio, sed vigilia impotentia. Carnes præte-
rea quæ in temporibus sunt contabuerunt, ita
vt ea loca collapsa cauaque appareant. etenim
quid aliud toto corpore quam ossa et cutis sūt
adeo

adeo ut si nudato corpore, partes quæ ad venter sunt aspexeris, nullum intestinum, neque vlla viscera tibi superesse videantur, & hypochondria ipsa ad thoracem vehementer esse retracta quod si ipsos tangere volueris, cutis quidem extremè arida existit, at si digitum hanc apprehendens, extendas, veluti corium quoddam subsistit. Pulsus autem, parvus, durus, debilis, ac frequens. Calor verò ad primam manus iniectionem imbecillis, sed paulò post acer, atque erodens apparet, ac magis ubi tangendo diutius immoreris. Sed minime oportet reliqua inditia commemorare, in re tam perspicua, satius enim est, ad marasmodum adhuc incipientem, sermonem transferre.

Febrium hæcticarum prima diuisione duplex est genus, quia aut marasmodi sunt, aut non sunt marasmodi. Rursum quæ non sunt marasmodi, sunt aut incipientes, aut mediæ tenentes inter incipientes & marasmodi, atque ita prodeunt tres species febrium hæcticarum. Superiori capite distinguitur non marasmodi à marasmode, modo perstringit breui signa eius quæ iam est maras-

K a modes

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

modes: deinde distinguet incipientem hæcti-
cam à non incipiente, & scribet illarum signa.
Febrium quæ marasmodes sunt signa, ta-
lia omnino sunt qualia, quæ extenuatos pror-
sum homines, consumptosque ex febre conse-
qui solent. Habet ergo signa omnia, quæ Hip-
pocrates primo prognostici describit, quæ
proinde faciem hypocraticam solemus appel-
lare: & quæcunque debiles iam facultates, &
resiccata membra cum calore, commitari ve-
risimile est. Colligit Gal. signa numero nouē
quæ sunt oculi caui (hoc fit gratia consum-
ptionis) sicca lipitudines (id est resiccata la-
chrymæ, & quidam scalar circa oculos, qualis
videri solet in illis, qui per multum puluerem
in sole potissimum fecere iter) corruptum es-
se ijs viuidum faciei colorem : quia scilicet in
ijs calidum innatum extremè iam languet, &
magnam habet sanguinis penuriam. Addidit
Galenus id quæ toti faciei accidit. Nam parti-
culæ cuiusdam in facie maculæ ex multis alijs
causis frequenter fiunt. Scalar & tentio totius
cutis, maximè eius quæ circa frontem est (hæc
facit siccitas) habere demissas palpebras, ac si
dormirent (hoc facit imbecillitas facultatis a-
nimalis, quare constat huc non esse somnū &
requiē animæ, sed impotentiam vigilandi. Sci-
licet vigilare labor est animalis facultatis, quæ
cum

cum ferre non potest torpet ex debilitate, ac si dormiret: qua autē ratione differat inter somnū naturalem & torporē, aut vigilandi impotentiam, docet Gal. 1. de causis sympt. capite ultimo) deinde collapsa & excauata tempora, in summo videri nihil aliud esse ita febricitantes, quā ossa & cutis (hæc omnia consumptionis & siccitatis sūt) pulsus debilis quia à debili facultate: durus, quia dura arteria: paru⁹, quia à debili facultate cū dura arteria: creber, quia paruus est cum febre, scilicet quod deest vsui gratia paruitatis, rependitur crebritate, magis etiam quā celeritatē, quia debilis vis facilius aūget crebritatē quā celeritatē: ergo pulsus ille (quanquā Gal. celeritatis hic nō meminit) erit celer, minus autē multò quā creber, & quo plus laeuescet facultas, eo plus amitteretur celeritas, & augebitur crebritas, atque ita fieri etiā poterit in celeritate mediocri, & in extremo vitæ etiā tardus. proinde pulsus hos dixit 4. de causis pulsuū cap. 9. cū celeritate quadā esse. Vltimū signū est in modo caloris, qui in prima iniectione manus, videtur mitis, deinde mordet tactum: hoc efficit, oīs calor in materia aridiori consistens. Ceterū hic affectus cū exquisitus iam marasmus est, cognitu est facillimus, sunt enim eo tempore signa multa, & admodum euidentia: difficilius cognoscitur

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
marasmus cum adhuc incipit.

Incipere autem marasmm dico, quando innatus humor in vnoquoque corpore dispersus, per loca media partium similariũ, ex quo primum partes aluntur, parum abest vt nullus sit in cordis corpore. Quo vsque enim aliquid illius seruatur, hæctica febris tantum est, non quidem iã & marasmodes, vbi verò propè iã est, vt nihil huius humoris supersit, exquisitus iã marasmus cõsistit. Difficilis igitur omniũ hæcticarũ febrĩũ affectus, vbi principij tempus præterijt. Diffinio autem principij, non dierum aut horarũ numero, vt neque in alijs morbis, sed ipsa affectus qualitate. Quĩ enim primum cordis corpus a naturali temperie discedit, neque natiuus humor protinus aboletur, neque facultas debilitatur: sed primum velut quædam ebullitio humoris sit, quò tempore talis febris facillimè curatur, vt pote facultate nihil dum perpeffa: deinceps autem consumptio quædam sit ab ebullitione, ea quæ ipsa plurimum iam progressa, ipsa etiam similaria corpora, quæ velut elementa cordis existunt, sicciore redduntur, & minus alimenti sentiunt.

tiunt, ac facultas tantum debilitatur, quantum siccitas & caliditas in eo inualuerit: quorum alterutrum eam sufficiens erat, ut exuperans infirmam redderet facultatem. Talis febris iam quodammodo ambigit, ac media est inter marasmodem illam, quæ penitus sanari non potest, & etiam de qua antè paulo dictum est quæ adhuc incipiens facilimè curari potest, atque in ea per quam multa latitudo existit, quoniam & affectus ipsius, non exigua in maioris & minoris ratione, permutatio. Quæ igitur aequaliter distat ab utraque febre, exquisita scilicet, marasmode, & ea quæ nondum quippiam eiusmodi habet, media quodammodo est, & ad curationem ambiguam obtinens utroque versus inclinationem: quæ autem marasmodi propior est, iam periculo propinquat, quemadmodum quæ priori alteri propinquior est, non parvam salutis spem obtinet.

Hæcticarum febrium species distinguit Auenenna fen. prima quarti, & oēs illius affectus, differentiis sumptis ex materia, videlicet ut diariam, putridam, & hæcticam ex materia

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

distinguiamus, quia hæc est in membris, illa in humoribus, alia in spiritibus, ita dicunt, prima species hæctica consumit rorem, secunda cābium, tertia gluten, quas vocat Auic. secundas humiditates, de quibus à nobis disputatū est, in vltimo capite primi libri controuersiarū Gal. etiam ipse libr. septimo meth. cap. 6. species siccitatis diuersarum substantiarum consumptione diffinit, dicens, quatuor esse siccitatis gradus, maximā, in qua solida similariū partium substantia reddita est siccior: alterā hac minorem, in qua partes quæ ex concretione habēt gnationē, cuiusmodi sūt caro & adeps, vt Arist. docet. 2. de gnatione animi. ca. 4. cōsumpta sunt. Has partes vocat Auic. cābium: sed hæc vide quo loco diximus: tertiā speciē siccitatis dicit, vbi humor qui roris more per mēbra est sparsus, cōsumptus fuerit, quartā dicit esse cōsumptionē sāguinis, qui est in exilibus venis & arterijs: dimissa hac quarta, quippe quam Gal. ipse in eodē loco cōcedit, nō rā esse siccitatem, quam frigiditatem, supersunt tres siccitatis gradus. Ergo Galenus quoq; distinguere videtur illo in loco siccitatis species ex substantijs quæ cōsummuntur, quāquā hic nō ita, sed ex sola alteratione quæ in rore fit. Nimirum in prima specie ros ebullit, & cōsumi incipit, in secunda quæ incipiens iam marcore est, satis multum illius est consumptum,

in tertia specie quæ est marcor adurens nihil fere iam superest roris: verū nihil refert hoc aut illo modo distinguere, modo illud vnum intelligatur, quamquam ros facilins consumatur, & proinde citius plusque quam caro & adeps, multoque plusquā membra, & caro & adeps plusquam partes solidæ, tamen non posse fieri, vt hæc consumpta iam sit, cum illa consummi non incæperit, immo cum in prima spe ros ebulit, tunc etiam aliæ duæ substantiæ incipiunt siccari, quamquam minus & obscurius quàm ipse ros: cum iam roris multum consumptum est, consummuntur manifestè caro & adeps, & solida membra, plusquam in prima: in tertia specie iā resicata sunt manifestè membra solida, & caro & adeps multum & ros totus fere: atque ita in idem recidit, siue per diuersarum substantiarum consumptionem, siue per diuersas roris alterationes, velis hecticarum species separare. Hæc ita agi circa has substantias quæ liquefcunt, docuit Auicena (nulli enim derogandum est quod rectè dixerit) capit. de hectica febre. Sed sunt in dicto loco. 7. meth. verba quædam Galen, quæ nisi blande vt oportet antiquorum dicta intelligantur, manifestè pugnant cum ijs quæ dicuntur in hoc capit. Nam illic loquens de tertia illa siccitate, qua duas alias maiores

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

dixerat, inquit, est tertia, cum propria humiditas qua membra nutriuntur, omnino est absumpta: tamē hic de extrema siccitate loquēs inquit, vbi verò prope iam est vt nullus talis humor super sit, exquisita marasmus est. Verum tamē intellige, vbi inquit omnino est absumpta, absumi tunc tēporis. Nā vt mox monui, ipse Gal. postulat, vt antiquorum dicta amice recipiantur. Reliqua omnia præscriptæ dictionis sunt aperta satis.

De inceptis igitur ad earum inditia transeū dum, & primum illius quæ facile solui potest nisi in vnum aliquem medicum, quales quam multi sunt incidat: est autem vbi sola consistit, cognitu haud difficilis: ad discens verò aliquam ē putredine humorum, difficilis cognitionis iam fit, propter permixtionem. Subijciatur autem primum ipsa sola, ab aliqua prædictarum causarum consistens, atque appareāt in prima die omnia signa generis diarum, apparet igitur statim simul cum ipsis, causa pro cathartica species. Atque id procedente sermone indicabitur. Sed & interrogato ipso egrotante, licet discere, si cetera omnia bene habens, solum ex vehementi ira vel tristitia febr-

febricitate cœperit. Quod si hæc ita se habere videantur, & febris vsque ad secundum diē extendatur, nequaquam ad infebricitationē desinens, sed neque vehementior euadens, sic cior quidem appareat, hæcticam fore talē hāc suspicandum est. Quod si etiam tertio die sine cibo suspectas accessionis, quæ tertio die inuadere solet, horas transgredi voluerit, ac neque additio vlla facta sit, neque effatu digna imminutio, sed primæ febris exigua reliquæ extendantur, ac cum scaldido corpore permaneant, & miti calore in prima manus iniectione apparente: immorantibus autem diutius, acri, modaci, & scaldido occurrente, talem febrem hæcticam esse existimare oportet.

INcipit modo docere signa febriū hæcticarum, quæ nondum sunt marasmodes: & primum omnium, hæcticæ primæ speciei, quæ facilem habet curationem, nisi in vnum aliquē medicum incidat, quales sunt quam plurimi. Hac phrasi imperitum medicum significauit Galenus, neque id immerito: nam numquam non sunt per pauci periti medici imperitorum verò est innumera multitudo.

Febris

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Febris hæctica cognitio nulla alia ratione magis interturbatur, quàm sicū putra aliqua coniuncta est. Proinde Galenus incipiens à facilioribus (ita enim expedit docentem facere) scribit primum signa febris hæcticae, solius, deinde in huius capituli fine, docet hæcticam cum putrida coniunctam, dignoscere. Nullus ergo iam locus superest barbaris quibusdā commentatoribus dubitandi, an duorum febribus generum possit homo laborare simul, quod illi dicunt an febres possint complicari sed de his dictum antea non nihil est, & in quinto Controuerſiarum libro fusissime disputatum. Modo illud vnum concedentes Galeno, posse hominem simul hæctica & putrida laborare, ad reliqua properemus: Loquamur inquit Galenus primum de sola hæctica, subiiciaturque hæc, ex aliqua prædictarū causarum, puta procatharticarum, consistens: apparebūt statim in principio signa omnia similima diariæ (non quòd à diaria incipiatur vt interpretantur qui negant posse hæcticam in corpore nulla alia prægressa, cū ex causa procathartica fieri possit diaria aut hæctica, statim in ipso principio, quam minimum dissident signa hæctica, à signis diariæ: nam in ambabus possunt apparere coctionis signa, maxima ergo differentia est in caloris modo, & siccita-

tis sensu, quæ non possunt in principio adeo
 creuisse, vt à diaria febre manifestè euariant.
 Apparebūt ergo signa diariæ simillima, & si-
 gna speciei procathartici causæ, si scilicet ex
 ira, timore, aut cura, aut causa, alia facta est:
 sed id præcedente sermone docetur distin-
 guere, in capite nempe vltimo huius libri pri-
 mi: Sed interim, interrogando ipsum febrici-
 tantem, possumus dicere, an cætera bene ha-
 bens, solum ex causa procathartica febricitare
 cœperit, quod vbi compererimus, secunda
 dies febris expectanda est, nam vt dixi in pri-
 ma nihil satis sensibile desidet à diaria, si se-
 cunda die non cessat neque fit vehementior,
 & siccior apparet tactu. Iuspicio iam est fore
 hæcticam. Quia si quæ prima die apparuit dia-
 ria, talis perpetuò fuisset, inquā nullam aliam
 transiisset, foret sedata suo tempore, puta se-
 cunda die, quod cum non sit factum, superest
 aut non fuisse diariam quamquā talis appa-
 ruerit, aut mutatam esse in putridam, aut in
 hæcticam: sed si fuisset mutata in putridam,
 facta esset vehemensior, denuò crescens, &
 non appareret siccior, vtpote membrum non re-
 siccatis, superest ergo si illa apparent, quæ in
 hypotesi diximus, aut hæcticam fuisse à prin-
 cipio, aut diariam in hæcticam migrasse: vtrū-
 uis horum factum sit, dicitur hæcticam ince-
 pisse

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

pisse(nam vel in ipsis putridis appellauit Gale-
 nus hanc permutationem, inceptionem) vtrū
 illorum factū sit, non puto. distingui posse, ne
 à peritissimo quidem medico. Vt dixi, in prin-
 cipiis quam minimum dissident signa à signis
 & siquis modus distinctionis superesset, maxi-
 me caloris intensio, & pulsus dilatatio, quę vi-
 dentur antecessura maiora, cum diaria inci-
 pit, sed neque id satis indicat, nā vsque dū cō-
 quiescit alteratio, quæ à causa procathartica
 fit, etiam in principio hæcticæ, hæc apparent.
 Neque ramen possis dicere, illam alterationē
 semper esse diariam febrem, nam nō omnis
 qui calet multum ira, febricitat. Verū etsi hæc
 secunda die facta fuerint, certior notitia fiet si
 tertiam diē suspectas horas(eas scilicet, qui-
 bus consentaneum est accessionem futuram,
 si eam esset febris habitura) sine cibo transege-
 rit(hoc quam multi medici suos agrotātes co-
 gebant facere, qui propterea diatritarij à Ga-
 leno vocati sunt. 10. meth. ca. 6.) ac neque ad-
 ditio vlla facta sit, neque effatu digna imminu-
 tio, sed primæ febris exiguæ reliquæ extendā-
 tur, ac cum scaldido corpore permaneat, & mi-
 ri calore in prima manus iniectione apparen-
 te: immorantibus autem diutius, acri, morda-
 ci, & scaldido occurrente. Itaque talem febrē
 hæcticā esse, existimare oportet. Sed cur Ga-
 lenus

lenus in his vltimis notis inquit, hæcticam esse existimare oportet, & paulo ante referens quæ accidunt secunda die, inquit, hæcticam fore suspicandum est, an non potius hæcticam esse suspicandum est? non sane quia in secunda die non est iam hæctica, sed quia nondum est firma cognitio, sed suspitio quædā, quod ut significaret inquit, suspicandum est fore hæcticam febrem cū verò iā cognitio certa est, febrē hæcticam esse existimare oportet. Hoc etiā expressit verbis quibus vsus est, prius enim dixit ὑποπτεῖν quod est dubitare, aut dubitanter suspicari, deinde verò ὑπολαμβάνει quod est censere, aut existimare. Hæc cōtinet præscripta capitis pars. Sed dubitabis adhuc fortassis, cur cū duos modos generationis hæctice febris superius dixerit, modo illam solū docet cognoscere, quæ ex procathartica incipit? Certè quia de hæctica, quæ sola cōsistit, instituit dicere, quæ verò succedit feбри ardenti, nunquam cōsistit sine putrida, saltem in principio. Non enim q̄ membra incipiant siccare, putredo quæ in humoribus est cesset.

Maximum verò tibi, & minimè anceps indiditū erit natura illius si nutrueris hominē, cū maximè firmiter videbitur transiisse omnes suspectas horas, statim enim prima hora

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

hora aut secunda à cibo, omnibus tangenti-
 bus laboratē alterum incrementum habuif-
 se videbitur. Neq; deerit qui increpet eos qui
 offerunt, tanquam intempestiue nutriendos,
 & in ipso potissimum tempore accessionis, et
 dicat diutius fuisse expectandum, atque prout
 accessionis inuasio cunctata fuit. Res autem
 non ita se habet. Omnibus enim hæcticis fe-
 bribus hoc proprium inseparabile est, vt obla-
 to cibo calor accendatur, pulsusque in magni-
 tudinem & velocitatem increseat, ita vt in-
 uasio accessionis minimè laboriosa videatur.
 Voco autem non laboriosam in qua neque hor-
 ror aliquis factus est, neque extremarum par-
 tium refrigeratio, neque veluti quædam incli-
 natio ad somnum, neque aliqua insignis pi-
 gritia, vel omnino inæqualitas quædam, vel
 in calore, vel in pulsu, multoque magis neque
 paruitas, neque debilitas, neque quidquam al-
 liud huiusmodi: sed quemadmodum & alte-
 ri cuiuspiam nutritio, pulsus statim maior ac ve-
 locior redditur. Fit quidem aliquando & in
 alijs febribus incompressum, seu non laborio-
 sum incrementum, & quod ad hoc attinet,

non

non utique videretur ipsarum hæcticarum proprium inseparabile symptoma esse, at non parum differt, si ad vniuersam dictorum inditiorum collectionem respexeris. In omnibus enim alijs febribus tales inuasiones incōpressæ fiunt citra oblatum alimentum: in hæcticis verò omnino contrarium accidit, neque enim ullo penitus tempore inuasio fit, sed vna est cōtinua febris, veluti quæ propriè nominatur cōtinens. Sed hæc quidem quandam veluti flammam per multam, imponentibus manum occurrentem habet, præter id quod pulsus in ea velocissimus, frequentissimus, ac maximus existit. In febribus verò hæcticis, neque calor multitudo occurrit, pulsusque tanto mino-
r, tardiorque est, quàm in continen-

*has febribus, quanto calor ipse minor existit
commune itaque omnibus hæcticis febribus,
quod debiles sint & æquales semper à primo
initio vsque ad extremum finem. Propriū au-
tem ijsquæ marasmo sunt affines siccitas, quo-
niam sæpenumero sine siccitate hæctica cōsi-
stunt, ubi non transmutantur in marasum,
quales nunc multis in magna pestilentia con-*

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

tigerunt, à continentibus igitur quemadmodum dictum est hæcticæ febres differunt. Ab alijs autem quæ incompressas habent annotationes eo ipso maximè dissident, quòd cōpressio quædam illis fit, si cibantur sub inuasionē paroxysmi: hæcticis autem, quædam velut incompressa annotatio post alimenta accidit, quæ non quidem est annotatio vt paulo antè dixi, decipit autem in exercitatos circa talia, multitudine caloris, & magnitudine, ac celeritate pulsum. Manifestius autè talis febris sequenti die cognoscetur, si diligentius obserauerimus, quousque post cibum oblatum homini, in calore ac pulsu alteratio permanferit. Nam omnia quæ manifeste apparent, tantisper alterata inuenientur, donec alimentis pristina distributio & adiectio, cordis siccitatem habuerit: Etauerit: deinde rursus ad pristinum habitum reuersa, in quo erant antequam homini cibus offerretur. Si igitur alio tēpore ipsum in sequenti die nutritur, rursusq; alio tēpore ea quæ sequitur die, inuenies quòd dico fieri, auctū quidē à cibo calorem, & pulsum ipsum, vt dictum est, alteratum. Videtur enim id eis accidere, quod

quod calci, & lapidibus calefactis. Si enim eis frigidissimā aquā affundas, multo calidiores apparent, nutrito vt videtur ab humida substantia sicco calore. Quæ autem causa sit ob quam hoc accadat, ad naturales quæstiones pertinet, q̄ verò ita accadat promptum est dicere, cuius volenti experiri. Vbi enim manibus suis calcis glebam arripiat, eius calorē contemnet, ac minimè sentiet, si verò ipsam humi deponens, illi aquam affundat, videbit statim admodum calefactā, atq; adeo ferbentē, veluti lebetes, qnādo ingēti occurrerint flāmæ vapor, præterea haud exiguū ab ea efferri cōspicies. q̄ si verò t̄gere ausus fueris, facile ex hac deureris, ita ad sensus iudiciū humidus calor identitiorem habet vim, quā siccus.

Tota hæc dictio continet signum vnicum quo hæcticæ febres ab alijs omnibus separantur, quod propriū est, atq; inseparabile illarū. Cōuenit enim hæcticis omnibus, & nullis alijs incalescere scilicet, vna aut duob⁹ horis ab assumpto cibo. Omnia fere hic scripta sunt aperta satis, si minima quedā declarētur. Quid sit ἐπισήμια id est annotatio, paulo superius dixeramus, est scilicet id tempus,

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

in quo morbus se manifestius insinuat, aut cū
 elucet. Dictio illa ἀλκωτος à nonnullis verti-
 tur incompressa, à nonnullis æqualis, à nōnul-
 lis illaboriosa. Neque mirum, nam quantum
 consequi possum, nulla dictio latina illi respō-
 det. Quare aut circūloquio declarāda est, aut
 multipliciter, ex ijs quæ continet conuertēda
 est enim ἀλκωτος Quod sine lucta sine certa
 mine fit, itaque annotatio quæcūque ἀλκωτος
 sine compressione, & sine inæqualitate calo-
 ris, aut pulsus, & sine labore. Sed Galenus
 ipse quia dictio erat obscura, illam finiuit di-
 cens voco ἀλκωτος in qua neque horror neq;
 extremarum partium refrigeratio est. Quod
 à Galeno dicitur hæctice sæpenumero sine si-
 citate consistunt, intellige sine magna, aut eui-
 denti: nam sine siccitate partium omnino. ^{ut}
 paulo antè diximus, non potest esse hæctice fe-
 bris. Est siquidem hæctice febris essentia, in ^{re}
 lore, qui in cordis substantia factus est habitua-
 lis, at verò nulla alia ratione calor potest esse
 in cordis substantia iam factus, quàm quòd
 euerla in ea sit temperatura radicalis, atq; cū
 morbifica cōmutata, & si non quantū in mar-
 core, aut in transitu ad marcorē, certè aliqua-
 tenus. At verò nō potest temperatura cordis
 corrupta aliquaten⁹ esse à calore febrili, quia
 aliqu²

aliquatenus etiã fuerit exiccata. Vbi legimus
vt nunc in magna pestilentia accidit, alij legũt
in magna fame, in meo codice habetur τοῦ
λοιμῶ in aliis forte λιμῶ mihi verisimilius fit
Galenũ dixisse in magna pestilentia, meminit
enim ille multis in locis magnę cuiusdam pe-
stilentia, quę suo tempore contigit, & ex aëre
pestilenti fieri solere hæcticas docet. 8. & . 10.
libris meth. & . 3, de præfagatione ex pul. acce-
dit, q̃ si qua ex causa potest fieri hæctica sine sic-
citate, maximè ex aëre pestilenti, ea scilicet,
quę est hæctica pestilens, quia hanc diximus
in superioribus esse ex putrefactione roris in
corde. Cũ ergo quę putrescũt humescãt pri-
mũ, hæc erit maximè sine siccitate, quę verò
ex fame fit, omniũ maximè fiet cũ siccitate,
quia fames est desiccatoria, vsque adeo vt li-
bello de marcore Galenus dicat, ex fame sole-
re homines marcescere: quãquã & in magna
fame legi potest non absurdè, critque sermo
de fame illa, cuius in quinto capit. huius libri
mentionem fecit. Itaque vtcũque legatur sen-
sus non erit absurdus. Causam quę hæctici in
calefcũt duabus horis ab assumpto cibo, ad
physicos inquit attinere magis quàm medi-
cos, sed rem explicat comparatione calcis, in
quam statim ac aqua infunditur, fit calor ma-
nifestus, qui antea non sentiebatur. Sed causa

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

huius est, quòd calor in substantia sicca nò potest efflorescere, accedente verò humore ferbet, quia ferbor à calore fit in humido. Ergo calor calcis facit ferbere humorem infusum, proindeque statim ac aqua est consumpta, cessat ferbor, ita calor hæcticus membrorum accedentem humiditatem ex cibo ferbere facit non verò ante vnam aut duas horas, quia non antea illius distributio fit. Propterea etiam arteriæ illorum concipiunt nouum calorem ex balneo, quod statim dicemus. Simile quiddã videmus quotidie contingere febricitantibus febre ardente, quorum calor solet ex potu aquæ frigidæ, stimulus is est, sedari, si parcius augeri, quia scilicet frigidus & copiosus potus vincit membrorum calorem, minus copiosus victus ferbet atque ita calorem auget. Quare temerè Auerrous. 4. col. ca. 33. vt alias sæpe, irridet rationem hanc Galeni, & ipse interim nullam reddit commodam. Quia enim, inquit, membra hæctici calida sunt alimenta calida faciunt, tamen cur calidiora quàm ipsa sint faciant alimenta, non dicit, aut cur ab alimentis quæ non sunt facta calidiora quàm membra illorum calor videatur auctus. Præterquàm quòd rationem Galeni Auerrous non intelligit, neque cur aqua ferbeat calx. & videtur respicere ad insulsam quandam rationem, quã

alij

alij barbari solent reddere, antiperistasis. De qua à nobis in primo libro Controuer. disputatum est, monstratumque falsa pròrtum esse quæ de antiperistasi vulgus philosophorū solet afferre. Reliqua in præscripta dictione non sunt obscura.

Quod vero calor siccus in hæcticis febribus, quas marosmus sequitur, existit, hinc tibi discere licet. nullus statim ab initio correptus fuit tali febre, qui corporis habitum humidum habuit, sed qui natura sicciores: & maxime si vna calida temperamento fuerint, vitæq; laboribus, vigilijs, ac curis deditam, delegerint, tenuiq; victu vsi fuerint, hos statim ab initio hæctica febris invadere solet, ex ira aut tristitia: ac magis si ætas fuerit, & constitutio calida & sicca, & regio etiã talis. Terminus aut eius principij, quum eo tempore quo diaria permitiore inclinatione, ad integritate veniunt, præter hoc quod nihil eiusmodi ipsis accidit, manifeste siccitas intèdatur: tunc enim primū à diarijs discedens hæctica iã efficitur.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

alter verò eius veluti incrementi ac complementi perfecti terminus est, tertio die facta accessio. Si enim vt paulo antè dictum est, eo die neque alia quædam accessio inuasit, neque ægrotus sine febre fuerit, siccitate illi aucta, talis febris haud dubie iam hæctica est, ac progressu temporis celeriter marasmodies erit nisi rectè curetur. Terminus autem transitionis eius in marasmodium est, quando primum pulsus debilis simul & durus fit: statim verò parvus ac frequens, is necessario est, non tamen propterea marasmodies existit, sed propter debilitatem ac duritiem. Debilitas namque ob vehementem cordis intemperiem, accidit: durities aut propter siccitatē. Quod si verò hæc pathemata cor ipsum occupauerint necesse est marasmode febre laborare animal. In eandem verò febrem incidunt ex acutis, & ardentibus febribus, plerique eorum qui male curantur, maxime quicunque cum frigida aqua potione egerent, neque illam biberunt, neque pro illa vllum aliud medicamentum refrigerans, thoraci & hypochondrijs adhibuerunt. Quod si præterquam q̃ nullum tale
ad

adhibuerunt etiam cataplasmata ex melle, quæ nunc frequenti sunt in vsu, plurimum usurparunt, ijs vt plurimum tabescant, promptum est, siue simpliciter febricitent, siue ex iecoris aut ventriculi phlegmone. Maxime enim has phlegmonas non rectè curatas, marasmi insequuntur, adeo ut nonnulli existima uerint nō aliter posse fieri hoc pathema, ignorantes neutrum horum, neque aliud quodpiā viscus, aut membrum, marasum aut vllam omnino hecticam febrem efficere, priusquā, vt dictum est cor patiatur. Incipit autem ci hoc pathema interdū ex se ipso, ut ex ira, & tristitia vehementi, ac diuturna, nonnunquā ex ardentibus febribus, quandoque ex pulmonis & thoracis pathematis, præsertim suppurationibus ac tæbe: vt autem ex ijs, ita ex ventriculo & iecore, atque vt summam dicatur, ex quauis diuturna inflammatione in principio parte, vna cum totius animalis, ac cordis præsertim siccitate, orta. Ego namque vidi phlegmonæ diurnæ coli intestini marasmi fuisse subsequutum, item stomachi, vesicæ, ac renum. Fuerunt Verò non minus etiā nonnulli

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

nulli, illorum qui dysenteria laborabant,
 tali febre correpti: cum scilicet intestina ipsis
 laborarent phlegmone. Præterea lenterias,
 & diuturna alui profluvia, ubi statim ab ini-
 tio, aut procedente tempore exigua incidit fe-
 bris, marasmi committantur: & ut in sum-
 ma dicatur, quando iam præexiccatum cor-
 dis ipsius corpus, calorem febrilem solutu dif-
 cilem acceperit. Quapropter maximum hæ-
 Eticarum febrium inditium est, ubi arteriæ
 circumiacentibus corporibus calidiores appa-
 rent, quod illis per alias febres nequaquam ac-
 cidit. Adhuc verò evidentius hoc fit sympto-
 ma, ubi sunt loti, aut alio quouis modo rarefa-
 cti, ita ut humor quidem profluat, atque calor
 transpiret. Siquidem in omnibus alijs partibus,
 moderatus calor, post tales transpirationes ap-
 paret: qui verò in arterijs est, nihilo minor
 priore. Is verò maxime exquisitè sentitur, per
 per pulsu dilatationes: qui neque ipsis in præ-
 dictis transpirationibus permutatur, sed omnino
 similes permmanent. Sola igitur consistens hæ-
 Etica febris, perspicua est, siue simpliciter hæ-
 Etica, siue simul marasmodes sit.

Modo

Modo incipit referre signa hæcticæ febris quæ iam est principium marasmi (ea est secundæ speciei) atque primum omnium inquit calorem in illis esse siccum, id est insubiecto arido, intellige verò (quod prius monstrauimus) nullam hæcticæ speciem esse sine siccitate, tamen in marasmi principio fieri siccitatē manifestam. Interim inquit, quod in decimo lib. meth. Dixit calidos tantum & siccos homines, atq; eos cū desiccanti uictu vsi sint, corripit febribus hæcticis à principio. Repetit duas illas notas inceptiōis hæcticæ febris, primā quæ fit in secūdo febris die, quæ nō est valde firma, aliā quæ fit in tertio, firmitior iā. Significat secundo transitū febris hæcticæ in marasmū pulsus debilis & durus, nā quāquā in prima specie hæcticæ paruus & creber fiat, insigniter tñ durus, aut debilis nō fit: quia durus fit ob vehementē siccitatē, debilis ob vehementē euerسیونē temperaturæ cordis, quorum neutrum diximus contingere in hæctica primæ speciei. In talem febrem incidunt frequenter, qui laborant febribus ardentibus, potissimum cum malè curantur, vt cum intempestiuè illis aqua frigida interdicitur, & cum opithematis refrigerantibus indigentes, tam longè abest vt illis vtantur, vt etiā vtantur calidis fomentis, vt ampla stro ex pane & melle. Hæc enim errata facile deducūt eos febricitātes in marasmū. decimo

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

meth. cap. 6. accusat etiam Galenus medicos
 empyricos suæ tempestatis, quod in ardenti-
 bus febribus hypochondria artomelite foue-
 bant. Ex hoc loco velim medicos admonitos,
 ne febricitantibus plus satis à frigida arceant,
 iam hinc scientes, se illos in hæcticas agere. Fit
 etiam febris hæc promptissimè, ex inflamma-
 tione hepatis aut vètriculi potissimum, dein-
 de verò etiam ex quacunque interna inflam-
 matione & dissenteria, & ex vlceribus pulmo-
 nis facillimè, cum nō rectè curantur, vel cum
 præ sua malitia non cedunt curationi (non e-
 nim est quod hæc omnia imputentur medici
 erratis) vt verò ex his causis fit hæc febris, quia
 desiccant cor, ita ex causa alia quauis, quæ po-
 test vehementer desiccare, vt ex lyenteria, aut
 diarrhæa, aut fluxu alio quouis, cum multum
 prorogatur. Hic illud vnum diffiniri debet,
 antequàm caput cōcludatur, ne quidquā dubiū
 supersit: posse fieri marasmi principiū, nō præ-
 cedēte prioris speciei hæctica, id quod vel ex cau-
 sa procathartica, vel ex ardēte febre aut inter-
 na inflāmatione aut vacuatione in modica. Nā
 cū dupliciter prima hæctice febris species ab
 alijs differat, & quod ros nihil fere cōsumptus
 sit, sed ebulliat, & quod in ea minima substan-
 tiæ cordis desiccatio sit, si causa alia, antequā
 febris generetur, tantam cordis siccitatem fe-
 cerit,

cerit, quanta in secundæ speciei hæctica esse solet, incipiet febris hæctica ab specie secundæ: eodem etiam modo, si febris ardens, antequam in habitum cordis transisset, ebullitionem fecit, erit quamprimum facta fuerit hæctica, principium marasmi, & ut in summa dicatur. (ut repetam ipsa authoris verba) cum iam præ exiccatum cordis ipsius corpus. calorem febrilem solutu difficilem acceperit. Desinēt ergo iam omnes mirari, hæcticam febrem à principio fieri, cum incipientem etiam marasum, ita fieri posse, monstratum sit. In extrema huius capitis parte, refert Gal. maximum quoddam hæcticarum febriū inditiū, quod opportunus fortasse paulo antè scriptum esset (est enim omnibus hæcticarum speciebus commune: habere scilicet arterias alijs partibus insigniter calidiores, potissimum post balneum, si illo utitur) nisi Galenus aliorum respexisset. Nempe erat sequenti statim capite scripturus signa hæctica febris, quæ cum putrida coniuncta est, cuius dignotio, ut verba Galeni quæ sequentur modo indicabunt, ex hoc signo potissimum sumitur. Ergo signū hoc, alioqui commune omnibus hæcticis, seruatum est in huius capitis finem, quoniam ex illius intelligentia caput sequens pendet. Causam quæ arteriæ alijs partibus sunt insigniter calidiores in hæcti

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
hæcticis, potissimum post balneum, ipse Gale-
nus redit satis luculenter.

CAPVT XIII.



Bi Verò cum alia qua-
piam coniuncta fue-
rit, difficilius iam co-
gnoscitur: quæadmo-
dum quæ nuper cui-
dam mulieri accidit,
cui non solum die, sed
etiam nocte, haud ob-
scure accessio fiebat. Latebat enim marasmo
des febris omnes qui eam visebant medicos,
existimantes oportere, neque principium in-
uasionis sensibile esse hæcticis febribus, neque
incrementum, neque vigorem, tanquam non
possit hæctica febre aliqua putridarum cõplica-
ri. Sed nobis in hac muliere statim primis die-
bus est cognita. Vtraq; enim inuasio, & quæ
interdiu, & quæ noctu fiebat, breues accessio-
nis partes efficiebat, & saepe cū madore quo-
dam, aut transpiratione vaporosa, tam per-
spicue

spicue soluebatur, ut corpus ipsum tangentibus bene temperatum sentiretur. Inditia vero in arterijs paulo ante dicta, semper manebant, quum similiter alijs partibus, neque refrigerarentur, neque velocitate aut frequentiam motus admitterent. Quæ igitur in alijs locis mihi sæpius dicta sunt, etiam nunc dicuntur, non oportere solum circuitus atque proportionales accessionum considerare, sed multo prius, ipsius febris speciem, atque ex hac cognoscere ipsas febres, quemadmodum homines ex propria forma. Sic ipsi sæpe in prima die speciem febris cognouimus, non expectantes aut triduanum aut quartanum, aut quotidianum circuitum. Sed de ijs abunde libro secundo de crisi bus dictum est.

EXemplo mulierculæ cuiusdam, in qua febrem marasmodem cum putrida cœiunctam cognouit, nos docet Galenus, dignoscere hæcticas cū putridis. Quæ ille in hoc capite docet, sunt satis manifesta, ex quibus hanc methodum ego elicio. Signa febris hæcticæ seorsum considerare, & seorsum signa putridæ: ubi utraq; videbuntur adesse, ambas

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

bas febres adesse scire licet: quamquam possunt vnius signa accessu alterius obscurari, tamen signum hæctica quod minimè obscurari potest accessu putridæ, est illud quod vltimo loco scriptum est in superiori capite, scilicet insignis calor arteriarum præ ceteris partibus. Nam annotatio illa in compressa caloris, quæ post cibum fit, potest sub accessione febris putridæ præteriri, ariditas etiam occursu vaporum potest sensum latere, & æqualitas caloris & pulsus interrumpi, & paruitas potest à pulsu gratia putridi caloris abesse, tamen insignis ille arteriarum calor, nunquam ab ea abest, & in arterijs etiam relinquitur, soluta putridæ accessione, si modo intermittens est: quo tempore clarius cognoscitur. Cum enim arteriæ amittant magnitudinem, celeritatem, aut frequentiam non amittunt. Ex his manifestum est, difficiliorem esse cognitionem hæctica febris cum putrida continua complicatæ: verum illa etiam euadet haud multo difficilior, si quis curet febres per propria signa cognoscere, non tam aduertens animum circuitibus, quàm propriæ febris formæ, ut hominē ex propria forma iudicauimus. Hanc cognitionem docet Galenus ipse secundo de crisi bus, capite secundo, vituperans eos medicos qui non aliter ac vulgus hominum, tertianam cognoscit febrē, quia

quia repetijt tertio, quartanam, quia quarto die. Non enim id peritum medicum decet, sed signis quæ in quacunque febris specie accidunt, illam per se cognoscere, non expectata altera accensione. Nam ei qui hanc facultatem exercitatione fuerit consequutus, nihil intererit intermittens aut continua febris sit, ut cognoscatur, siue sola sit, siue cum hæctica coniuncta. Sed ex quibus signis cognoscenda sit cuiusque febris species, putridæ potissimū, in sequenti libro dicetur, & in secundo de crisis dictum copiosius est.

CAPVT XV.



*I*ctum autem est nihilominus illo etiam in libro quomodo diarum febrium differentias cognoscere oportet. Promiseram quidem, scio, hoc loco me de illis dicturum:

sed cum recordarer pauca quedam in eo libro desiderari, ut perfectè omnia dicantur.

D E D I F F E R E N . F E B R I V M .

lia quidem huc transcribere superuacuum duxi: ea tantummodo, quæ non satis in ipso sunt definita adijciam. Qui ex vstione solus febricitant, ijs cutis magis ad calidiorem ac sicciorẽ habitum, quam pulsus ad febrilem affectum mutatur: qua propter tales minus sunt sitibundi, ijs qui æqualem habent caliditatem: atque ad primam manus iniectionem, calor in ipsis vigere videtur. Contra quam in ijs qui propter quandam constrictionem agrotant: in ijs enim increscit. Caput præterea peruri maxime videtur ijs, qui ex vstione solus febricitant: gaudentque magis, & iuuantur frigidis perfusionibus. Oculi quoque ipsis rubicundiores & calidiores videntur cum siccitate, citra grauedinem & destilationem laborant: quibusdam enim à solè perustis, hæc quoque accidunt, caputque ipsis non modo calidum, sed & sanguine plenum, adeò, vt omnes Venæ quæ in oculis & temporibus, & fronte, & tota facie habentur, plurimũ extendantur. Est autem non minimum discrimen illorũ, ab ijs, qui ex humorũ frigiditate febricitant, quod valde pleni sũt. Nã & ex ijs quibus caput ma-
le

lè afficitur, grauedinibus & destilationibus
 propterea capiuntur, & febris ipsis interdum est sym-
 ptoma, solius in capite affectus. Magna vero
 ex parte tunc magis febricitant, quam totum cor-
 pus à sole incaluerit, vel alserit. Est vero cutis
 minus calida refrigerata, corpusque maiorem præ-
 fert mollem, & nullus in facie scalar, qualis est
 illis, qui ex solis uestione febricitant sine capitis
 repletione. Magna igitur ex parte omnibus ta-
 libus caput repleti solet, nisi quis exquisitè pu-
 rus fuerit, & corpus excrementis vacuum ha-
 buerit. His enim solis accidit, ut calefactum ca-
 put sine repletione permaneat. Verumtamen interdum
 euenit, ut plurimus calor ipsum totum à sole deu-
 stum occupet, absque eo ut impleatur. Hic igitur
 affectus, manifestissime dissidet ab eo quem fri-
 gus excitat: at qui cum plenitudine est, difficile
 discernitur, ut qui destilationem ac grauedi-
 nem asciscat, quæ etiam refrigerata accidunt.
 Sed ut dictum est, siccitas & nimius calor cu-
 tis, & quæcunque alia paulo antè dixi, pro-
 pria à sole uestionum existunt, de quibus plenius in
 curatiua methodo dicetur, cum omnibus alijs
 diariæ febris differetijs, quarum dignotiones

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

*quia in secundo libro de crisi-
bus perstrinximus, nihil item opus est, ut nunc explicemus:
sed hunc quidem librum hic finiemus: dein-
ceps verò febrium quæ ex humoribus accen-
duntur, omnes differentias dicemus.*

Promiserat Galenus paulo superiùs in no-
no capite, se in hoc libro dicturum signa
singularum specierum diariæ febris, nunc
ergo promissi memor, de illis volebat agere,
recordatus verò se de illis copiosè satis dispu-
tasse alijs in locis, maximè. 2. de crisi-
bus cap. ultimo, quod caput totum ferè translatum
etiam est in secundum caput primi de arte
curatiua ad glauc. Pleraque omittit, de dua-
bus tantum, ijs inquam quæ ex vstione, & ijs
quæ ex refrigeratione, cum quia hæ extre-
mè differunt, tum etiam, quia de illis nō satis
erat in alijs locis disputatum, differens, atque
de illis admodū breuiter, ut breuitas procul-
dubiò obscuritatem aliquā, quæ à Galeni scri-
ptis esse solet aliena, pepererit. Nostrum ergo
erit modò, quæ de illis duabus in hoc capite
dicuntur, exponere, deinde quæ hic desunt,
addere ex alijs locis: quod faciemus hæc pri-
mùm præfati. Febrium diariorum nō aliud
sumuntur species, quàm ex causa procathar-
tica

rica. Quamquam hæ species re vera non sunt, nō enim externa causa nostrorū affectuū potest species permutare, sed ita distinguuntur à medicis, quia ad curationem illarum, refert quamplurimum scire ex qua causa febris fiat, id intelliges ex ijs quæ Gal. docet octauo libro meth. in quo harum omnium docet curationes, nequaquam omnium vnicam, sed aliam, atque aliam pro ratione causæ, id verò fit non quòd causa procathartica indicationem aliquam præstet perse ad curationem (nā Galenus ipse. 3. meth docuit ex ea causa, quæ præterijt, nullam indicationem curatiuam sumi) sed quòd non omnes eodem modo corpus afficiant, sed diuersimode: aliæ vrendo, aliæ adstringendo cutem, aliæ desiccando, aliæ magis debilitando facultatem, aliæ minus, quamquam ex diuersis alterationibus, Idem tandē affectus prodit, puta febris. Itaq; illarum distinctio plurimum facit ad curationem, tamen signorum cognitio ad curationē quā minimū facit, nam licet interrogando ægrum, causam procatharticam discere, sprete signis, sed tamen est multo pulchrius per te ipsum posse scire, ex qua causa febris sit, quàm ægrum interrogare. Nam ex dignotione accedit medico magna gloria, & habetur ei multa fides. Venio ergo iam ad ea quæ in hoc ca-

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

pite habentur. Qui ex solis vstione febricitant;
 illi magis habent calorem & siccitatem in
 cute, quam febriles differentias in pulsibus:
 causa est quòd maiorem habent calorem ex-
 teriùs quàm interiùs, proinde etià minus sunt
 sitibùdi, quàm qui æqualem habent calidita-
 tem, id est tam intense calent interiùs quàm
 exteriùs. Calor in febricitantibus ex vstione,
 in prima manus iniectione videtur vigere:
 contra illis qui febricitant propter constrictio-
 nem cutis, quia non videtur statim vicens, sed
 deinde increfcit. Caput præterea peruri ma-
 ximè videtur ijs, qui ex vstione solis febrici-
 tant: & gaudent magis quàm alij, & iuuantur
 perfusionibus frigidis, nimirum curantur con-
 traria contrarijs, & proinde ad dignotionem
 maximum argumētum sumitur à iuuantibus
 aut nocentibus. Oculi etiam videntur febrici-
 tantibus ex vstione, rubicundiores & calidio-
 res, id què cum siccitate, nisi grauedinem aut
 destillationem simul habeant cum febre. Ita
 enim, habebunt in oculis calorem, sed non
 siccitatem. Potest verò etiam ijs qui à sole vsti
 sunt accidere grauedo & destillatio, & qui-
 busdam illorum accidunt, habentque hi non
 modo plenum caput, sed plenius etiam quàm
 alij: habent caput calidum, & plenum sangui-
 ne, & venas omnes, quæ in oculis, & tempori-
 bus

bus, & fronte, & tota facie habentur, plurimum extentas, vsque ad eò vt hac ratione, inter cetera, differant à febricitantibus ex frigore (hos vocat febricitantes ex humorum frigiditate, non admodum caute, nam ex frigiditate humorum nulla febris fieri potest, & nulla diaria est ex humorum alteratione. Et perfrigeratio quæ febrem facit, solas circa cutem partes adstringit, quæ viscera ad humores tangit, non facit febrem sed contrarium affectum) quod valde pleni sunt, plus quam illi: vtrique tamen quibus caput male afficitur vt vltione, aut refrigeratione, prompte capiuntur grauedinibus & destillationibus, & nonnunquam ipsa grauedo febris causa fit, vt non alia causa febricitent quam quod grauedine laborant, estque tunc febris grauedinis symptoma: magna vero ex parte non fit febris à grauedine, sed febris & grauedo fiunt simul ab vltione aut refrigeratione, cum totum corpus simul incaluerit, aut alferit. Itaque in his similes ferre sunt, & qui ab vltione, & qui à perfrigeratione febricitant, cum grauedine simul tenentur. Sed sunt alia signa. Est cutis minus calida refrigeratis, corpusque maiorem præfert mollem, nam & quali tumidum, & in facie nullum habent scalorem, qualem habent

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

illi qui febricitant ex vltione, sine repletionem capitis, sed magna ex parte, illi, qui exusti sunt (hæc repetit Galenus non admodum vtiliter) repletionem etiam capitis patiuntur, nisi admodum puro sint corpore, & vacui excrementis. In his enim qui tales sunt interdum evenit ut plurimus calor, corpus totum à sole deustum occupet, quin caput impleatur, qui affectus promptissimè dignoscatur, ut dictum est, à febre, quam refrigeratio fecit. Sed cum illæ febres cum repletionem capitis iunguntur, siccitas & nimius calor cutis, & quæcunque alia dicta sunt, eas distinguit. Hæc continet præsens caput, sed non erit inutile, eorum etiam quæ à Galeno alijs in locis dicuntur, lectorem hoc in loco admonere. Dictum hic est de febribus diarijs ex refrigeratione, cutis constrictione, & vltione: supersunt cruditas, & satietas, & nimia exercitatio, ac vigilia, & animi perturbationes, puta, cuncta, timor, mestitia; & ira. Cū ergo ex harū causarū aliqua, febris fit, aliquā causa ipsa cū febre durat, aliquā durat febre causa præterijt. Harū causarum quæcūq; accidētia quædā affert, quæ simul cū ipsa causa evanescunt, & quædam alia quæ abeunte causa perseverant: ut iram sequitur pulsus altus, & calor: pulsus altitudo, statim ac ira sedatur, tollitur: calor verò solet perseverare

rare aliquantopost, sedata ira. Ergo intererit
 quam multum ad cognoscendum ex qua cau-
 sa febris diaria procedat, in ipsarum causarū
 procathartidarum cognitione exerceri, vt in
 cognoscendis ijs quæ nimium vigilantibus ac-
 cidunt, & iratis. Nam his plane perspectis, fa-
 cile distinguemus febrē ex vigilia, a febre ex
 ira. Igitur singulæ perse expedit, vt notæ dica-
 tur. Cruditas cognoscitur ex ructibus, qui refe-
 runt corrupta alimenta, cum sint modo acidi
 modo nidorosi. Satietas cognoscitur ex sensu
 quodam ponderis in ventre, aut ventris velu-
 ti tremore. Nimiam exercitationem cogno-
 sces ex sensu lassitudinis, & desiccatione cor-
 poris: vigiliam, ex oculorum excauatione, &
 palpebrarum demissione, & oculorum in con-
 tinentia, & circa ipsos humiditate. Quod ad
 animi motus attinet, cura, & profunda medi-
 tatio, & timor, & mœstitia, similes quodam-
 modo faciunt passionēs: ira diuersam satis ab
 illis omnibus, quamquam & illæ etiā inuicē
 differunt. Habent verò notas, circa pulsus, &
 colorem, & corporis habitum, & circa ipsos
 oculos. Nulla enī pars est corporis, quā me-
 lius animi motus represententur. Nimirum
 iratorum pulsus, altus, magnus, celer, & cre-
 ber est, & vehemens: gaudentiū pulsus magnus
 rarus, in vehementia nihil mutatus, tristitiū

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

paruus, languidus, tardus, & rarus. Timor similis pulsus habet tristitia; præterquā si recens sit, & vehemens, tunc enim celeres & inordinatos & inæquales & bibratos. Similes etiam mœstitię pulsus facit cura lōga & studium, præterquam q̄ tristitia plus debilitat facultates. Quare cum ex mœrore, vigilijs & cogitationibus, omnes decolores fiant, & excauatis oculis, irata tamen neque decoloratio accidit, neq; excauatio. Hęc verò, excauatio inquam oculorum, & extenuatio corporis & inconsueta decoloratio, conspectiora sunt in ijs quos vexauit tristitia, quā in ijs quos cura. Iis quoque quos vexauit tristitia, calor est acer magis quam multus, contra ijs quos ira multus magis quā acer. Hęc ergo qui meditatū prius fuerit, facile dignoscet ex qua causa diaria febris sit. Nam si causa adhuc durat, signa hæc omnia aderunt, & conspicua, si vero abcesserit, sed non ita diu, vt consentaneū est hominē febricitante adhuc ex illa, aderūt signorum quamplurima, quāquam possint aliqua abscississe, vt pulsus altitudo elapsa, ira, & bibratio, elapso timore. Ratio itaq; dignoscendi diarum febrivū species omnes, hęc est.

DE

DE DIFFE- rentia febrium.

LIBER SECVNDVS.

CAPVT PRIMVM.



EST AT itaque, ut febrium quæ ex humorum putredine accenduntur differentias percenseamus : hoc prius de eis dicentes, haud sufficere, quod nonnulli opinantur, ad gene-

rationem febrium, augeri atque exuperare biliosum humorem, quem alij quidem pallidam, nonnulli verò flavam nominant bilem. Sic enim omnes icterici vehementissimis laborarent febribus, quibus talis bilis copia in toto corpore continetur. Sed non febricitat, nisi
alia

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

alia quadam causa concurrat, de qua paulo post dicetur.

Continuit primus liber differentias, & causas, febrium diariarum, & hæcticarum, hic secundus dicatus est solis putridis. Datus verò est huic febrium generi suus liber, quia est maximè multiplex, & secundum materiã habet plurimas species. Extirpat Galenus in principio falsas quorundam opiniones, de febrium putridarum causis, & differentijs, vt ex illarum refutatione ad veram sententiam gradus fiat. Primum omnium, falsum est, quod nonnulli sunt opinati, ad febris generationẽ, satis esse multam bilem colligi in corpore: nã ita icterici semper febricitarent, vtpote in quibus multa bilis copia in toto corpore redundat, vt docet illorum color: sed non febricitant semper, quamquam semper multam habent bilem: ergo aliqua alia causa est opus, de qua procedente sermone dicetur, puta putrefactione aut vstione. Hoc idem de reliquis omnibus humoribus dicitur verè: non satis esse vt pituita redundet quo febris fiat, neque vt melancholia, nisi illis aliqua alia alteratio superueniat. Nam humores illi supra modò aucti, sunt cacohimix causæ, febrium non sunt, nisi

nisi putrescant. Sto igitur iam hinc iactū hoc fundamentum ad dicenda, nullius humoris redundantia (excepto sanguine) sufficere ad febris generationem, nisi alia alteratione accedente. Bilem, nunc dici palidam, nunc flauā, satis constat, quia ambo colores illius sunt: flauus syncerioris, palidus dilutioris pituita aut fero. Sed de ijs in primo libro Contro. abundè dictum est.

Absurdum Vero hoc etiam est, in quartanis & quotidianis febribus exquisitis, coacerbari amarā bilem existimare, quemadmodum in tertianis & causis: etenim contra in quotidianis ac quartanis febribus, neque vomitus biliosi, neque sudores, neque vrinae, neque deiectiones videntur biliosae: praeterea neque quidquam aliud, eorum quae praecesserunt, aut cum eis simul sunt, testimoniū præbet. Nam tertianae febres omnino in corporibus natura biliosioribus consistunt, & in etate vigenti, quae omnium aetatum biliosissima est, ac aestiuo tempore maxime, quo huiusmodi humor exuperat. Sic quoque in regionibus temperamento calidis & siccis, & con

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

& constitutione ambientis aeris tali, vita etiam non tranquillitati aut ignavia dedita, sed laboribus, curis, vigilijs, soli sq; vstionibus & exiguis cibis contenta, & ijs quidem calidis & siccis. Quinetiam vsus medicamentorum calefacientium & exicantium immodicus, febres tertianas affert: quotidiana vero contra penitus in pituitosioribus naturis, consistit & ex anni temporibus in hyeme, inq; constitutionibus frigidioribus & humidioribus, senibus & pueris magis in regionibus humidis et frigidis, vita, otiosa simul & cum satietate, & maxime cum a cibis loti fuerint & multo sane magis, cum ipsi cibi natura pituitosiores sint. Sed neq; tales biliosum humorem vomunt, neq; deijciunt, neq; persudores excernunt, quemadmodum in tertianis febribus: haec enim ex flauabile putrescente fieri consueuerunt: quotidianae aut pituitosos humores sequuntur, veluti quartanae melancholicos. Sic itaq; natura corporis magis melancholica, & etas declinans: & autumnus tempus, neque non omnia quae ijs proportionem respondent in cibis & potibus, ac vniuerso victu, frigida & sicca temperamento existen-

existentia, febres gignunt quartanas. Quapropter rigor, qui eas præcedit, nequaquã similis est, sed in tertianis quidem causa efficiens veluti purgantis ac vulnerantis sensum indicat. In quartanis autem, quasi refrigerantis.

ERat alia opinio absurda, quorundã putãtiũ, omnes febres nasci ex bile, quæ assertio falsa est, etiam si de solis putridis febribus intelligatur, quãquam Hippocrates quoque illud videretur opinari. 7. partiaph. 42. appellans febres non ex bile, diarias febres, quasi omnes putridæ ex bile sint. Ceterum nullatenus putat Gal. ita sentire Hippo. sed illo in loco sub bilis nomine intellixisse omnem humorem putrescentem, non quòd bilis reuera omnis talis humor sit, sed in quadam nominis acceptione. Sed vtcunque dicatur, monstrat Gal. falsam esse eam assertionẽ, qui oppositus, tertianas ex bile, quotidianas ex pituita, quartanas febres ex melancholia nasci. Mõstrat illud ex exeuntibus: tertiana enim affecti, eijciunt biliosa, cum vomitu, tum deiectione & sudore, & alijs vijs: quotidiana laborantes pituitosa: quartana affecti, melancholica. Est aliud argumentum ex naturalis illorum qui

DE DIFFEREN. FEBRIV M.
qui febribus illis corripiuntur, & regionibus,
& ætatibus, & victu. Omnia enim hæc at-
stantur bili, tertianis: pituitæ in quotidianis:
melancholiæ in quartanis. Nam tertianæ fie-
ri solent in naturis biliosis, ætate florente (hec
est a. 25. ad. 30. aut. 35.) quæ omnium ætatum
est biliosissima, quia cum siccitate calidissi-
ma est: & in æstiuo tempore, & regionibus ca-
lidis & siccis, & vita in laboribus, curis, vigi-
liis, vstionibus, & exiguis cibis, ijsque calidis
& siccis, acta: adhæc, vltus immodicus medica-
mentorum calidorum tertianas parit: quoti-
dianæ verò in naturis pituitosioribus, in hye-
me, inque senibus & pueris magis. Intellige in
senibus & pueris magis, quàm in aliis ætatibus
haud quaquam in senibus, & magis in pueris,
id est, in pueris magis quàm senibus, vt vide-
tur significare translatio quàm Fucius sequu-
rus est, indigeret enim illud longo examine,
& Galeni verba nihil tale significant, sed
γέρωντες καὶ παῖδες μᾶλλον, senibus sanè &
pueris magis. Vsq; adeo nonnunquam sola
vocalæ vnius transpositio reddit obscuram o-
rationem. Senibus ergo accidunt pituitosi mor-
bi, quamquam frigidi & sicci tēperatura sunt
quia multis succis crudis redundant gratia de-
bilis facultatis coctricis, quam habent. Pueris
accidunt tales morbi, quamquam vt ab Hip-
pocrate

pocrate dicitur in aphorif. plurimum habent innati calidi, & vt dicitur. 2. de temperamentis, & innumeris alijs in locis, non habent remiffiorem calorem quàm iuuenes, eadē prorsum ratione qua abundant multis cruditatibus, & habent crassam vrinam, & omnia excrementa cruda, scilicet, (vt dicitur. 6. epide. part. 3. com. 15.) propter voracitatem & intempestiuos motus. Fiunt etiā quotidianæ febres in regionibus frigidis & humidis, & in vita otiosa, & satietate, potissimū si se statim post cibum lauerint. Nimirum vt dicitur libr. de Marcore. cap. vltimo balneo vtēdum est per acta coctione, ante famem. Nam balneū crudis adhuc cibis, facit crudorum distributionem, per famem facit debilitatem. Quartanæ febres fiunt in naturis melancholicis, in ætate inclinante (est illa prima senectus & ætas consistentium appellata, ea inquam quæ statim à iuuentute accedit) in qua melancholia redundat, quia vt inquit Galen. 2. de temp. capit. 9. qui ex habitus mutatione frigidus siccusq; est redditus, necessariò hic talis etiā melancholicus est, verbi gratia, si quis antè calidus & siccus & sanguinis vstione plurimam generauit atram bilem. Itaque hac ratione prima senectus est melancholica, quia consequitur statim vrentem humores ætatem. Frigiditas er-

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

go superuenies, melancholiam facit, non aliter ac autumnus melancholicus est, quia aestas succedit, quāquam ipse non magis est frigidus quam calidus: sed vtrūque inaequaliter. extrema senectus, non est quod sit melancholica, neque enim iam calida & sicca succedit, ut prima, & habet facultatis magnam inbecillitatem, quam illa nondum habet. Sed hæc satis explicuimus: tertium argumentum quo intelligimus febres illas non omnes ex bile fieri: accipitur ex diuersis rigoris modis, qui haudquaquam similis fit in omnibus, sed ut dicetur procedente sermone, in tertiana fit rigor maior, in quartana minor rigor, aut solū horror, in quotidiana solet fieri frigus solum, aut etiam horror, aut saltem paruus rigor, atque cum rigent, qui tertiana laborant, rigent plus & sentiunt in membris punctionem, in quartanis & quotidianis magis refrigerationem. hoc idem est, quod .i. de art. curand. ad glau. cap. 5. dictum est his verbis. rigor autem veluti si à re aliqua acuta plusquā frigida cutis pungeretur: cum ij qui quartanam aut quotidianam intermittentem patiuntur, potius frigidum rigorem sentiant.

*De forma verò quæ in rigoribus est dictū
est satis inter causas symptomatum.*

Omit-

O Mittit modo Gal. dicere formam rigoris
 & qua ratione differant rigor & horror,
 & frigus, quamquā ad hanc disputationē
 facit quam multum, quia de illis in libro. 2. de
 causis symp. abunde disputatum est, eadē ra-
 tione nos hęc pręteribimus quia Gal. illic ea
 docuit satis distincte, & scorsim scripsit libel-
 lum de tremore, & rigore, & palpitatione, &
 nos ipsi de his caput quoddam longum scri-
 psimus in quinto libro controuersiarum Qua-
 re modo illud vnum dicemus, rigorem esse con-
 cussionem magnam omnium membrorum,
 horrorem verò motum quendam solius cu-
 ris, & partium circa illam: frigus appellari, cū
 sine motu quopiam deprauiato, frigus extre-
 morum agrotus sentit. Rigor fit ab humore,
 qui defertur per sentientia membra & illa
 mordet: horror cum hęc fiunt sed remissius
 scilicet aut humor minus mordax est, aut len-
 tius defertur per membra, quia crassior est,
 aut lentior: frigus fit cum humor refrigerans
 incidit in sentientes partes, sed illis hæret
 immotus quia valde crassus lentusue est.
 igitur (huc enim refereuntur hęc omnia)
 si hęc symptomata ex tam diuersis humo-
 ribus fieri solent, & febrium quædam inci-
 piunt à rigore, vt tertianæ, quædam à
 paruo rigore aut horrore, vt quartanæ:

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

quædam à frigore, vt quotidiana, non omnes ex eodem humore fiunt, puta ex bile, sed ex diuersis vt diximus.

Ibi & de febrium eiusdem generis differentia demonſtrauimus, vt ex eis quidem intermittentes (ſic autẽ appello venientes ad ſenſibilem infebricitationem) ex humore moto, et per vniuerſum cõpũ delato conſiſtunt: continua autẽ ex eo qui in venis includitur, ac cõtinetur, de quarum dignoticiene in libro. 2. de criſibus dictũ eſt,

HActenus Galenus monſtrauit differre febres humorales materia ex qua fiunt, modò differentiam aliam innuit, febriũ quæ ſunt eiusdem generis, id eſt ex eodem humore (differentiam hanc dicit ſe etiam inter cauſas ſympt. attigiffe) puta febres quæ ex eodem humore fiunt, alię ſunt continuæ, aliæ intermittentes, vt bilioſarũ, aliæ ſunt continuæ aliæ intermittentes, ita pituitoſarum, aut melancholicarum. Verrit Leoniceuus. Ibi etiam generis febrium diximus differentiam. Quã verſionem alioqui non attingentes mentem Galeni ſequuti ſunt omnes commentatores. Sed Gal. ita ſcripſit ἐνθα καὶ πρὸς τῶν ἀμυντῶν πυρετῶν ἀποδιόκται διαφοράς, id eſt, vbi

vbi de omogenearum febrium differētia mōstratum est. Febris continua fit ex humore putrescente intra vasa: nam cum humor qui aētū putrescit, cum alijs qui parati sunt putrescere, permixtus est, non potest nō putredo ira serpere, vt vna continua putrescentia fiat: cū verò humores extra vasa fusi putrescunt, & in partes sentientes incidunt, intermittens febris fit. Itaque ex eisdem causis fiūt intermittentes febres, & rigores, ambo enim fiūt quia humor expulsus à vasis deferretur per membra tunc enim necessario fit febris intermittens, quia consumpta ea portione humoris à febre liberum manebit corpus, vsque dum alia à venis effusa, putrescat. Interim tamen fieri potest vt homo nulla hora non febriciret, scilicet si febris sequens præuenit, antequam cesset prior, nihilominus tūc quoque febres ipse intermittentes sunt. Quæuis enim illarum per se incipit, & per se soluitur. In quam sentētiā dictum est ab Hippo. 4. part. aph. quibus quotidie rigores fiunt, quotidie febres soluantur. an febres quæ dicuntur intermittentes verè soluantur, an non insequentibus declarabimus.

CAPVT. II.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Febrium igitur intermittentium tres sunt
 vniuersa differētia, quotidiana, tertiana,
 & quartana. Quotidiana quidem ex pituita
 putrida: ex vtraque verò bile, flaua qui-
 dem tertiana, atra verò quotidiana effici-
 tur, inter continuas autem, ex flaua bile du-
 plex genus est, vnū quidē, earū quæ continen-
 tes nominantur: quarū vniuersum tēpus vna
 est accessio, ab initio vsq; ad finē: alterū verò
 earum, eodē quo genus nomine, cōtinua dicta
 multis particularibus circuitibus continentur.
 Cōtinentiū igitur differētia oēs tres existunt:
 quādā enim earū ab initio vsq; ad finē equa-
 les permanēt, quādā paulatim augetur, tertiæ
 aut aliæ paulatim decrescūt, ac nonnulli primas
 quidē nomināt equales, atq; vigentes grace
 ἐμὸτ' ἰσοῦ & ἀκμασικουῶς, secundas autem
 increscentes & inualescentes grace ἀναβα-
 τικουῶς & ἐπακμασίουῶς tertias verò inclinan-
 tes grace παρακμασικουῶς.

IActis iam fundamentis & refutatis falsis o-
 pinionibus, diuisione februm putridarum
 ingreditur modo Gal. dictū est, febriū putrida-
 rū, quasdā esse intermittētes, quasdā cōtinuas
 modo hæc duo mēbra subdiuidit in tres alias

differentias, ex materia sumptas. Intermittēs, aut est tertiana, aut quotidiana aut quartana, quia aut fit ex bile flaua, aut pituita, aut melan chola, nā ex sanguine nūquam fit intermittēs quia nō emittitur extra vasa cū paratus est pu trere: id facit, quantū assequi possum, eius mi titia, & familiaritas quæ naturæ cū illo interce dit. Continuarū verò triplex etiam est genus, quēdā enim biliosæ sunt, quēdā pituitosæ, quē dā melācholicæ. Rursum continuarū ex bile, quēdā sunt quæ cōtinuæ appellātur nomine ge neris, quēdā cōtinentes, à græcis *συνεχοί*, non quod dictio græca sit, sed vt dicit Gal. 9. me th. ca. 2. maluerūt medici solecismū cōmittere quā illud febriū gen^o sine nomine relinquere. rursum febres cōtinētes, tres alias habent spe cies, aut enim statim ac incipiūt vigēt, & eūdē tonū toto tēpore seruāt, aut statim quidē vigēt & perpetuo decrescūt, aut à principio ad finē augētur semper. Quod febres aliquæ statim vi geāt, ita intelligi debet, vt statim in ipso primo die summū vigore obtineāt, & principiū, & au gmētū, breuissimē prætereant: non ita vt illis tēporibus careat febre: neq; enim fieri pōt vt morbus aliquis propriū statum recipiat, non præcedente principio & ascensu, vt inquit Ga le. 1. de crisi bus capit. 17. Causa qua hæ febres continentes fiunt, est, vt dicitur. 11. methodi.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

cap. 4. quia putredo fit in omnibus vasis magnis æqualiter (ea sunt, quæ inter inguina & alas consistunt) & replentur. valde tota illa vasa putrescētē humore: æquales verò fiunt, aut increfcētes aut decrefcētēs (9. metho. capi. 3.) quia tantū exquisitè humoris inflāmur quātus vapor trāspirat, aut minus inflāmur, aut plus. Id verò fit sine accessionibus, aut annotationibus, quia humor putrescēs non mouetur sed quietus putrescit. Sed hærent hic cōmentatores, quod Gal. innuerit febres omnes continnas ex bile fieri. Legūt enim omnes, febriū continentiū quæ ex bile ortū habent, atq; proposita quæstione mille querunt responsa, nō satis cōsona. Fucius inquit Galenū appellasse omnes humores putrescentes bilē, eo q̃ omnis etiam pituita putrescens degenerat in bilem quodammodo. Id dicit factum exemplo Hippocra. 7. aph. 32. vbi ita dicens, febris nō ex bile infusione aquæ curatur, omnes humores putrescentes, vilus est appellare bilem. Sed vtunque Hippocrates fuerit loquutus (fortasse enim illa sententia aliū sensum tulerit) certè Gal. nunquam, saltē in hoc opere, ita bilis nomine vtitur, ne in hoc ipso capite, sed vt bilis ab alijs humoribus differt, quare obscure prorsum loqueretur, quod ille solet cauere quam maxime. Nos ergo hanc dubitationem effugimus

LIBER SECVNDVS. 101

gimus, nihil aliud quam Galeni ipsius verba considerantes. Ille enim ita scripsit. *Τὴν δὲ συνεχῶν ἐπὶ μὲν τῇ θανάτῃ χῶλῃ διττὸν εἶδος* id est, continuarum autem, aut inter cōtinuas autem, ex flaua quidem bile duplex genus est, non itaque asserit omnem continuam febrem esse ex flaua bile, sed duplex illud genus continuarum ex bile. Sed rogabis quā ratione dicit continentes nasci ex bile cum ex solo sanguine sint, aut si nō ex eo solo quā ratione possint ex bile fieri, possint etiam ex alijs humoribus. Hic respondet Leonhartus fuchsius quod res ipsa habet, & quod omnes, qui in illius dogmatis non nihil sunt assequuti intelligunt ex Galeno. Febres continentes ex sanguine fieri, aut putrescente aut non putrescente, & ita synochum esse duplicem, alium sine putredine alium cum putredine. (nomine sanguis intelligi debet aut sanguis solus aut omnes humores) verū eam febrem ex bile factam dici, quia vt dicitur secūdo de crisi bus, quæ ex sanguinis putredine fit, iam quodammodo biliosa est: sicuti in naturalibus sermonibus iam monstratum est, quod sanguis ex moderato calore generatur, flaua autem bilis ex maiore, atra verò ex sufficienter immodico. Quidquid igitur tenue & pingue in sanguine est, fit flaua bilis; crassa verò ac veluti fex, quando

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

immodicè calefactum exaruit, atra. Itaque Galenus ad biliosarum genus vult referri synochos, alioqui ex putrescente sanguine consistentes. Qua ratione sanguis possit putrescere, & febrem putridam facere dicemus, in enarratione noni capitis, modo illud vnum satis est dicere, continentes cum putredine, fieri putrescente sanguine, & esse in genere biliosarum. Verùm illud oportet vt monstretur, continentes ex nullo alio humore fieri, quàm putrescente sanguine iuxta Galeni opinionē, & vt causas, quibus id soli sanguini contingit, dicamus. Insedit enim menti quorundam, febres continentes fieri posse à sanguine putrescente, aut à bile, aut à salsa pituita, fortassè quoniam Hippocrates atque adedò Galenus ipse quarto de ratione victus acutorum, ex his humoribus duo causi genera fieri dicunt. Atque putant illi fortassè causum esse continentem febrem. Sed falluntur apertè, nam causus dicente eodem Gal.com. 17. quarti de ratione vict. acut. Est febris quæ habet vrentem calorem & incompescibilem sitim, proinde & biliosa, & quæ ex salsa pituita est febris, causus appellatur: habent tamen ambæ annotationes suis humoribus proportionatas: immo verò. 2. de crisi bus cap. 6. exquisitā febrē ardētem, dicit esse proportionatā tertianæ exquisitæ.

te. Itaq; tertiana cōtinua est exquisitissim^o cau-
sus: alter est, cōtinua pituitosa ex pituita falsa,
Continēs quidē dici etiā potest causus, si illa
accidentia habet: verū quamquā ardentissi-
ma febris est, id est multi & intentissimi calo-
ris, mitiora habet illa accideētia. Sed vt intel-
ligas Galenū, febrē continentē, non nisi ex san-
guine fieri posse putasse, lege cap. 3. noni libri
meth. vbi differens de hac febre inquit, alterū
est vbi in omnibus vasis, ac potissimum maxi-
mis, æquabiliter succi putrescunt. Vides suc-
cos æquabiliter putrescere esse, sanguinē, vt
sanguis de humoribus dicitur, putrescere: in
eodē cap. paulo infra dicit, eas febres fieri in
ijs qui plurimo abundant sanguine, & neque
toto eo libro, neque alibi, quod sciam, alterius
causæ meminit, continentis febris: capite etiā
nono huius libri docebit, ex putrescente san-
guine pendere eam febrem. Accedit quòd
si quæ febris posset esse continens ex bi-
le, ea esset acutior, & malignior continua bi-
liosa, quia fieret ex eadem materia puta bile,
& ex maiori copia, quia ea repletet vasa
omnia magna, vsque aded vt non posset
in illis moueri, tamen Galenus eam con-
tinentem, quæ est generis deurentium, dicit,
esse biliosa continua minus acutam. 2. de
cris. capite 6. nō itaque humor quisquā, potest
facere

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

facere continentem febrem, præter sanguinē: atque hic ipse nonnunquam facit tertianas irritationes, cum scilicet non replet omnia magna vasa, sed in parte aliqua putrescit, vt cum in inflammata aliqua particula putrescit, vt dicitur capite duodecimo, secundi de crisi- bus. Verū cum sanguis ad eū crescit, vt repleat vasa omnia magna, plerunque putrescit, neq; expulsus de parte in partem, neque extra venas, neque motus in ipsis venis, fitque febris continens, quæ his ipsis rationibus, ex nullo alio humore fieri potest, quia nullus alius humor potest solus ad eū redundare, vt faciat plethoram vt dicitur libro de plenitudine à Galeno, & proinde omnis alius cū putrescit, mouetur aut in venis ipsis, aut extravenas, facitque proinde, aut continuam cum annotationibus, aut intermittentem. Accedit dictis motionis causis, quòd nullum alium humorem putrescentem potest natura membrorū ferre, quin moueant, conuantia expellere, præter sanguinem. Est enim hic omnium mitissimus. Itaque fiunt febres continentes, aut ex sanguinis redundantia, aut putredine. Sed propero ad reliqua.

Continuarum autem duæ quidem primæ sunt differentia. Nam alia tertio solum die access-

accessionem habent: alia verò etiam inter-
 medio die alteram inferunt accessionem. Hæ
 igitur nullum proprium ac peculiare nomen
 obtinent. Eas autem quæ tertio quoque die
 accessiones habent, ego quidem nomino ter-
 tianæ naturam referentes. Non tamen prohi-
 beo si quis velit ipsis aliud imponere nomen,
 modo in rebus nihil discrepet. Alia enim est
 natura, quando ad integritatem desinunt: a-
 lia quando in declinationem febrilem finiun-
 tur febres continuæ, tertio quoque die haben-
 tes accessionem. Et ad hæc altera item natu-
 ra est earum quæ intermedio die accessionem
 obtinent. Cæterum nullam ex ijs semitertia-
 nâ appello, non tamen prohibeo ita nominâ-
 re volentes, si id vnum mihi ab illis obserue-
 tur, vt nulla species febris relinquatur, sed vt
 omnes ordine dicantur, quemadmodum ego
 in hoc libro institui. Nam continuarum quæ
 in die medio accessionem habent, quædam in
 quotidiana forma procedunt, duas inuicem
 simillimas accessiones efficientes: quædam ve-
 rò duas dissimiles habentes: primæ quidẽ ter-
 tiam simillimam obtinent: secunda verò
 quar-

DE DIFFEREN.FEBRIVM.

quartam, in forma duarum tertianarum procedentes. Hæ quidem ex bilioso magis, illæ vero quæ singulis diebus similem accessionem obtinent: ex pituitosiori humore consistunt. Est vero tertium aliud genus continuarum febrium rarò eueniens, vbi accessio in formæ quartanæ circuitus procedit, nequaquam ad integritatem desinens. Fit autem, quemadmodum quæ tertio die accessionem habet, interdum est duplex & triplex: ita & hæc non solum duplex sed & triplex. Hi quidem febrium implexus, eius quæ de typus est, sunt contemplationis, proprij.


MIssis iam continentibus febribus, continuas diuidit, quamquam verò earum est triplex genus: triplici intermittentium generi proportionem respondens, & materia & figura, cum sit tertiana continua ex bile, quotidiana continua ex pituita, quartana continua ex melancholia, tamen imprimis duas tantum species esse dicit, biliosam scilicet & pituitosam: deinde his enarratis adijcit tertiam melancholicam, id verò factum est, quia duæ priores continuarum species frequenter accidunt,

tertia

tertia hæc rarò. Potest fieri biliosa quæ omni-
 bus diebus habeat accessiones, siue intermit-
 tens sit siue continua, cum scilicet ea biliosa,
 duplex est tertiana, in hac, verò quanquã om-
 nibus diebus fiût, nõ in omnibus fiût similes,
 vt in quotidiana, sed tertijs diebus sibi respon-
 dentes, vt primæ tertia, secundæ quarta. Po-
 test etiam melancholica, siue intermittens sit,
 siue continua, post duos dies accessions, vni-
 nicum habere, aut intermissionis, aut remis-
 sionis, cum scilicet duplex quartana est: po-
 test etiam nullum diem habere sine accessio-
 ne, facta triplex: sed in illis tunc quoque re-
 spondent sibi febres per quartos dies, primus
 quarto, secundus quinto. Tertianam etiam fe-
 brem dixit Galenus posse fieri triplicẽ, quod
 fortassè videbitur fieri non posse, cum inter
 accessiones tertianas, vnicus dies interiectus
 sit: veruntamen fieri potest, vt in vnico die
 duas tertianas accessiones homo patiatur.
 Quare non solùm iã triplex, sed quadruplex
 etiam tertiana fortè fieri possit. Verũ hæc tra-
 ctationem de typis iam attingunt: an præter
 triplex febrium dictarum genus, sint quinta-
 næ, & sextanæ, & septimanæ, quæque per lon-
 giora interualla moueantur, dicemus in fi-
 nehuius libri, diximusque satis latè in
 quinto libro controuersiarum. Modo illud
 vnum

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

vnum dicimus, illas raro fieri cunque fiunt ex eisdem proutum materijs fieri cum alijs quas Galenus scripsit. Monet nullam dictarum febriũ esse semitertianã : scilicet quæ dictæ sunt differẽtię omnes sunt simplices, semitertiana verò est febris composita, quod parebit paulo infra dũ eius natura declabitur, propterea hic de ea dicemus nihil. Verũ nominiũ vsurpationem nõ curat Galenus illud vnum expe- tit à nobis vt omnes differentię, nulla missa ordine recenseãtur. Quas proinde scripsimus in hoc Schemate.



DE DIFFEREN. FERRIVM.

Compositę fiunt ex harum commixtione de quibus in sequentibus dicetur, & in libello de typis dictum est multo copiosius vbi Galenus, omnes qui ex dictis modo febrium figuris fieri possunt, complexus enumerauit.

CAPVT III.



Ebrum autem simplicium, ex humoribus accensarum, vniuersę differentię, tot numero sunt, quot modo dictę sunt: ex earum autem permixtione alię quędam sunt, de quibus statim dicam: prius quidem de simplicibus quod reliquum est apponens, vt quęcunque exactę simplex febris fuerit, vnā speciem veluti regulam quandam obtineat, eorum quę nunc a nobis modo dicentur: quęcunque verò ab hac degenerauerit aliquatenus, eatenus recedit à simplicibus.

Dixerat paulo antè febrem quamcunque cognosci debere ab artifice, non aliunde quam ex propria forma, proinde modo singularum febrium simplicium perse mentionē facere incipiens, proprias illarum formas describit. Repertur verò propria forma in genere quocunq; , in ea febre quæ in eo genere est exquisita: nam febris notha, quò propriæ formæ febris, minus habet, eo ab exquisita recedit plus. Ergo proinde Galenus in vno quoque dictarū febrium genere, exquisitam describit, vt illa semel cognita, ab ea deflectētem cognoscamus. Est verò (ne illud impresentiarū omittamus) febris exquisita, quæ ex sincero soloq; humore pēdet, tertiana quæ ex bile, quotidiana quæ ex pituita: quartana quæ ex melancholia non exquisita est febris, quæ ex illo humore cum alio permixto, vt tertiana nō exquisita ex bile cū qua putrescit, etiā aliquid pituitæ. Neq; tamē proinde meritò, quisquam dicat, febrē non exquisitā esse cōpositā, quòd ex duobus humoribus fiat, nō em̃ id satis est ad cōpositam, nisi duos motus etiam faciant, vt in semitertiana humor biliosus mouetur per se, & pituitosus etiā: tamen in tertiana spuria vnus fit motus biliosus, ratione vincentis humoris, sed in forma ab exquisito euarians, est nihilominus typus simplex.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Febris autem, que ex flaua bile per sensibilia corpora delata, procreatur, inuadit cum rigore atque æstiosa est, & bilis vomitibus, vel deiectionibus, vel exsudationibus, vel quibusdam horum, vel omnibus simul, soluitur huius febris accessionis longitudo, quæ maxima est, horarum æquinoctialium duodecim existit, atque appellamus eam exquisitam tertianam: in temperamento laborantis bilioso, ac tempore, & regione, & constitutione, & victu calido & sicco, consistentem. Dicta autem sunt, & omnia alia paulo antè, quæ ad eius generationem conferunt. Breuior autem magna ex parte eà quæ dicta est longitudine accessio existit, per quam multam maioris ac minoris obtinens differentiam: vel propter quantitatem & qualitatem ipsius bilis, vel propter agroti vires, vel propter eum qui tunc laboranti inest affectum. Bilis enim copiosior longiorem quàm pauca efficit accessionem, tenuis verò quam crassa breuiorem. Sic verò & facultas, quæ validior est, breuiorem, imbecilior autem, longio

longiorem; & corporis affectus, rarus quidē breuiorem, densus verò longiorem: tempus autem intermissionis in tali febre, omnino obscurum habet signum, putredinis humorum, in pulsu, sequenti die aut nocte post paraxysmum: cum autem leuiter succenditur, obscure habet cognoscibile, primis eius quæ sequitur diei aut noctis partibus, manifestius verò circa fines eiusdem diei ac noctis, adhuc autem clarius circa fines diei aut noctis, quæ præcedit diem aut noctem accessionis. In ea verò ipsa perspicuum est inditium, multoque magis ubi iam inuadit accessio, ac multò magis quando ad vigorem conscendit. in eo autem minus quàm in incremento: & rursus, multò minus in inclinatione. Hanc febrem si volueris nominare exquisitam tertianam, sin minus saltem nobis concede ita nominare, causa clarioris doctrinæ.

TERTIANÆ febris exquisitæ hæc sunt signa. Ne tamen intellige, vt exquisita febris tertiana sit, opus esse vt hæc omnia conueniant, nam neque omnes sunt exquisitè, tales, sed aliæ sunt exquiritores, aliæ minus exquisitæ, & vt exquisita sit vt mox
O 3 diximus,

DE DIFFEREN. FERRIVM.

diximus. Satis est, si ex sola bile fiat, non tamē si sola bilis putrescit, statim sit in æstivo tempore, neque statim egrotus est temperamento bilioso: in hyeme enim potest fieri exquisita tertiana, aut in æstate in homine pituitoso, quāquam significabit tunc maiorem causam, quā si in æstate & bilioso homine esset facta. Hæc ergo omnia quæ in hoc capite recensentur, & alia omnia quæ ad bilis faciunt productionē, ad febris tertianæ exquisitæ generationē conferunt, quæ omnia ad exquisitissimam concurrunt, ad exquisitam tantum, pleraque, aut maximè præcipua. Ex ijs quæ de rigore paulo antè diximus, satis manifesta est causa, cur tertiana inuadit cum rigore. Quod vācuatione aliqua bilis soluatur febris, satis est rationi cōsentaneum. Verū ego in ipso rigore harum febrium, cum exquisitæ sunt, obseruavi frequentius fieri vomitum, aut bilis deiectionem, in fine paroxismi sudorem. Horæ æquinoctiales sunt horologiales, scilicet vulgares horæ, quarum viginti quatuor complent diem naturalem. Dictæ sunt quantum opinor æquinoctiales, quod per æquinoctia sunt hæ ipse horæ naturales. Scilicet illarum quæ liuet per id tempus, est duodecima pars diei artificialis. Harum duodecim est tempus maximum paroxismi febris tertianæ exquisitæ:

possunt

possunt tamen breuiori tempore fieri. Breuissimum finem statuit. 1. de arte curat. ad glau. septem horarum, itaque illarum duratio est à 7. ad 12. horas. Intellige hæc (vt oportet terminos ex arte constitutos) plùs minùsve. Ars em̃ nihil habet summè exactum: non enim statim si per 13. horas durauit, aut multò minus si per solas sex, non est tertiaria exquisita. Sed quoniam hæc omnia manifesta satis sunt, reliqua contemplemur. Vbi nos vertimus, Tempus autem intermissionis in tali febre, in pulsu putredinis humoris inditium omnino habet obscurum, die aut nocte quæ accessione sequitur. Alij vertunt omnino incognoscibile, quibus græca dictio videtur fabere, habet enim $\pi\alpha\upsilon\tau\alpha\prime\pi\alpha\sigma\iota\nu\ \alpha\delta\iota\alpha\gamma\upsilon\omicron\varsigma\omicron\nu$ tamen ego dictione illa $\alpha\delta\iota\alpha\gamma\upsilon\omicron\varsigma\omicron\nu$ non tantum intelligo significari quod incognoscibile est, sed etiam quod difficile cognoscitur, vt nomē $\alpha\delta\iota\nu\alpha\tau\omicron\nu$ non tantū significat quod fieri non potest, sed & quod difficile fit. Nā in pulsu duo inquit Galenus esse signa putredinis, primum celeritatem constrictionis, quā in primo libro propriam & inseparabilē esse dixit putridæ febrī, & inæqualitatē, quā ille multis in locis appellat febrilē, cuius ego superius memini (ea est inæqualitas in eadē dilatione in eadē parte secundū diuersas partes spacij & tēporis quod

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

scilicet principium & finis dilationis, partes sunt celeriores media. Cum itaque duo hæc sint putredinis impulsu inditia. i. de arte curatiua ad glauconem cap. 5. dixit in tertiana (erat illic sermo de exquisita) quiescente homine à febre relinqui in pulsu febrilem inæqualitatem, & in secundo cap. eiusdem libri, negauerat pulsum per intermissione febris, comparare naturales differentias in tertiana: id dixit his verbis. Nam arteriarum motus in hoc (loquebatur de diariarum genere) in totum assimulatur huic, qui in sanis deprehenditur, cum in nulla alia febre ad naturalem habitum reuertatur, neque si multum temporis inter primæ accessions finem, & secundæ principium intercedat, quemadmodum in tertianis atque quartanis. Hæc Gal. qui proculdubio, si modo diceret nullum penitus quod cognosci possit signum putredinis in pulsu relinqui in intermissione tertianæ exquisitæ, contraria protulisset, tamen quantum ego intelligo non id dicit, sed signum putredinis in pulsu remanet sedata febre tertiana in prima parte intermissionis penitus esse obscurum i. difficillime cognosci in secunda. præ aliquā ro manifestius, sed nondum adeo quam in tertiana, in qua quæ iam futura accessioi proxima est. Itaque manet per totam intermissione inditium aliquod putredinis in pulsu, quod eo est obscurus.

rius, quo à futura iterum accessione longius ab
est, de temporibus ipsius paroxismi dictū in
primolibro est, signum putredinis in pulsu ap
parere maximè in augmento, minus in princi
pio, minus etiam in vigore, minimè in inclina
tione: modo illud satis liquet, euidentius esse,
id signū in tēpore paroxismi, in quo minimè
apparet, quā intempore intermissionis, in quo
est euidentissimū, nihilominus in omni tēpo
re, & paroxismi & intermissionis, aliquod pu
tredinis inditiū in pulsu apparere. Vnde satis
liquet reuera nūquam soluifebrem aliquam
quantūuis intermittens sit, vsq; dū cessat totus
morbus, quare cōstat etiam aliquid in venis
ægotantium computrescere semper, etsi paro
xismi à bile effusa extra vasa fiant, nō est ergo
quod amplius certent medici, de modo quo
in tertiana exquisita septem paroxismi vnicus
est morbus, ac non potius septem, neque est q
imaginentur vnitatem illam causæ antecede
tis, quā inuenerunt barbari auctores, quā & fe
bribus intermittentibus & morbis habētibus
recidiuā accōmodant, illam vnitatē sufficere
putantes, quo etsi in essentia vnicus morbus
nō sit, tū quod ad cōsiderationē medicā atti
net, & cōputationem dierū creticorū, vnicus
sit. Nā vt diximus, febres omnes re vera conti
nuę sunt, aut cum paroxismis, aut cum anno

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

rationibus, aut sine vtrisque. Veniunt tamen quæ cum paroxysmis fiunt, quia extra vasa sua maxima parte expurgantur venæ, ad tantam remissionem, aut etiam dicatur à nobis intermissio, cum nimis diligens sermo est interpestius. Cæterum ut prouabiliter, & verè, ac citra sophismata dicatur, vnica ratio est vnici morbi, cum vnicus in sua essentia est, continuusque secundum totum tempus. Sed de hac re satis disputatum est in libro. 10. Cōtrouersiarum medicarum. Qui eorum quæ modo dicuntur optat confirmationem, legat caput de computatione dierum creticorum in recidiuis.

CAPVT. IIII.



EST Verò altera exquisita simplex febris ex pituita putrida, per sentiētia corpora à natura pulsa, consistens. Incipit quidem à refrigeratione partium extremarum, ac horrore ma-

gis quàm rigore, difficulter autem accenditur, longumque obtinet incrementum, donec ad vigorem peruenit. Quoniam humor ex quo consistit, temperamento frigidus & humidus est: & consistentia lentus. Quapropter difficulter accenditur, ac tarde meat, & sæpenumero in meatibus hæret, ac premit quidem interdum grauatque facultatem, inæquales autem ac magis debiles paruosque efficit pulsus, in inuasionibus, & primis incrementis. Fiunt utique & in biliosa febre, in accessionum inuasionibus singula iam dicta circa pulsum symptomata. Sed in illa statim sedantur, tum alia, tum etiam inæqualitas, quæ magna ex parte, neque cum his febribus simul inuadit. Calor vero non multo postquam cesserit rigor, accenditur splendens, quemadmodum ignis quidam exquisite purus, in quo nulla fumosa caligo inuehitur. Calorem autem pituitosi humoris assimilaueris igni fumoso, viridium lignorum accensorum. Vacuationes igitur in eo pauca, & longitudo accessionis diuturnior sit, tempusque intermissionis, haud similiter ac in prima febre purum, sed semper
 putres

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

putredinis humoris, tum in calore, tum in pulsu, inditium seruat. Manifestissimū verò in hac febre circa inuasionem & incrementa accessionum, putredinis inditium est. Attamen & hac vbi exquisita fuerit, multis puram intermissionem habere videtur, & nos ipsi ita quoq; non raro dicimus, vbi nimium exquisitus sermo intempestiuus videtur. Accidit verò naturæ corporis, tempori regioni, constitutioni, studio, victui, & omnibus alijs pituitosis singulis verò diebus accessiones habet, et si minus calida sit, quam biliosa tertiana: sed consentaneum est hanc quidem quum humorem habeat accensu facilem, & promptè semper ob tenuitatem, quidquid eius seu effectum est, per accessionem expurgatur vniuersum, ad integritatem quandam puriorem desinere, & exiguum post accessionem semen putridi caloris in his relinquere: Eam verò quæ ex pituita consistit, nec integre purgari in accessionem inclinationibus, nec exiguum quod veluti succendatur, relinquere. Hinc igitur ei intermissio multo deterior, & secundæ accessionis inuasio maturior.

OMnia quę in hoc cap. dicuntur sunt aperta satis, illud vnũ perpẽdendũ est, quod inquit, inæquales ac magis debiles, paruosq; efficit pulsus in inuasionibus, & primis incremētis. Nam Gal. ipse li. de typis ca. 3. ait quotidianũ typũ sequitur pulsus magnus rarus & laxus. Quod nos in tertio lib. Contr. de pulsibus inuasionũ dici intelligimus, idq; respectu aliarũ febriũ: scilicet in principio quartanę & tertianę, minores sunt pulsus, quã in principijs quotidianę. qua ergo ratione modo dicit, quotidianę esse signũ, pulsus paruũ in inuasionibus, an propterea addidit, & incremētis? scilicet in principijs tertianarũ minores pulsus sunt, quã & rigor maior, sed nõ durat paruitas pulsus per incremētũ, atq; in hũc sensum addita sunt sequẽtia illa capitis verba, fiũt vtiq; in biliosa febre accessionũ inuasionibus singula iã dicta, circa pulsus symptomata, sed in illa statim sedãtur. Quod inæquales sint pulsus ex pituita putrescẽte, multo magis quã ex alio quopiam humore, merito fit. Nã inæqualitatẽ illam quã febrilẽ diximus, hęc gratia multi fumi putridi, qui ex ea eleuatur vt ex viridibus lignis habebit maiorẽ, aliã etiã, secũdũ diuersas arterię partes emollitis alijs partibus à pituita plus, alijs min⁹: insup collectiuã, grauata facultate: qua ratione etiã faciet pulsus debiles, sed
melius

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

fuerit, arbitror, quando signa omnia alia aper-
tissimè dixit Gal. & solū hoc quod ex pulsu su-
mitur, obscurius aliquanto, vt nos ex alijs lo-
cis in hunc breuissimè trasferamus. In febriū
accessionibus (ita voco paroxysmorum princi-
pia) minimus pulsus est quartanę: Minimè par-
uus quotidianę, mediocriter paruus tertianę:
sunt tamen parui omnibus. Hoc docetur à
Galeno libello de typis cuius libelli commen-
taria fortasse huic libro adiungemus. Verum
addamus modo vltiora. Paruitas illa pulsus
in tertiana nihil occupat incrementi, sed sta-
tim commutatur cum magnitudine: in tertia-
na attingit bonam augmenti partem: in quar-
ana neque tam cito increfcit quā in tertiana,
neque tam sero quā in quotidiana. Verum
succensis iam multum febribus, in magni-
tudine celeritate & crebritate ita habent: pul-
sus tertianarum reliquos omnes tribus diffe-
rentijs vincunt: reliqui in celeritate sunt equa-
les: in raritate pulsus quotidianarum sunt me-
dium tenentes: quartanarum, minimè crebri.
docet hæc Gale. i. de arte cur. ad Gal. capit. 7.
Quod ad signa putredinis in pulsu attinet, inę-
qualitatem inquam febrilem, & constrictio-
nis celeritatem, maxima sunt in quotidiana,
minima in tertiana, mediocria in quartana, id
que per omnia tempora particularia paro-
xismo.

CAPVT. V.



*E*rtium Verò inter-
mittentium febrium
genus exquisita quar-
tana existit, quando
ex solo melancholi-
co humore genera-
tur, qui temperamen-

to frigidus & siccus est, Paulatim quidē suc-
cenditur, quemadmodum lapis quidam, vel
testa, vel os, vel aliud quodpiam sic frigidū,
& siccum corpus, vbi verò quedam ex eo flā-
ma accensa fuerit nihil fumosum, nec semi-
ustum in accensione relinquit: atque idcirco
plures in hoc humore, quā pituitoso, sunt va-
cuationes, ac intermissio exquisitè pura vide-
tur esse, eo quòd hic, omne id humoris melan-
cholici quod est accensum, vacuatur, atque
discutitur. Eam verò ob rem accidit illis rigor
qualis maxime his qui vehementi frigore sunt
refrige

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

refrigeranti, non qualis interdum fit à sole perustis, aut lafis, aut ex medicamentis calidis & mordacibus, vlceri adhibitis. Neneceffe autem est hanc febrem antecessisse, quæcumque atram bilem coacervant in vitæ studijs, victu, constitutione aeris, tempore & regione: præterea naturam & ætatem esse melan cholicam. Huius autem febris accessio longitudine temporis tertianæ similis est, nonnumquam etiam longior, etiam si adhuc exquisita manet, vt quæ ex frigidiori humore consistit. Causa verò similis est in huiusmodi febribus, & alijs omnibus, quæ differentiam longitudinis accessionum efficit, quemadmodum paulo ante in exquisitis dictum est, tertianis, in multitudine & qualitate humoris, robore & imbecillitate facultatis, ad hæc in ipso ægotantium affectu differentiâ obtinens.

Splendidior ignis fit ex substantia crassa frigida & sicca, quàm ex crassa frigida & humida: non tamen tam splendens, quàm ex tenui & calida & sicca. Proinde per febrem quartanam maiora putredinis signa sunt quàm
in

in tertiana, sed minora quàm in quotidiana. Intermisio etiam, etsi non tam pura quàm in tertiana, purior quàm in quotidiana est. Nam cinis qui ex melancholia restat, neque fuliginosus neque semiustus est. Tarditatem sequentis paroxysmi paucitas melancholici humoris, & hoc ipsum quod de puritate intermissionis dicimus, facit. Longitudo verò paroxysmi in quartana & tertiana æqualis est, quia ratione paucitatis humoris deberet esse in quartana minor, ratione crassitiei maior, ambobus coëuntibus fit æqualis. Quamquam sæpe longior est in quartana gratia frigiditatis, quæ dictis causis accedit, idque accidit, etsi quartana sit exquisita id est ex sola melancholia. Quòd rigor quartanæ sit quasi ex refrigida factus, tertianæ quasi ex calida, dictum paulo ante est in primo capite huius secundi sermonis quæ natura gratia suæ temperaturæ sit melancholica dictum est in septimo capit. primi libri quia est modice calida & valde sicca est ætas consistens melancholica nimirum calor iuuenilis iam deferbet, & siccitas augetur: senectus verò quamquam sicior est, tamen quia est frigida esse pituitosa, vt hinc rursus constet verissimum est, quod diximus illo in loco de melancholica natura.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Nam & alia omnia proportionē respondent ijs quæ ex humore bilioso consistunt quo circa si neque putrescat, neque vehementer per sentientia corpora feratur melancholicus humor, nequaquam quatrduanum exquisitū circuitum efficiet. Et quidem ictericus malis proportionē quadam ex liene imbecillitates diuturnæ melancholicæ, & totius corporis fæditatem coloris afferentes, fiunt. Præterea herpetibus, ac erisypelatibus, quæ ex flava bile consistunt, cancri & phagedænæ proportionē respondent. Sed neque in his neque melancholicis malis, necessario febricitant, nisi prius melancholicus humor putrescat. Natura enim semper suis viribus utens nititur, partibus ijs quæ aluntur assimilare, quidquid fieri utile potest, excernere autem, id quod minime tale est, quod si interdum ob crassitiem aut copiam, aut lentorem excrementi, aut quandam viarum stipationem, aut propter suam imbecillitatem, totum quod depravatū est, excernere nequeat, necesse est, ut si diutius in animalis corpore immoretur, corrumpatur. Nullus enim alius humor, qualis

ab

ab initio extitit, permanere potest, nedum qui adeo vitiosus est, ut à natura cultum amplius suscipere non possit, sed aut concoctus assimilatur atque apponitur solidis animalis partibus, aut corrumpitur & putrescit. Sic enim ictericis ac melancholicis, ubi biliosi humores, redundantes in corpore, plurimo tempore manserint, febres superueniunt. Sape etiam affectus iecoris aut lienis febrem attulit, quando vel phlegmone, vel obstructio prædicta pathemata efficit. Pari ratione, nec ubi pituitosus humor redundat, febris sequitur, nisi prius putrescat.

QUod in primis verbis huius secundi libri pollicitus est, Galenus præstat modo, docet enim, quam aliam causam necesse sit concurrere cum humore quo febris fiat (non enim sufficere ut redundet, monstratum in principio libri huius est) addit ergo modo, opus esse ut putrescat, idque monstrat multorum affectuum exemplo, in quibus redundat aliquis humor, plus etiam quam in aliis qui febricitant, cum

P 2

tamen

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

tamen illi sine febre sint, quibus superueniente putredine febris quoque statim superuenit. Nimirum qui ictero laborant, multa abundant bile in toto corporis habitu, qui tamen sine febre sæpe sunt: cum scilicet is affectus sit ex obstructione aliqua, aut causa alia quavis sine putredine, sæpe verò febre afficiuntur, cum ex inflammatione epatis sit morbus ille, aut causa alia quacunque putrefaciente. Qui erysipelate etiam aut herpate laborant, bilis redundantiam habent in parte affecta. Ex melancholia etiam fiunt mala alia proportionem respondentia dictis. Nimirum morbo regio auriginoso, proportionem respondet morbus regionis niger, qui ex debilitate lienis, aut obstructione fieri solet: erysipelati cancer: herpeti phagedena, Sed in nullis horum affectuum febricitant homines, nisi prius humores putrescant. Neque est quod suspicionem tibi pariat, quod Galen. dicit, posse cancerum & phagedenam sine febre fieri. Nam cancer, dicitur eodem libr. de tumoribus præter naturam capit. 5. fit ex atra bile non feruescente, sed acris, & acida, qua qualitate etiam sine ferbore potest exsionem membri, quæ vere phagedena est, facere. Ex alijs affectibus intelligas facile, atram bilem sine febre posse, corruptionem multam parere. Didicisti enim ex eodem Gal.

Gal. ferina deliramēta ab atrabile fieri, & plerunque sine febre consistere, cum tamen atrabilis cerebrū afficiat, membrū adeo princeps & cū quo cor tam prōpte compatitur. Itaque colligit Gal. opus esse, quo ex humore aliquo (intellige extra sanguinem. Nam hunc solo calore & copia febrem facere, ex eiusdē Gale. sententia, paulo antē diximus) febris fiat, ut putrescat. sed est, quod nos moneamus hīc rursus, quod in primo libro etiam monuimus, & in .5. libro Controuersiarum confirmauimus, nomine putrefactionis intelligi debere & vstionem. Vstio enim saltem flauæ bilis, sine putrefactione aliqua potest febrē parere. Quid intersit inter vstionem & putrefactionem in commentarijs quarti libri meteororum Aristotelis diximus. Modo illud vnum dicimus, vstionem & putrefactionem, potissimum in substantijs humidis, similes esse passionēs, & similia afferre symptoma, proinde ambo sub vno nomine putredinis à medicis hac in parte dici, non aliter ac medicamenta vrentia appellantur, plerumque putrefacientia, quod Galen. ipse notat. 5. de simpli. medicament. facul. cap. 14. sed quoniam hoc dicto in libro Controuersiarum confirmatum satis est, prætereo modo.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

In hoc autem, id quod antiquis existimatum est impossibile esse, saepe numero visum est. Est autem id sine febre rigor, qui nonnullis quidem semel accidit, nonnullis verò per circuitum pluribus diebus, vel continuus ab initio vsque ad finem, vel omnino ita mediocris, vt nequaquam esse videatur quādo quieuerint, sed solū vbi moueri cœperint, sentiantur: aut etiam maior, vt etiam sine motu infestet. Verum quando talis humor spatio temporis putruerit, non rigore solum corripuntur, sed etiam febricitant, & diuturna admodum, & solutu difficilis febris, tales sequitur causas, in quotidiana forma procedens.

MUltis in locis Gal. dicit hippocratem & reliquos antiquos nunquam vidisse rigorem sine febre, neque omnino in illorū temporibus cōtigisse causa frugalitatis & parsimoniae hominum, cæterum res semper visa mihi est suspecta. Nam quantum conijcio, falsum est hoc malū ab Hippocratis tempore affuisse, cōiecturæ causas reddidi in quinto libro Controuerſiarum, & in cōmenrariolo de inæquali intemperie, modo taceo, & quia dictæ
illic

illic sunt, & quia ad præsentem doctrinam nihil refert, viderit ne talem rigorem Hippocrates an non. causa certe illius est, delatio crudorum succorum per membra sentientia, qui non putrescunt. Duplex enim est causa qua fieri potest, vt qui riget non ardeat deinde, aut & tam extreme debile iam est calidum innatū, vt non possit prodire ad membra (hi casus accidere solent in febribus cum ægrotus iam est prope mortem, quos rigores vocat Hippocrates. 2. prorrhetic. non recalescentes) aut omnino citra febrem, quia humor crudus motus per membra non putrescit. Hunc rigorem negat Galenus vidisse Hippocratē, & de hoc est præsens sermo.

CAPVT. VI.



H hoc genere est etiam epyalos propriè nominata febris, quando simul febri citant ac rigent, & virūque eodem tempore in quavis parte sentiunt. Archigenes sane existimat de nulla alia nomen epyalon efferri, quā de vna hac febre: videntur

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

autem attici quidam viri, rigorem ante febrē ita nominare. praxagoras verò videtur mihi Vitreum appellare talem humorem: iuniores autem ē quibus Philippus est, crudum simpliciter, nullum ad exquisitam distinctionem nomen adiicientes. Est verò & ipse pituitosi humoris species, vt qui admodū frigidus & lentus existat. Quisquis enim humidus simul & frigidus fuerit humor, sub pituitæ appellationem reducitur, si quis hippocraticē, & consueto omnibus, non solum veteribus, sed & alijs græcis, more, nominare velit. Prodicus enim in libro de natura humana, inique & contra leges agit circa hoc vocabulum, ab admiranda etymologia persuasus. Sed non est presentis temporis ad huiusmodi sermonē deflectere, quum aliam ipsis tractationem dicauerimus.

EX eadem materia fit febris hepyala, & symptoma de quo paulo ante est dictum rigor inquā sine febre, puta ex crudis succis. Nominis huius hepyalos, duas etymologias inuenies apud paulum libr. 2. cap. 26. dicitur enim inquit, aut ab ἡπείρω idest tranquilum

lum & αλς, ἀλός. i. mare quòd similis sit tranquillo mari, incipienti estuare: aut dicitur ab ἡπίως ἀλεαίνειν, id est calefacere, quia tranquille calefaciat, gratia videlicet admistæ refrigerationis. Sed deriuetur nomen vnde lubet, nobis enim in rebus ipsis elaborandū est. Inter antiquos medicos quidam attici nomē hoc dixerunt, non de ea solum febre in qua ægrotus simul riget & febricitat, sed etiam de rigore qui præcedit febrem. Verū Galenus hūc nō appellat epyalon, sed solam illam quā modo dixi febrem, in qua (inquit) simul febricitant, & rigent, vt vtrumque eodem tempore in quauis corporis parte sentiant. Quibus verbis manifestè videtur significari (quod plerique intelligunt) easdem exactè corporis particulas ambo sentire. Tamen Galenus ipse aliter sentit, scilicet frigus & calorem secundum diuersas corporis particulas sentiri, sed eas tā minimas, vt sint insensibiles, & proinde omnes sensibiles partes videri sentire ambo. Quod luce clariùs explicat Galenus ipse libro de in æquali intemperie cap decimo, his verbis. In febribus autem hepyalis, tū intus & secundū paruas, & propter hoc totum corpus videtur ambo sentire, quippè minimis portionibus aspersum est tum calidum, tum frigidum, neque est aliquam eius partem accipere in qua non

P 5 alter-

DE DIFFEREN. FERRIVM.

alterutrum sit. Sed cum hunc locum enarraremus in commentariolo, quod in illum libellum scripsimus, diximus omnino fieri non posse, ut duæ hæ qualitates, calor inquam & frigus, ab eadem corporis particula sentiantur, & fusius confirmauimus in primo libro controuerfiarū. Nam quod Leonhartus fuchsius in hoc loco inquit, nihil esse incommodi fieri in eadem parte calorem & frigus in remissis gradibus, in primo cap. illius cōmentarioli satis refutauimus, monstrantes multo aliud esse (hoc oportuit fuchsiū intelligere) contrarias qualitates esse in eadem parte simul, aut fieri in eadem parte simul. Nam esse quidem possunt remissis gradibus, sed fieri simul nullo modo possunt. Iam verò illud quod alij afferunt, scilicet in lypiria sentiri simul frigus & calorem, non per ipsas qualitates sed per earū species quæ contrariæ non sunt etsi probabilius est, tamen ne hoc quidem est verum. Nā primum omnium monstratum est in secundo cōtrouerfiarum libro, nullas esse tales species, sed si aliqua tales sunt (ne modo demonstrationes repetamus) illæ ipsæ ut sunt representatiuæ qualitatū, ita sunt earundem generatiuæ. Nam experimento sentimus, nos semper cum calorem sentimus, calefieri, cum frigus, refrigerari. Neque aliqua alia ratione senti-

mus

mus nos calefieri, quàm quòd sentimus calorem. Ergo quum primum illæ species incipiet referre calorem generabunt, & quum primū neruus incipiet sentire calorem, incipiet calefieri, quare, neque per fictitias has species, possunt effugere, contrarios motus. Superest ergo illa vnius capitis huius interpretatio, vtrunque, calorem nempe & frigus, eodem tempore in quauis corporis parte (intellige sensibili) sentire. Errauit ergo manifestè Auicena qui fen. prima quarti ita scripsit de febre epyalā. Febris hæc fit ex flegmate vitreo, sicut est comprehensum, in occulto & profundo, quod inrefrigidatur vbi est: verum ipsi accidit iam putredo, quare spargitur ex eo, vapore eius quod cum putruit, & dissipatur, inflammatur in exterioribus, & illud quod non est putrefactum, refrigeratur in interioribus. Nam his verbis Auicena docet epyalam esse lypiriæ contrariam, in qua exteriora calent & interiora frigent. Tamen Galenus nullius talis febris meminit, neque verisimile est, quod de illius causa assert. Nam vitrea pituita, porius putrescet in interioribus quàm in exterioribus, quia interius est copiosior calor. Nūquam ergo ex putredine fiet id sympto. puta interiorū frigus cū externorū calore.

Succū

DE DIFFERENTIA FEBRIVM.

Succum quem praxagoras appellabat vitreū, Philippus appellabat, simpliciter crudum succum. Tamen constat hunc non esse eum qui à Galeno succus crudus appellatur. Nam hunc describēs lib. 4. de tuenda val. cap. 4. (inquit) esse album & crassum, & frigidum, & humidumque diuersum à vitrea pituita, quia non est vt illa lentus. Hæc eadem inuenies. i. de alimen. fac. cap. 2. sub hoc genere succorum crudorum comprehenduntur succi quidem coctionē effugientes, qui vere pituita non sunt, cuiusmodi cōtentū in vrina sanorum, & quicumque succi in crudis tuberculis solent conspici, qui tamen omnes possunt ad pituitæ genus reduci, quia frigidi sunt & albi. Quamquam prodicus quidam nomen pituitæ ad bilem transtulit, deceptus etymologia, quia græce φλέγμα idē est quod vltio, aut ardor, ἀπὸ τοῦ φλέγειν reprehendit hunc prodicum Galenus libro octauo de placitis, & secundo de nat. fac. quasi male vtentem nomine pituitæ. Irridet verò hic etymologią. Nō quod illa non sit vera nominis deriuatio. (nō enim aliunde deriuati potest) sed quòd etymologia deceptus est prodicus, quam tamen non oportuit curare, sed rem ipsam cognoscere, cui id nomen à medicis datur, siue nomen illi congrueret, siue non. Nam quantum ego opinor

nor

nor, ex falsa aliqua opinione nomen illud profectum est. Fortassis qui primum omnium nomen id inuenere, putarunt (quod & Plato sētit in dialogo de natura) illum humorem exustione & colliuatione fieri, posteri verò quamquam rem aliter habere intellexerunt, nomen (vt pote nomina nihil curantes) non inutarunt. Nam quod ab alijs dicitur φλέγμα dici à φλεγμαίνω id est tumeo, quia tumidus & flatuosus humor est, ego probarē, si id gramaticæ lex ferret, tamen non fert. Nā constat nomē hoc φλέγμα ex parachimeni passiui prima persona formari. Verte ergo contra, μαῖν με. & fiet φλεγμε addito augmento πεφλεγμε quod venit à verbo φλεγω. Nam à φλεγμαίνω fiet φλεγμημα, non φλεγμα. Sed in præscripta dictione nihil iam est obscurum.

Rursus igitur ad institutum veniamus. Quisquis in corpore humor, frigidus & humidus fuerit, hunc nos appellamus pituitam. Tu verò si libet scindapsum nominato. Adeò sanè nulla mihi vocabulorum cura est, At scias huius humoris plures esse differentias. Nam vna quidem eius species admodū frigida est,
adeò

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

adeò vt maximos dolores, vbi in loco calido
 impaëta fuerit, excitet. Et sæpe numero mul-
 tos dolores eorum qui colici vocantur, hoc hu-
 more acri clysteri vacuato, statim sedatos vi-
 dere licet. Hic autem humor vitro fusso aspe-
 ctu similis apparet. Altera verò pituita spe-
 cies, quam excreantes sæpe quidem expuunt,
 sensilem obtinet dulcedinem: atque liquet eã
 exquisitè frigidam esse non posse, si eorum
 quæ in libris de simplicium medicamentorum
 facultate demonstrauimus recordamur. Est
 præterea tertia pituita species, quæ expuen-
 tibus acida esse videtur, ac minus quàm vi-
 trea, magis vero quàm dulcis frigida: quemad-
 modum altera salsa est, aut propter putredi-
 nem, aut propter salsa serosa humiditatis per-
 mixtionem. ex qua sanè febricitantes non ri-
 gent, sed duntaxat horrent: inuadente acces-
 sione. Accida verò & vitrea si moueatur,
 per sentientia corpora permeans, rigorem
 sine febre infert. Quod si mediocris aliqua i-
 psis putredo affuerit, epyalam effecit febrem:
 sin plus putrescat, rigor quidem præcedit, fe-
 bris verò sequitur, frigore à multitudine ca-
 loris

loris deuictō, ita vt nullo modo per incrementa & vigores accessionum, appareant. At vitrea pituita, forsitan etiam acidæ qualitatis particeps est, ita vt omnes eius differentiæ tres existant, acidæ, dulcis, & salsa. ex pituita vero dulci putrescente, rigor febrem minimè antecedit.

Pituitæ nomen in latiori acceptione de omni frigido & humido succo dicitur: cæterū cum nomen strictius accipitur, multi humores qui alioqui frigidi & humidi sunt, à ratione pituitæ excluduntur, & dicuntur proprijs nominibus, cuiusmodi succus crudus est, quē paulo antè descripsimus, & mucus quem 2. de fac. nat. cap. vltimo negat Galenus pituitā esse. Modo nō recēset species oēs pituitę, vt nomē patet latissimè, sed vt dicitur tantū, de ijs succis frigidis & humidis, qui in officinis coctionū generātur, & per venas deferri solēt ex horum liquidē putredine solēt febres principiū ducere. Quāquā neq; in hac strictiori significatione, putet aliquis dictas esse ab eo oēs species. Nā hic dicit pituitæ esse quatuor species, vitreā, acidā, salā, & dulcē. lib. primo de aliment. fac. cap. 1. dicit illius esse species quatuor
acidam

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

accidam, salſam, & dulcem, & inſipidā. Quo
in loco non meminit vitreæ, vt neque hic inſi-
pidæ. Aut ergo illic deest vitrea, & hic ſaporis
expers, aut alterutra redundat. Accedit quòd
Auicena aliarum pituitæ ſpecierum mentio-
nē facit ſen. prima primi, giſſæ ſcilicet, aquæ
mucilaginofæ, & aliarum. Conſiderandum in
primis eſt, quorſum Galenus hic de humoris
huius ſpeciebus meminit, & quorſum in ope-
re de facult. nat. Nam ipſum Gal. inſtitutum
deteget pulchrum artificium. Certè nec hic
neque ille erat locus agendi de humoribus,
ſed illic gratia alimentorum, quia pro na-
tura ciborum hi aut illi ſucci ex ijs proueniūt,
hic propter febres, quia illarum ſpecies ex dif-
ferentia humorum ſumuntur. Verùm ad alias
febres ſuffecit prima humorum genera dice-
re, bilem videlicet, & melancholiam, quin il-
lorum ſpecies diſtinguerentur, ſed ad pituito-
ſas, non ſatis eſt pituitam finire, ſed eius inſu-
per ſpecies: quia multo magis variantur pitui-
toſæ mutata pituitæ ſpecie, quam bilioſæ, aut
melancholicæ, ex mutatione ſpeciei ſui humo-
ris. Itaque refert modo Galenus ſpecies pitui-
tæ, ex quarum putredine febres fiunt. Proinde
quæ ſunt præter naturam tantum dixit, natu-
ralem quæ inſipida eſt, omiſit: nam ex hac,
niſi in aliam prius tranſeat, non fient febres.

Tamen

tamen in tractatione de alimentis omnium oportuit specierum meminisse: omnes enim ex cibis sunt. Vitream non est putandum, illic esse omissam: nam vt Galenus ipse hoc in loco ait, forsitam vitrea pituita acidi saporis particeps est. Quare sub acida intelligi potest. Iam verò quod ad Auicenam attinet, scire licet illum præter methodum pituitam in species distribuere, connumerantem simul eas quæ ex sapore, & eas quæ ex modo substantiæ sumuntur, & præterea referentē multas differentias fictitias, & quæ nuli sunt. Gal. contra seorsū diuidit pituitam per modum substantiæ, & colligit tūc temporis tres species, quia aut tenuis est, aut crassa, aut mediocris: seorsum etiā diuidit per sapores. Ambo hæc facit lib. 2. de fac. nat. hic per sapores solum diuidit. Nam vitreā etiam quæ differentia ex modo substantiæ videbatur esse, reducit ad acidā. Iam verò gippea (vt Auicena inquit) pituita nihil minus quàm pituita est. Nam neque humor est omnino, sed crassa quædam & sicca substantia, ex humidioris pituitæ assatione facta. Dulcis pituita fit aut ex naturali pituita magis elaborata, vicinaque iam sanguinis naturæ, aut admistione sanguinis. Quare hæc species quamquam in pituitæ genere non est exquisita, utilis tamen est, & animanti sæpe cōmoda. Quare di-

Q. Etum

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Quod est lib. 2. de fac. natu. pituitę qđ dulce est id
 salutare esse animati & naturale. Salsa pituita
 fit ex putrefactiōe, vltis scilicet, & quasi in ci-
 nerē redactis quibusdā partib⁹, & cū reliquis
 humidis cōmixtis, aut sero saluo, cuiusmodi sē-
 per fere mtingitur & exsudatur, admisto pitui-
 ta. Acida fit omnimoda in coctiōe, nō ei⁹ co-
 ctiōis quę agitur in ventriculo (nā ita neq; hu-
 mor esset) sed eiusquę in hepate & venis. Ex
 dictis satis liquet, pituitam dulcem non posse
 esse exactē frigidā, sed participem partium ca-
 lidarum, & multo minus salis: acidam ve-
 rō valde frigidam esse. Quare probabilis cō-
 iectura Galeni est, vitream esse acidam ali-
 quantulum. Sed horum causa pręter dicta est
 euidens cū sapores hi, dulcis, salus, nitrosus,
 amarus, & acer, calidi sint, id est causa calidi
 facti, hi frigidi, acidus, austerus, & acerbus.
 Sed horum monstratio (non enim reperenda
 est modo) est apud Gal. 4. de simp. med. fac.
 & in nono libro nostrarum controuersiarum,
 illinc petat cui non satis est hic ex Galeni opi-
 nione accipere. Ceterū quandoquidem di-
 ctum est dulcem pituitę speciem, fieri admi-
 stione sanguinis; salis admistione salis feri,
 dicet aliquis, quid prohibet, & amarā fieri
 bilis admistione? ut alia iam pituitę species
 sit? respondendum, si multa bilis sit, minimē
 pituitę speciem, sed bilem vocatum iri humo-

rem: sin pauca, admistione amaræ substantiæ cum insipida, factum iri salsam. Nam amarū fit ex intensiōe salis; & salū ex amari remissioe. Neq; verò p̄inde putādū est, Galenū hic generationis saltæ pituitæ causam aliquam omisisse. Nam salsum & amarum intensiōe differunt, proinde qui ex admistione saltæ substantiæ cum pituita, fieri salsam dixerat, ex admistione amaræ (modo minor portio esset) fieri, dictum putauit. Meritò ergo iuxta dicta de horum humorum naturis, ex acida pituita fit rigor, ex duli non fit: sed aut sensus tantum frigoris, aut paruus horror, quia illa est frigidissima, hæc minus frigida quā quæ est naturalis, & præterea sine mordacitate: salsam verò horrore: q̄ symptoma medium est inter illa, quia mordacitatē maiore habet quā dulcis, & non est frigida vt acida. Verū delata pituita acida per mēbra sētiētia, triplex est exitus, aut quiescit deinde manens sine purre dine, & fit iolus rigor sine febre, aut putrescit sed leuiter & inæqualiter secundum particulas diuersas, & fit febris æpyala, quia particula putrefactæ calefaciunt membra, non putrefactæ refrigerant. Vt hinc etiam constet, eam inæqualem intemperiem, quæ in febre æpyala fit, secundum diuersas particulas febricitantis corporis fieri, cum à diuersis particulis eiusdem

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

humoris fiat, quascōstat diuersis mēbrorū partibus occurrere. Alia causa generationis hepialæ, præter eā quæ hoc in loco dicitur, dicta est à Galeno libello ab inequali intēperie, huic omnino similis, scilicet fit ex humore vitreo, cui bilis putrescentis portio admixta est. Duplex itaque est iam epyalæ generatio, ex pituita vitrea leuiter inæqualiterque putrescente, aut ex eadem pituita cum admixta bile.

Forfitā Verò neq; simpliciter neque à simplici causa quis, huiusmodi febres fieri existimaret. Si quidē quidquid pituita putrescit, febre accedit: reliquū Verò quod nondū putrescit, à quo rigēt, nō eiusdem, cū ea qua putrescit, est & qualitatis. Si igitur ab hac quidē rigor, à putrefacta Verò febris efficitur, duplex sēper causa erit. Licet Verò & hic dicere febrē ab altaro causa genere fieri, rigore autem ab alio, vt qui non sit quod febris. In tertianis tñ febribus flaua bilis & rigore & febrē efficit. Sed hæc logicā magis habet dubitationē. Iā Verò tēpus est ad institutum vt redeamus.

Fortassis (inquit Galenus) dicet aliquis, in febribus pituitolis, rigorem & febrem nō fie-

ri ab eadem causa, sed aduersis, rigorem scilicet à pituita, nō putrida, febrem verò à putrida: in biliosis febribus ex eadem causa, puta bile ambo fieri, dicetque pituitam putrefactione mutare naturam, verum ita aut aliter dicere ad medicum nihil attinet: quæstio logica magis est. Quas dicat quæstiones logicas explicat idem Galenus 3. de locis affectis cap. 1. ita dicens: quæcūque enim quæstiones ysum transcendunt, qualis sit rerum natura secundum propriam essentiam indagantes, haud dubie logicae esse censentur: Sed in hac quæstione illud idem innuit quod lib. 7. aphor. com. 42. dicens: nisi quis existimauerit pituita putrefactionem in humorem biliosum conuer- ti, itaque sæpe innuit Gal. probabiliter dici posse, pituitam putredine in aliā humoris speciem degenerare, sed quando hoc ad medicinā nihil facit, satius fuerit hac quæstione missa putridam pituitam, speciem pituitæ præter naturam esse existimare, atque ita in sequentibus loqui, vt hætenus.

CAPVT VII.



*V*trescente pituita, ex qua febrem quæ singulis diebus accessionē obtinet, consistere dicebamus, cum bilioso humore permixta, tertianā

*Q*uæ efficien-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

efficiente, composita est duplex tum causa, tum affectus fient. Alter enim humor quotidie accessiōem affert, alter verò tertio quoque die ita ut alter quidem dies duas habeat accessiōes, alter verò, : vnā quasi vicūq; accessiōnū tēpora in easdē horas nō incidunt. Si enim incidant, vna erit cōfusa, neque tertiana neque quotidiana exquisitam formam seruās. Quoniā verò vtriusque febris duplex est species, quatuor implexus erunt. Vnus quidem in quo tertiana permiscetur quotidiana : alter verò in quo tertiana quotidiana continua complicatur : tertius in quo quotidiana intermittens tertiana continua : quartus in quo continua quotidiana tertiana continua permiscetur. Ceterū vnius cuiuscunque dictorum implexuum, duplex est differentia. Nam aliquando omnes simul eadem hora accessiōes inpadunt, nonnunquam autem diuersis temporibus. Sed hæc quidem cognitu faciles, præterquam quòd intermittens ignoratur à parum exercitatis, utpote agrotante nunquā perueniente. At formam accessiōis considerare oportet, quemadmodum secundo de indicijis plenius dictum est, & inde non ex cir-

cuituū proportionē cognoscere. Subijciatur enim cuiuspiā circa horā primā inuasisse accessiōē cū rigore, qui carnes laborātis vulnerari videatur. Deinde oīa alia tertianæ febris indicia vsq; ad vigore processisse, cum bilis vomitu, simul cū bonis sudoribus declinare, atque esse iā diei horā nonam: nos verò ex toto accessiōis motu coniectare circa vndicimā horā sine febre agrotantē, ea. S. integritate quā in circuitibus nominare solemus. Dū verò ita speramus, subito supprimi sudores, aut dēsata solū aut etiā inhorrescēte cute. Deinde verò principiū incrementū & vigore pituitosæ continuæ febris specie fieri. Sic. n. duplicem causam ac speciem esse febrium cognoscemus, mixta intermittente cum cōtinua, quamuis nulla inueniatur intermissio. Ac secunda quidē die speramus inuasuram accessiōē hora nona. Et si vt expectabamus res ipsa eueniat, omnino etiam die tertio similiter sperabimus, adhuc febricitante agroto, tertianæ febris accessiōē hora prima prehensuram. Si verò anticipet, aut tardius occupet, quā secūdo die hora nona fore sperabamus accessiōē

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

sio, atque ea quam tertio die prima hora, non etiam sequentibus diebus, neque nona, neque prima spectabimus hora, sed tãto prius aut posterius, quanto primum circuitus proportio ab hora qua initio cœpit, aut anticipasse, aut tardius inuasisse accessionem indicauit. Vtra verò earũ prius desitura sit, tũ ex febris specie coniectandum est, tũ ex ipsa accessionis lōgitudine & magnitudine, more, motu, atq; circuituum in anticipando, & post occupando alternatione: ad hæc iudicijs quæ post apparent, crudelitatis & coctionis totius morbi, quæ in Urina maxima sunt. Ac de ijs omnibus in libris de iudicijs abũde dictũ est. Quòd si verò pituitosa cōtinua nequaquã nona hora, sed quinta aut sexta excipiat intermittētē biliosā, quæ prima hora incœpit, adhuc cognitu difficilior est vulgaribus istis medicis: quibus talis cōsideratio minimè curæ est, an vna sit species febris quæ facta est, an duæ & qualis vtraq; sit. Si quidē nihil horũ cognoscētes, nō solũ ignorāt quo pacto oporteat curare eas quæ nequaquã cognoscuntur quales non sint: sed neque vtrũ secũda die suspectas habere oporteat vtrasq; horũ,

horas, quæ prima die accessiones attulerunt. Ego igitur noui quod sæpius visus sum eis ex vaticinandi potius arte, quam præcognitione medica coniecisse accessionis inuasionem. In hac igitur ipsa, quam nunc tractamus, mixtione tertianæ cum ea quæ quotidie accedit, noui interdum circa primam horam inuadere tertianæ exquisitæ accessionem, circa sextam autem eius quæ à recentioribus medicis propriè καθημερινὸς . id est quotidiana nominatur. Solent Verò ita appellare febrem quæ singulis diebus accedit, ad integritatem autem non desinit. Ego Verò solitus sum talē febrem ἀμφοτέρωθεν σὺνελξν. Id est quotidianam continuam nominare. Nomen enim καθημερινὸν nequaquam licet in venire, apud quemquam grecorum scriptum ἀμφοτέρωθεν Verò omnem rem quæ singulis diebus similiter fit, nominant. Sed vt Plato inquit nomina contemnere oportet eos quibus tantarum ac talium rerum proposita est consideratio. Vocetur igitur manifestioris doctrinæ gratia ea quæ singulis diebus accedit, & in integritatem desinit quotidiana simpliciter, nihil item

DE DIFFEREN. FEBRIV M.
ei oratione adijciendo. Ea verò quæ minimè
desinit quotidiana continua . Liceat au-
tem si quis velit & alteri adijcere intermit-
tens . Pari ratione & in ea quæ tertio quo-
que die accedit, altera quidem differentia ter-
tiana simpliciter, vel etiam intermittens, alte-
ra verò tertiana continua nominatur . Li-
cet autem & continuam tertianam appella-
re tertianam simpliciter sine vlla adiectione,
quemadmodum nonnulli nominant. Sed non
oportet de nominibus fusius disputare , sed
ad institutum redire. Inuenis enim in quo im-
plexum factum fuisse dixi tertianæ cum quo-
tidiana continua , prima quidem die incæ-
pit mane cum rigore tertianæ feбри proprio,
aliaque omnia exquisitæ tertianæ inditia ser-
uans vsque ad sextam horam , subitumque
vomitum biliosum , & alui excretionem bi-
liosam , ac paucos sudores, inter quos statim
homo contractus est, atque inhorruit: ac dein
de rursus incipiente inuasionē , pulsus erat
paruus & inequalis : postea vsque ad ho-
ram vndecimam , succensa icem paulatim,
plura quidem inuasionis habebat propria, pau-

ea verò quædam etiam incrementi? Deinde
 usque ad noctis horam quartam incre-
 mentum certum erat, post in eadem magni-
 tudine permanebat, quod sensu percipi pote-
 rat usque ad sextam noctis horam: unde iam
 manifeste declinare videbatur usque ad quar-
 tàm horam in secundo die. In hac enim
 iam contrahebatur, atque ipsius inuasionis in-
 ditia ostendebantur, partibus quidem ip-
 sius extremis frigidioribus factis, pulsu au-
 tem paruo: & sane usque ad vespèram
 paulatim crescebat, neque horrorem quem-
 piam, nec aliam inæqualitatem efficiens:
 deinde rursus vigeat circa horam noctis
 quartam, ac sensibilibiter inclinare incipie-
 bat circa sextam. Quod igitur tertio die
 horam circiter secundam oportebat expe-
 ctare eius accessionem quotidianam, per-
 spicuum erat: non tamen tertiana an sera-
 natura esset eandem horam, an non, per-
 spicuum erat. Accessio itaque horrida in-
 cœpit hora secūda, quæ celerius quàm ea quæ
 in prima & secunda diebus continuae quo-
 tidiana accessio facta erat in crescens,
 usque

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Usque ad horam quintam, initium rursus alterum fecit post quintam horam, atque ei erant omnia symptomata similia ijs, quæ secunda hora acciderant. Hinc verò rursus increscens promptius usque ad octauam horam, denuo in illa horruit. Ac paulo post accessio prompte increscens ascendebat, ut circiter noctis horam quartam ad vigorem perueniret, & quid nam aliud quam exquisitæ semitertianæ hæc accessio fuit, cum duæ febres eadem hora inuaderent: propterea quod quæ singulis diebus accessionem habebat, duabus horis anteuertisset. Tertianæ verò duabus horis tardius occupasset. proinde qui species febrium, cognoscere potuisset, manifeste tertianæ, & quotidianæ, continuæ symptomata per mixta esse deprehendisset. Cum enim tertiana cum rigore inuadat, quotidiana verò sine rigore: mixta ex utrisque febris horrorem statim inferebat. Rem quidem rigore minorem, maiorem verò refrigeratione: & tanto refrigeratione maiorem, quanto minor est rigore. Quæ propter cum ab utrisque extremis æqua proportionē distet horror, in medio amborum, rigoris

vis scilicet atque refrigerationis, collocatur, id quod permixtis inuicem extremis maxime fieri solet. Ergo non ab re nomen tali feбри semitertianam imposuerunt. Nam cum vniuersa eius natura ex quotidiana continua, & tertiana intermittente sit mixta, dimidiam partem vtramque predictarum febrium habet. Vt igitur semiasinus mulusue, ac semideus dictus est, ita etiam semitertiana. Mulus enim quum ad eius generationem ex dimidio, equus conueniat, ex dimidio vero asinus, ab altero eorum mulus seu semiasinus nominatus est. semideus quoque dimidia quidem parte Deū participans monstratur. Quod verò homo est in altera dimidia parte omittitur. Itidē nūc semitertiana, dimidiam suam partem habet tertianam, alteram autem dimidiam partem cotidianam continuam. Duplex vero generationis eius modus, aut enim in vnum tempus due accessiones concurrunt, vt paulo ante dicebatur, quia altera anticipat, altera autē tardius occupat, aut ambæ statim ab initio inuicem permiscuntur. Quæ igitur sit vbi in vnu tempus ambæ coeunt, vnam solam habet accessio

DE DIFFEREN.FEBRIVM.

cessionem naturæ semitertiana, altera verò omnes ab initio morbi vsque ad finem, quæ sane maxime propria semitertiana, ab omnibus nominatur. Sed de hac paulo post dicetur potissimum propter Agathinum, & Archigenē. Iuueni igitur qui in nostra ratione propositus est tertio die tali accessione facta, quia in vnum tempus ambarum febrium inuasiones inciderunt, quotidiana quidem duabus horis semper anticipante, quarta die accessio, sole oriente inuasit, pituitosæ exquisitam formam febris seruans. Debebat autem secundum proportionem quinta ab ea accessio incipere circa decimam horam noctis, quando duabus horis anticipabat. Tertia verò biliosæ febris accessio ab initio die. 5. hora. 4. inuadere debebat, ita vt inter duarum febrium initia sex horarum intervallum intercederet, quod etiam factum est circa. 10. quartæ noctis horam inuadente accessione, forma pituitosæ febris, atque ita præcedente vsq; ad quartam diei horam. Vbi verò biliosa cum medio cri rigore ei coniuncta fuit, deinde rursus per mixtam formam habuit accessio, per bilio-

sam

sam simul & pituitosam formam, sequenti autem nocte circa octauam horam pituitosa febris incipiens, exquisita & sola, totum sequentem diem qui sextus fuit, occupauit. Deinde vsque ad mediam noctem inclinans, inde rursus incœpit eodem modo, postea reliquam noctis medietatem, & vsque ad meridiem tertij diei obtinens, iam quodammodo inclinauit. Atqui tertiana ipsi successit, cum rigore incipiens, quemadmodum exquisita tertiana inuadere consuevit, atque alia omnia exquisita afferens inditia, bilis vomitum fecit, & adiectionem biliosam, & vrinas bonas, & quemdam madorem crepusculo vespertino, indicans euidentissimè ijs qui didicerunt cognoscere febrium formas quod remitteretur, atq; inclinaret, & post vnũ vel ad summũ alterũ circuitũ esset desitura. Nã inclinatio facilitatẽ habuit quãdã mirabilẽ & qualẽ nõ aliã priorũ vsq; ad noctis horã quartã, in illa enim pituitosa febris singulis diebus accedens horis aut buabus anticipas inuasit, atq; totã occupas noctẽ, & totũ sequentẽ diẽ rursus, incœpit octaua nocte hora. 2. quã quidem

DE DIFFEREN.FEBRIVM.

cum totam occupasset, sequenti die inclina-
uit nona. Eadem verò die circa octauā horā
accessio tertiana fieri debebat, quando dua-
bus horis cunctabatur, sed tunc hora nona in-
uasit indicans etiam hoc ipso suam inclinatio-
nem. Sole autem occidente coniuncta est ei
pituitosa accessio, anticipando vt solita erat,
inuadens, & cum noctem illam, & sequen-
tem diem occupasset, rursus hora decima die.
io. inuasit, deinde rursus vndecimo die, hora
octaua exquisitè pituitosa manens, postea cir-
ca horam noctis primam horrida inuasio ter-
tiana febris, 4. horis tardantis facta est. Dein-
ceps verò sexta noctis hora aluus biliosa deie-
cit, & quidam in toto corpore madores exti-
terunt, & post hos tota inclinatione prope in-
tegritatem peruenit, & erat iam perspicuum
tertianam integre desuisse pituitosam autem,
solam relictam esse, iam. & ipsam nonnihil
remittentem. Hac igitur de causa die duode-
cimo accessio non item duabus horis, quem-
admodum ante solita erat anticipauit, sed se-
ptima hora inuasit. Deinde decimo tertio
haud quaque sexta sed tardauit, ibidemq; se-
prima

ptima hora inuasit, cum efflatu digna facilitate, atque inclinatione. Quartodecima autem die inclinatio multo melior facta est, & accessio hora nona inuasit, & in vrina insignia coctionis inditia apparuerunt, prænuntiantia solutionem fore in die futuro indicatorio. Sed de hoc nunc non est sermo, nisi obiter. Quod autem saepe numero permisceantur diuersi generis febres, biliosa & pituitosa, & intermittentes continuas, medicorum vulgus latētes, praescriptus agrotus abunde indicat.

TAm diffuse Galenus de febre semitertiana disputat, vt nulla caput indigeat enarratione. Sed illud vnum notandum est, cum ex pituitosa febre & biliosa quatuor coniugationes fieri possint, illam vnicam ab Hippocrate semitertianā appellari, quæ ex tertiana intermittente & quotidiana continua est composita: de qua Galen. hic non dicit, quod de reliquis, in quibus naturis, & quibus temporibus, fiant, neque accidentia omnia quæ illas consequuntur refert, quod in. 4. cap. li. de ty. pis facit, quem libellum post hunc statim legi oportere censeo etymologiæ huius nominis interpretēs, duas alias excipit in eo libelli rationes, præter vnicam quā modo scripsit. In

R. scripta

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

scripta iuuenis hypothefi dubitationē habet (nam reliqua omnia perfpicua ſunt) quod cū inclinaret bilioſus paroxiſmus, accēſio pituitoſa cum horrore prehēdebat, quamquā cōtinuæ febris erat accēſio, quā hac ratione oportuit ſine omni horrore ingruere. Nam ſi ſola accēſio pituitoſa fieret, omnino neque refrigerarentur ita affecti, vt in ſequenti ſtatim cap. Gal. ipſe dicet, cauſa verò paroxiſmi, cū iam inclinet, nulla ratione videtur rigore habitura. Videtur ergo tunc temporis ſolummodo ea accēſio à rigore incēptura, cum in idē tempus incidunt paroxiſmus bilioſus, & accēſio pituitoſa. Verū res non ita habet, ſed cum in idē tempus incidunt, fit horror magnus, cum peractus eſt iam rigor tertianæ, inuadit accēſio quotidiana cū horrore etiam, ſed minori. Cauſa eſt (quāntū ego intelligo) q̃ cum pituitoſus humor tunc incipiat moueri, natura interturbatur à bilioſi digeſtione & bilis particulae, quæ iam effuebant, cohibitæ horrorem aliquem efficiunt. Cum minori adhuc horrore inuadit pituitoſa accēſio, quæ ante bilioſum paroxiſmum fit & cū multo minori, quæ fit in interiecto die, ſed fit tunc quoque cum horrore aliquo: quia cineritium quod ex bilis uſtione, ex priori paroxiſmo in membris relictū eſt, ex noua corporis commotione, aliqua-

tenu

tenus agitur. Animaduertenda etiam sunt illa Galeni verba. Cōiectare circa vndecimā horam fore sine febre egrotantem, ea scilicet integritate, quam in periodis nominare solemus. Quæ verba mihi aperte innuunt, quod paulo antè monstraui, in nullis febribus, etsi in genere earū quæ intermittentes vocantur, sint, venire homines ad veram integritatē, sed ad integritatem quādam. Nam aliter frustra verba illa addidisset Ga. ea scilicet integritate quam in periodis nominare solemus: cætera quæ de modo prænoscenti, quando soluenda sit alterutra illarum febrium, hic dicuntur ex com. 12. primi aphor. sunt, & ex primo de crisi- bus. Quod dicitur in fine capitis, obiter hic tāgitur à Galeno est enim etiam operis de crisi- bus. Nimirum vt à me in. 10. lib. Cont. ex Ga- leno ipso monstratum est, intra vigesimū diē, qui est finis morborū acutorum omnis quater- narius est sequētis quaternarij index: Fit verò in die indice insignis mutatio circa coctionē.

CAPVT. VIII.



*Ed quoniam de ijs consentanea di-
cta sunt, ad id quod paulo ante distu-
limus, rursus reuertor. Febris quæ
ex tertiana & quotidiana continua compo-*

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

sita est, quā semitertianā appellamus, vel flauam bilem exuperantem habet, atque ob id tertianæ febris symptomata vehementiora, vel hanc quidem pauiorem, pituitam verò abundantiorē, atque idcirco quotidiana continua pathemata firmiora, vel neutro magis exuperantem, sed ambos æque ualentes, quem admodum est exquisita semitertiana: talis species existens, qualem ipsam Hippocrates indicauit, lib. 1. epidemion ad hunc modum scribens. Erant plerisque ipsorum huiusmodi pathemata, febres horridæ, continuæ, acutæ, omnino non intermittentes. Modus autem semitertianus erat, diem quidem vnum leuiorē habentes, altero autem grauius exacerbascentes, & summam in acumen crescentes. Horridas enim dixit non simpliciter cū horrore incipientes (quod innumeris febribus id accidat, de quibus deinceps disserā) sed in quibus plurimam partem accessionis horrores occupant, altera quidem die, in qua simul inuadunt tertiana, ac quotidiana cōtinua. Sequēs enim dies quotidianam tantummodo habet. Proinde prima dies magna ex parte permixta

tam

tam ex vtrisque febrem affert, secūda verò continuam pituitosam. Contingit autem interdum prima die pituitosam inuadere, secunda verò vtrasque. Accessio igitur communis ex vtrisque, quando æque potentes fuerint humores. Talis est qualem paulo ante descripsimus semitertianam. Vbi verò tertiana præualuerit, febris magis horrida fit, & aliquid rigoris in inuasiōe assumit. Statim verò & calidior, & ardentior est talis febris, ac celerius ad vigorem peruenit, & quandam bilis vomitum, aut deiectionem, aut modo rem infert. At vbi altera pituitosa superior fuerit, extremarum partium refrigerationes exuperant, exigui autem sunt horrores, & pulsuum compressio vehementior ac diuturnior, tardeque accessio increfcit, & multo post tempore in vigore consistit, non tamen sitim efficit, neque æstiosa est, neque in ea vomitus, neque deiectio biliosa, neque mador fit. Atque in harum duarum febrium mixtionis notitiam aliquam Archigenes peruenit confuse tamen & incistinctè, quemadmodum in septimo cōmētariorū, quos aduersus tracta-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

tionem eius de pulsibus scripsimus, est à nobis ostensum. Arbitratur enim in semitertiana quandoq; exuperare tertianam febrem, quandoq; verò quotidianam, non tamen mixtionē earū æque potentem, quæ sola exquisitam semitertianam constituit, vel cognouit, vel indicauit sed penitus omisit. Quum enim æquales magnitudine fuerint intermittentes, biliosa & pituitosa continua, inuasio accessionis cū horrore fit, medium enim id rigoris & refrigerationis existit, è quibus alterum tertianæ, alterū verò pituitosæ cōtinuæ inest. Incrementum aut̃ ab inuasionē propter tertianam facile calefcit, ac ad vigorem festinat, propter pituitosam verò tardum, quantum in ea est, incrementum efficientem, detinetur atque interruptitur. Atque est veluti quædam pugna symptomatum, egroto interdum incalescente, vbi tertianæ calor vehementius agens, ad cutem humores effert, detinente verò interdum ac retrahente intro huius motum pituitosa, quæ pigra difficilis motus, tardi transitus, & frigida natura est. In hac autem pugna frigido exuperante humore, contractio-

nes, horrores, refrigerationesque extremarū partium, & cutis fiunt, ita vt altera accessio rursus inuadere videatur. Quod si calidior exuperet, confertim incallescunt, & prope ad vigorem peruenisse videntur. Deinde paulo post exuperante pituitoso, agri rursus contrahuntur, refrigerantur & horrent, idque minimè desinit vsque ad vigorem, qui & ipse maturius, quam in pituitoso humore, tardius autem quàm in bilioso factus videtur. Pituitosus enim biliosi celeritatem detinet, pituitosi verò rursus tarditatem ac segnitiam biliosus excitat. Talis quidem est exquisita semitertiana, ex equali mixtione duarum febrium, quia etiam duorum humorum, facta. At quæ minimè exquisita est, vel biliosum vel pituitosum abundantiorē obtinet. Secunda verò est complicatio duarum febriū, tertiana & quotidianæ, similem quandā prædictæ accessionē efficiens, differentē tamē, eo q̄ hæc deducitur ad integritatem, & q̄ secunda die vel cū horrore vel rigore sola derelicta quotidiana inuadat non erit igitur talis febris semitertiana, siquidē ex numero continuarū se-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

mitertiana existat. Si verò in alio genere februm semitertienā annumeremus, nō talis salū, sed etiā aliæ quædā febres nominabantur, semitertianæ. Hac ratione mihi videtur Agæthinus omnes productastertianas appellare semitertianas. Sed cū de nominibus potiusquā de rebus tales quæstiones sint, in ipsis immorā dum minimè censeo. Nā de medicis nominibus seorsum alio libro scriptū est, in quo id ostēditur & integre definitur, quales nā sint de rebus, & quales nā de nominibus cōtrouersia. Rursus igitur ad res ipsas redeamus, ad eā scilicet quæ semitertiana ab Hipp. nominata est horrificā & cōtinuā, quā tertiana quotidiana cōtinuæ permixta efficit, intermittēti autē haud itē, propterea quod ex vtrisque composita necessario & ipsa intermittēs existit. Neque verò ex duabus cōtinuis, biliosa scilicet & pituitosa fieri pōt semitertiana. neq; enim mixtio hæc horrificā faciet febrem, neq; multas reduplicaciones habentem. Quū enim omnis cōtinua febris suapte ratione, quū exquisita est, neq; horrorē habeat neq; rigorē, neq; ex eis cōposita horifica erit. oportet ergo si ipsa horifica simul atq; cōtinua sit futura, ex duabus fe-

bribus, quarū altera sit intermittēs, altera autē cōtinua generationē habeat. Quocirca tertiana quotidiana & cōtinua permixta semitertianā cōmittit, neq; ambae intermittētes, neq; ambae continua & talem febrē efficere possunt. Restat igitur vna mixtio, quæ cum ex quotidiana intermittente, ac biliosa continua constet, potest & ipsa continuam simul & horrificam febrem committere. Hæc autē contra quā prima continuitatē ex biliosa, horrorē verò ex pituitosa, reduplications ex multa pugna, potissimum, vbi humores fuerint æque potentes habet. Vincente autē eorū altero, & symptomatica & dignotio in prima mixtione declarata sunt. Hæc oīa de quatuor mixtionibus biliosa febris & pituitosa magis propria sunt, ut cuiuspiā videretur, tractatiōi de typis: hic verò necessariō dicta sint propter semitertianā, cuius generationem Archigenes ad tertianā ac quotidianā retulit, nō animaduertens se intermittentem efficere febrem: Agathinus autē perspicuus confessus est eiusdem generis esse cum tertiana semitertianam, magnitudine solum accessionis disidentem. Si igitur omniū

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

febrivm differentias exquisitè scribētes in nominibus lapsi essent, non ægre ferendum fuisset. Sed cum neque simplicium neque compositarum omnes scripserint differentias, & itē quasdam alias superuacuas adiecerint, quæ neque ad prænotionē, neque ad curationē conferunt, nos pro viribus cōnati sumus accuratē omnem typum elaborare, longo tempore experientia simul ac ratione, vtilis in eo differentias reuestigantes. Simples igitur ad præsentem attinent tractationem, ex ijs autem implicatæ ad librum de typis, cuius penitus ignarus non eris, si hūc diligenter perlexeris. Ex ijs enim quæ proximè de biliosa ac pituitosa febribus in vicē permixtis, licebit hæc etiā ad melancholicā transferendo, de implexu ac mixtione cum vtraq; earum coniungere. Implexum quidem nominantes vbi diuersis horis inuadunt: mixtionē verò vbi initium eodem tēpore fit. Sic verò & tres febres implicare ac miscere quis poterit, ipse per se ex ijs quæ dicta sunt ad intelligēdum prōptus factus. Harū enim omniū initium, fons & elemētū est, accurate dignoscere cuiusq; simplicium febrivm formam.

*mā. Neq; enim magnus earū numerus est, sed
 oēs tres existunt, biliosa, melancholica, & pi-
 tuosa, quarū cuiusq; duplex est differētia, in-
 termittēs & cōtinua, ita vt oēs simplices dif-
 ferentiæ februm ex putridis humoribus accē-
 sarū, sex numero sint. Quod si qua alia illis ac-
 cesserit in ijs particularis differētia, ex humo-
 ris copia, quantitate, & qualitate putredinis,
 nec nō modo motus, & parte in qua putrescit
 gñerationē habebit. Veluti confestim febribus
 intermittētibus quæ tertio quoq; die accessio
 nē obtinēt, quibus vtiq; breue accessionis tem-
 pus est, & inuasio cum rigore, & solutio cum
 sudore ac bilis vomitu, aut aluo biliosa deijciē-
 te, nomē inditum est, exquisita tertiana. Cui
 verò aliquid horū deest, nō itē, exquisita, sed
 simpliciter tertiana vocatur. Quod si autē in-
 termisionē minorē habuerit, occissione vide-
 licet extracta, tertianā hanc productā nomi-
 nāt. Tamet si hæc ipsa in ratioe maioris & mi-
 noris plurimā differētiā obtineat: ac licet qui-
 dem ex ijs aliquā simpliciter productam, quæ
 quum quatuor & viginti horas accessionis oc-
 cupauerit, reliquas febris expertes habet. Ali-
 quam*

DE DIFFEREN.FEBRIV M.

quam verò admodum productā, quæ circiter
 30.horas februm extendit. Aliquam præte-
 rea magis productam quæ ad 36. progreditur
 Et aliam quandam plurimum productā, quæ
 ad 40, & plures item extenditur. Sed vnam
 quālibet dictarū certis terminis definire nō li-
 cet propter soriticam d. bitationem. Quin e-
 tiā neq; necesse est talē nominū exquisitā ra-
 tionem quæres quū liceat nobis etiā sine ea,
 ijs qui adsunt accuratè de vno quoque egro-
 to iudicare & rectè curare, & id quod fu-
 turū est prænoscere. Subijciatur enim aliquis
 quindecim horas febricitare, esse autē sine fe-
 bre tribus & 30. atq; deinceps ei proportiōe ac-
 cidere. Cōstat verò q̄ cibādi tēpus ex acfessionis
 & intermissionis tēpore cognoscetur, &
 quidquid ex eo ad prænotationē & curationem
 vtile sumi potest, id quoq; abunde consequen-
 tur, etiā si nō quæritur tertianā ne simpliciter
 appellare oporteat eiusmodi febrē, an cum alia
 qua alia adiectione, quæ differentiā definiat.
 Quin & volens alteri egrotātis febrē indi-
 care qualis nā sit, accuratius indicabit acces-
 sionis & intermissionis longitudinem dicen-
 do, quā quærendo nomem quod perspicuè &

definite idē demonstrare queat. Hæc igitur optima enarratio atq; doctrina est. Secunda verò quā paulo antē dixi, exquisitā quandā tertianā nominās, aliā autē simpliciter tertianā, deīde aliā paululū productā, post aliā admodū aliā verò magis, postremo aliā plurimum. Omnium autē obscurissima & deterrima est, quæ prima est prodita, in qua recentiores medici quotidie interesse certāt, & cōtendunt, ne id quidē cognoscentes quod de nomine litigant. Sed de alijs fortasse quis minus mirabitur, de Agathino admodum mirādum, siquidem productā quandā quotidianā & quartanam vocās, in tertiana minimē seruauit proportionē, sed cuius lōgius producta fuerit accessio, hāc semitertianam nominat. Sed de nominum ratione mihi iam abunde dictum est. Nam & ipse plusquam par est temporis in ipsis contro. Proinde tempus est vt ad earum rerum quæ reliquæ sunt cōsiderationem, redeamus.

Verius & exquisitiū appellatur semitertiana, ea febris in qua biliosa & pituitosa æquo Marte pugnant, quā in qua alter humor ab altero superatur. Quāquā hanc omisit Archigenes, interim referens inter hemi-

triti

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

triti species, complexum & tertiana intermit-
 tente & quotidiana intermittente, cum tamē
 hic semitertiana nō sit iuxta ea quæ ab Hippo-
 crate scripta sunt primo Epid. parte prima, te-
 xtu 22. febres horrificæ, continuæ, acutæ, om-
 nino non intermittentes, modus autem erat
 semitertianus. Ex his verbis elicit Galenus iux-
 ta Hippocratem semitertianam esse conti-
 nuam & horridam febrem. Quare neque im-
 plexus ille quem diximus ex duabus intermit-
 tentibus, erit hemitritus (non enim erit conti-
 nua febris) neque alter ex duabus continuis,
 quia non erit horrida. Cum enim neutra con-
 tinuatam horrorem habeat, neque ambæ ha-
 bebunt. Supersunt itaque duo genera hemi-
 triti, ex intermittente biliosa, & continua pi-
 tuitosa, aut intermittēte pituitosa & cōtinua
 biliosa. Qua ratione illi differant: docet Gal.
 apertissimē, vt nulla enarratione sit opus. Hæc
 eadem signa quæ Galen⁹ scripsit in hoc loco,
 ad dignoscēdū an bilis superet pituitā an pi-
 tuita bilē scripsit luculētissimē paulus li. 2. ca.
 34. deceptus est vehemēter Agathinus putans
 febrē tertianā productā, esse semitertianā (ita
 appellat quæ plurimū producitur, solet verò
 p̄duci vsq; ad 24. horas nonnunquā & ad 30.
 quin & ad 40. aliquando, neque potest hac
 certo termino finiri) nam quāquā ea ex duo-
 bus

bus humoribus pendeat, simplex tamē est nō composita, quia non habet illorum quilibet motum per se, sed mixtus ex ambobus succus vnicum facit motum. Verū tractatio de febribus compositis, ad librum de typis attinet. Nam hic Galenus de simplicibus agit solū, quamquam interim de semitertiana disputa- uit, quoniam puto insignis admodum inter compositas febres est, & vt in hoc etiam libro quamquam omnes compositionum modi nō dicerentur, ex vno saltem exemplo via intel- ligēdi omnia præstaretur. Soritica perplexitas est, quam Cicero vocat acerualē, dicitur qui- dem sorites, & est, captiosus modus interro- gandi vbi aliquid minutatim additur aut de- mitur. Nimirum febris productæ non potest definiri certus terminus nisi cum quadam la- titudine definias, dicens: circa triginta horas, particula circa latitudinem significante. Verū hoc ipsum, paulo superius nos, de omni febre dicendum esse, ostendimus, siue ea sit exquisi- ta, siue notha, nulla enim profectò tam præsi- nitum finem habet vt si dimidia horæ pars il- li addatur, genus iam exceserit, omner ergo, ne soritica perplexitas contingat, cum quadā latitudine definiendi sunt, aut finis cōstituē- dus est, nō quasi necessarius, sed quasi plerūq; contingens, paulo plus minusve.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
CAPVT IX.



N ijs aut̃ quæ restant,
fuerit hæc considera-
tio nulla inutilior, an
vt ex vtraque bile &
ex pituita fiunt quæ-
dam febrium species,
ita & ex sanguine pu-
trescente. Diarias e-
nim febres calefacto illo duntaxat, non etiam
putrefacto fieri dicebamus. In putrefactioni-
bus autem (necesse enim est sanguinem etiã
interdum putrescere) quærenda est febrium
species. Id autem inuentum iri par est, si prius
inuenerimus, quomodo sanguis putrescit. Vi-
detur enim rectè Aristoteles dixisse, putredi-
nem ab alieno calore fieri. Vocat autem alie-
num, externum, non innatum, neque vnicui-
que rei propriũ : Hic enim coquere natus est,
alienus verò corrumpere, quod est putreface-
re. Extrinsecus autẽ calor superuenit sangui-
ni, per æstus, & pestilentes cõstitutiones, &
vt in sũma dicatur, per oēs febres, ex quacũq;
causa

causa generentur. Quin etiam ubi in aliqua animalis parte sanguis copiosior acerbatus supra vires eius fuerit, corrumpitur, maxime ubi propter crassitudinem in exiguis vasis in fractus est, aut ob multitudinem impactus, quemadmodum accidit in bubonibus & phlymatis, & ut in summa dicatur, in omnibus phlegmonibus. In talibus enim affectibus, duplici de causa corrumpitur sanguis, & quia non perflatur & quia non vincitur à natura. Quod verò quæ non diffilatur putrescere soleat, in omnibus externis videre licet, fructibus, seminibus præterea vestibibus. Eius verò quod dictum est fidem facere potest, id quod in pleuritide accidit. Expuunt enim in ea alij spumosa, alij pallida alij rubea sanies, eius qui in phlegmone vincit humoris, quæ non continetur, sed prætonuitate extra sudat. Interdum quoque talis sanies nigra apparet, ac neque statim ab initio, sed processu temporis, præcedentibus magna ex parte pallidis sputis, quæ flauæ bilis exuperantis erant inditia, quemadmodum spumosa pituitæ, rubra verò sanguinis.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Qui ex præfenti capite monſtrare conatur, Auicenam. ſen. prima quarti. falſo imponere Galeno, opinatum eſſe illum nullam eſſe febrem ex ſanguine putreſcente, videntur mihi neque Galenum neque Auicenam intelligere. Non enim Auicena dicit Galenum negaſſe febrem aliquam fieri ſanguine putreſcente, ſed eam eſſe ſanguineam, immo verò dixiſſe bilioſam eſſe, quandoquidem ſanguis qui verè putreſcit, & ſecundum ſubſtantiam iam alteratur, non amplius ſanguis eſt, ſed bilis. Id verò dixit Galenus apertiſſimè cap. 12. libri ſecundi de criſibus, his verbis. Atque in eo illud ſeruatur, quod tria ſint vniuerſa ſimplicium febrium genera. Quæ enim ex putreſceto fit ſanguine, iam quodammodo bilioſa eſt: ſi vtique in naturalibus ſermonibus rectè demonſtratum eſt, quod ſanguis ex moderato fit calore, flaua verò bilis ex plurimo, atra autem ex ſatis immodico. Quid aliud ſibi volunt hæc verba, quàm putridum ſanguinem, non eſſe ſanguinem, ſed bilem? Nam in ſecundo de facultatibus naturalibus rectè monſtratum erat, ſanguinem ex moderato calore fieri, ex immoderato verò reliquos humores. Cū ergo ſanguis putreſcens ex immoderato calore fiat, erit ſanguis putreſcens à ſanguine non putreſcente genere diuerſus: quare neque ſanguis

guis erit omnino, sed species quædam bilis, alijs putrescentis bilis speciebus mitior, gratia mitioris materiæ ex qua genita est. Quod itaque paulo superius in 6. cap. de pituita cõcessit, consuetaneè fortassis ab aliquo dici posse, scilicet rigorem & febrem non ab eadem causa fieri, eo quòd pituita putrescens pituita non sit, sed species quædam bilis, hoc ipsum illo in loco de sanguine asseuerat. Atqui multo verius de sanguine dici potest, quàm de pituita, aut aliquo alio humore. sanguis enim cū in humorum mediocritate naturam suam retineat, nō potest esse multiplex secundum species, sed quum primum secundum substantiam alteratur, in aliud genus incidit, aut virus sit, aut pus, aut bilis, sanguis amplius nō est. Hæc ergo est opinio Galeni cui apertè contradicit Auicenna ita dicens, & putredo quidem est corruptio accidens sanguini, & est sanguis, sicut accidit phlegmati & est phlegma, & nō cholera. Verū interim Auicenna dicto argumēto, quod ex sanguinis natura sūpsit Galenus, nō respondit. Sed nos opinionē hāc Galeni explicuimus & multis argumentis confirmauimus in quinto lib. controu. modo illud vnū dicimus, febrem quæ ex sanguine putrescente sit, quantum habet putridæ, tātum habere biliosæ febris. Nā partes sanguinis quæ putrescunt vere, & tota

DE DIFFEREN. FEBRIUM.

Substãtia iã alteratur appellatur sãguis putrescēs, tñ si exactius cõsideramus, intelligimus bilis esse iã specie quãdã, quia nõ est iã ex moderato calore. Huic sententiæ quam in illo loco docuit apertissimè, nihil hic scripsit aduersum. Docet enim hic sanguinem putrescere, & putrescentem febrem facere, & in particulis inflammatione obsessis sanguinem putrescere, idque illi accidere vt alijs rebus ab alieno calore, & ventilatione prohibita: tamẽ cum putrescit non excedere proprium genus, & alium humorem fieri non docet. Cæterùm qui vølet hæc scire radicitus legat cap. 19. libri dicti controuersiarum.

*Consentaneum est sanguinẽ etiam ipsum in particulis phlegmone obsessis putrescere, febremque ex eo simpliciorẽ esse, quàm ex alijs humoribus. Proportionem autem accessio- num tertianiã circuitus sumit: ita enim etiam in pleuriticis fieri cernitur vbi rubra expuñt: vbi autem supra modum assatur, mutatur omnino. Pars enim tenuissima simul ac pinguis, in pallidam bilem: crassior autem in atrã vertitur, quemadmodum & in carbunculis accidit. Etenim in ijs ex sanguine vehemen-
ter*

ter feruēte, in melācholicū humorem mutatio fit. Ita verò nūc melācholicū esse humorem inaudire oportet, vt qui nondum exquisite attractibilis affectus sit, sed in quodam consinio constitutus. Febres igitur pro specie humorum, in quos sanguis mutatur, consistent, sola malignitate & lenitate dissidentes: simpliciores enim sunt ex sanguinis mutatione, tum in ceteris, tum etiam in caloris lenitate. Nam etsi quamplurimus ad manus occursum apparet, prorsus tamen est mitis, quemadmodum is qui à balneis accidit. Copia febrilis caloris, in ipsa effluxus multitudine semper posita est, molestia verò quæ extrinsecus iniectæ manui occurrit, in caloris acrimonia. Atque hoc tibi maximum inditium humoris efficiētis febrem, caloris inquā qualitas. Quæ enim vaporosior est, & minus molesta, sanguinis est, quæ verò molesta, erodens & mordax, ex bile consistit. Vbi verò in primo occursum vaporosa potius quàm mordax sentitur, diutius autem immorantibus paulatim acrimonia accedit, & maximè inaequalis, vt per

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

colum quoddam vel cribrum transmitti videatur, ex putrescente pituita talem febrem consistere, sciendum est,

Secunda hæc capitis pars, manifestè subscribit, ijs quæ nos in cômētarijs explicuimus. scilicet, febris ex sanguine putrescente seruat proportionē tertiani circuitus, etenim & pleuritis, per quam rubra spuantur, tertijs diebus exacerbatur. Quod qua ratione dicent factū, qui dicunt putrescentem sanguinem, non statim ac corrumpitur esse bilem, sed cum vehementer iam corruptus est? Galenus certè hanc rationem reddit. Pars enim tenuissima simul ac pinguis in palidam bilem, crassior autem in atram vertitur. Quidam vt febrem ex sanguine putrescente fieri concedant, & simul huius rei reddant rationem, dicunt esse febrem compositam, partim ex sanguine, partim ex bile. Quorum sententia mihi placeret, nisi recusarent dicere sanguinem omnem qui iam manifestè secundum substantiam alteratur, bilem esse, sed dicerent febrem esse compositam partim ex sanguine qui male disponitur, aut omnino leuiter putrescit, vt qui iam calefcit & humectatur præter naturam: & partim ex eo qui bilis iam est. verum dices ex Galeno

leno ipso nono libro meth. febrem ex sanguine putrescente esse continentem febrem, quare non posse seruare tertiani circuitus proportionem vt hic Galenus docet. scire licet febrē ex putrescēte sanguine (docet Gal. ipse cap. 6. lib. 2. de crisi bus) è genere esse febrium ardentium, ab illis tñ acutie differre, id est minus acutas esse ardentibus. Nam in presenti capite inquit, simplici res sunt ex sanguinis mutatiōe, tum in cæteris, tum etiam in caloris leuitate, Constat verò Hippocratem & Galenum simplices febres solitos appellare, mites, leues, & securas. Nam ita dicit in prognostico, simplicissimæ febres & signis firmatæ securissimis: vt ex his satis iam constet, decipi valeriolam, putantem febrem ex sanguine ardentiorē esse febre ex bile. Verum hunc in quinto libro controuerſiarum satis refutauimus. Modo redeo ad institutum, nā intra sanguineæ cōstitutionis tempus, & statim ac producuntur euadunt in tertianas, accessiones habentes satis conspicuas, consumpta scilicet maxima humoris parte, & reliqua facta biliosiori: tamen accessiones quartanas non habent hæ febres continentes appellatæ, neq; in continuas quartanas euadunt nisi rarissimè. Nam quamquā vt ex tenui sanguine putrefactione & vltione fit flaua bilis, ita ex crasso fit atra, tamē vt atra

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

fiat maiori actione opus est quàm vt flaua: nimirum flaua statim ac incipit putrescere, fit, atra non statim, sed cum consumptæ sunt tenues partes, sanguine vehementer feruente, vt in carbunculis contingit. Verùm monet Galenus hunc humorem qui ex sanguine vsto fit, non tam debere dici atram bilem simpliciter, quàm positam in confinio atræ bilis, aut atram bilem non exquisitam, quæ proinde à Galeno nunc appellatur melancholicus succus nunc atra bilis. Verùm neque tam mitis est quàm melancholia naturalis, neque tam acida quàm atra bilis quæ exustione melancholiæ naturalis aut flauæ bilis genita est. Causa huius est, quæ paulo antè tetigi quod scilicet, ceteris paribus ex mitiori materia mitior succus fit, itaq; exclusa ab exactæ bilis atræ ratione hac, quæ ex sanguine vsto fit, supersunt tantum duæ illius species, quas libello de atra bile scripsit Galenus. Verùm hæc omnia pluraque in hæc rem spectantia, diximus in primo libro controuersiarum, de speciebus atræ bilis disputantes. Quæ de inditijs humoris efficientis febrem in hoc capite dicuntur, aperta satis sunt.

Ceterum contemplanti mihi ac querenti causam, ob quam febres ex alijs humoribus natae, calorem equaliter occurrentem obtinent:

nent: quæ verò ex pituita consistunt, prædictam habent inæqualitatem, apparuit mihi causa esse maximè lentor, crassitudo, & dissolutionis humoris difficultas. Huius enim ut aliorum omnium, quicquid extenuatum est, quouis tempore discutitur. Vix autem extenuatur quidquid crassissimum fuerit, quòd si etiam natura frigidum fuerit multo magis.

Quocirca neque tota pituita, neque equaliter, sed quidquid eius putredo occupat, ea sola difflatur & extenuata effertur: ac proinde ut in lentis crassisque humoribus dum elixantur euenit. Nam in eis bullæ assurgunt, quibus ruptis, spiritus confertim attollitur, ac simul secum sursum ducens attenuatum humorem in tenuibus autem humoribus elixatis, neque bullæ efficiuntur, & qui ab ijs attollitur vapor, omnino similis ac cōtinuus sibi ipsi est.

CRassities & lentor pituitæ, facit ut in aequalitas caloris per febres putridas cōspiciat fit, & sensui occurrens. Tamen similis quædā causa facit, ut omnis intemperies fiens, & quæ ex humore aliquo pender, inæqualis sit. Nimirum quātumuis sit humor tenuis, & sine lētore, nō pōt tamē secūdū oēs partes esse æquæ aptus

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

putredini, quare neque ipse æqualiter afficietur, neque membra nostra æqualiter afficiet. Sed hæc inæqualitas secundum diuersas humoris particulas pituita putrescente sensui est manifesta, in alijs occulta. Verū in libellum de inæquali intemperie commentariolum, nuper scripsimus, in quo hæc omnia demonstrauimus. Febris nonnumquam fit sanguine putrescente in particula aliqua, vt accidit sæpe in pleuritide: nonnumquam illo putrescente in vasis omnibus magnis. Omnes sunt in genere biliosarum dicta ratione, tamen circuitus tertianos in illis solis est Galenus expertus, quæ ex humore in vnica particula putrescente pendent, quia in alijs cum omnes venæ plenæ sint, non mouetur humor, aut saltem quam minimum, & minime notatu dignum, (nam aliquid etiam tunc quoque moueri, non est improuabile) verum ex eo quod expertus est ille contingere in particulis inflammatis, in quibus sanguis putrescit, quod scilicet exacerbantur dolores, per tertios dies aliquando euidenter colligimus sanguinem per putredinem bilescere, & febres omnes ex putrescente sanguine, esse generis ardentium, etiam si in ijs quas continentes cum putredine vocamus, tales circuitus haud quaquam experiamur tam euidenter. Obscure enim etiam hæc

hæc videntur habere annotationes.

CAPVT. X.



OS QVAM au-
tem & de his cōsen-
tanea dicta sunt, fe-
brium quæ sinochi
appellantur causam
speculabimur. Mi-
rum enim mihi esse

videtur sæpe vsque ad quartum aut quintum
nonnumquam autem & vsque ad septimum
diem, vnam in eis fieri accessionem, ab ini-
tio vsque ad finem. Quamquam si quis consi-
deret exacte, admirandum magis est febrici-
tantes habere paroxismos secundum aliquā
periodum, exemplum enim quod antea dixi-
mus de stercore secundum partes putrescētes
in animalis corpore ferme accidere non po-
test, cum putrescentes humores cum ijs qui pu-
tredine vacant prompte misceantur, vt pote
conspiratione existente, & cōfluxu ex omni-
bus

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

bus in omnia. Quo circa non potest fieri ut putredo in vna aliqua parte, aliàs in alia cōsistat, nisi Phlegmone, incipientem putrescere humorem colligatum detineat. Quum igitur in contrarium ratio cedat, difficiliusque sit inuenire causam febrivm, per circuitum accessionē habentium, quàm sinochorum, de vtriusq; differere tentabimus, neque hic producentes sermonem, neque contradicentes aliorum erratis, sed ut in omnibus superioribus fecimus, ea quæ vera sunt dūtaxat persequētes, quibus quispiam fretus, aliorum etiā errata deprehendere possit: Incipiendū igitur ab ijs, quæ manifestissimè apparent, cuiusmodi sunt lippitu dines quædam, quarū hæc quidē singulis diebus, illæ verò tertio quoque infestare appareat. Similiter & aurium dolores, & capitis, vel totius vel dimidiij, quem hemicraniā nominant. Nonnullos verò etiam podagra, & articulorum dolor per circuitus infestare videntur. Quemadmodum igitur in omnibus ijs videre licet, Venas in partibus quæ infestantur in tumorem attolli, & phlegmonem augeri, ac dolores intēdi, fluxionemque superfluum foras pro-

procūbere, ita & in partibus internis, quæ minime apparent, eandem seruari proportionem existimandum est. Proinde etiam, eam quæ in pleuritide, ac eā quæ in parineumonia phlegmonem, in accessionum quidem initii intumescere, in inclinationibus autem discuti & subsidere. Sed quo nam modo id fiat, fortasse inueniemus, si de phlegmonis generatione, & rheumaticis vocatis affectibus, quæcumque nobis alibi demonstrata sunt, ad memoriam reuocemus. Cum illis enim quodcumque proprium huic sermoni est, si adiectum fuerit præsentibus questionibus sufficient.

CAusam febrium quæ synochi nominantur instituit Gal. docere modo, nō quidē, ex quo humore fiat (dictum enim id iam antea est) sed qua ratione fiant cōtinētes. An inquā à principio ad finem vnica accessio sit. Quoniā verò difficilius est intellectu, vt Gal. ipse luculēter satis mōstrat cur febres habeāt paroxismos secundum aliquam periodū, melius facit causam paroxysmorū primū inuestigans, & hac inuestigata, pauca quædam quæ scilicet sunt satis, in fine capitis huius vltimi, de causa qua continentes fiant, apponens.

Queri

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Quæri possunt hic duo: primum omniū cur febres aliquæ habeant paroxysmos aut accessiones, ac non potius continentes sint omnes: deinde cur hæ recurrant singulis diebus, illæ tertio, aliæ quartoquoque die. Prima quæstio facilior est, & ad secundam sternit viā. Proinde in reddenda causa prioris omnes medici consentiunt, de hac secunda dissentiunt: vsq; adeo, vt plerique barbarorum desperantes probabilem quampiam reddi posse, ad occultā proprietatem confugiant: alij cælestibus causis hoc imputent. Verum has inæptias in quinto libro Contro. de causis reditus periodici ex professo disputantes, & soluti à lege commentationis latius refutauimus, monstrauimusque hæc alia ex causa accidere, reddidimusque eandem quā Galen. in presenti capite. Modo nihil aliud quā caput enarrabimus. Volens Gal. inuestigare causam periodorum quos adeo omnes fere homines demirantur, nos deducit ex rebus quæ conspicuæ sensibus sunt, & eandem prorsus causam cum illis habent, cuiusmodi sunt quædam lipitudines (lipitudo est inflammatio palpebrarum) quarū aliæ singulis diebus aliæ per tertios dies ingrauescunt, & aurium etiam dolores quidam & totius capitis, aut dimidij. Huiusmodi etiam sunt dolores articulorum. scilicet nōnullos videmus

demus ophthalmia laborantes, quibus per circuitum aliquē inflammatio exacerbatur, & in aurium etiam doloribus, & capitis, & articularum, perinde accidit, quia fluxio ex qua mala illa pendent per circuitus illos influit. ergo cū in ijs quæ apparent ita fieri experiamur eodem modo accidere in delitescentibus doloribus, & qui minimè apparent, vt in pleuritide & pulmonum inflammatione, & internis aliis affectibus, est verisimile præcipuè cum in his etiam per quosdam dies symptomata ingrauescant, fluxione scilicet per quædam interualla incumbente. itaque ex his haud est iam intellectu difficile, repetitiones februm per circuitus simili quadam causa fieri, qua fiunt inflammationes, & fluxiones reliquæ. Commode ergo facit Galenus, de fluxionum causis, quæ alibi demonstrata sunt, hic assumens, id quod sequens dictio cōtinet.

Fluxionem igitur decumbentem in oculos, omnes quidem concedunt à capite deffluere, sed quanam causa sit ob quam præfinito circuitu sæpenumero defluat, dicere haud possunt, vt qui de facultatibus naturalibus nihil cōmentati sint, de quibus nostris in libris scripsimus, quatuor esse omnes demonstrantes,

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

tes, à quibus stirpes, & animalia gubernantur
 Una igitur est familiarium attratrix, altera eo-
 rundem retentrix, tertia autem ab ijs altera-
 trix, & quarta præterea alienorum expultrix
 Alienum verò in omnibus rebus duplex est:
 alterum qualitate, alterum quantitate. A-
 cerbatur quidem id propter facultatū quæ in
 ijs partibus sunt, robur & imbecillitatem. Si
 enim æquis sint viribus, & meatus qui excre-
 menta deducunt, secundum naturā se habue-
 rint, partes ipsæ sanæ sunt: Vbi verò plus quā
 alteratur, deducatur, omne id quod superua-
 cuū est, ab excretrice facultate pulsum, excer-
 ni necesse est. Si aut ipsa imbecilla sit in hoc
 loco manet: ac quod multum est, grauat, atq;
 distendit eum. Quod verò acre est, erodit ac
 mordet, quæadmodum quod calidum est, cale-
 facit, quod frigidum, frigefacit. Hæc autē li-
 quido etiā in vētriculo apparēt. Quidam nāq;
 ingerentes plus ciborū, interdū nauseabūdi vo-
 mere coguntur, interdū alui pro flumio corri-
 piuntur. Quod igitur hic per maxima patiētia
 loca excernitur, quæ foras id quod redūdat, e-
 ruētāt, id in alijs partibus animalis, per tenues
 meatus

meatus, non foras sed ex alijs in alias transfuit partes, expellentibus quidem ipsum robustioribus: suscipiētib; aut imbecillioribus pel-
litur aut rursus ex ijs in alias atq; ex illis in a-
lias deffluit, donec tandē in omniū imbecillissi-
mas decūbat: id autem, vt inde rursus ad alias
robustiores decurrat, fieri minime potest. Quo
circa in plenitudine, & vitio humorum $\alpha\alpha\alpha\alpha$
 $\chi\upsilon\mu\lambda\alpha\upsilon$ græci vocant, partes omnium debili-
sima, aliæ quidem phlegmone, aliæ erysipela-
te: aliæ herpete, aliæ alio quodā pathemate cor-
ripiuntur, aliæ verò rheumaticum appellatum
affectum obtinēt, de quo seorsum scripsimus.
Nihil igitur mirum vel cerebrum, vel etiā to-
tum interdum caput, vbi aliquod coacerbauit
excrementum, in aliquam partem imbecillio-
rem expellere, aut aures, aut oculos, aut tem-
pora aut labia, aut dentes, aut buccas, aut pa-
latum, aut gingiuas, & gurgulionem, & ton-
sillas, & quæ illic sunt glandulas: atq; vbi nul-
lum ex ijs fuerit imbecille, in thoracē, pulmo-
nem, fauces, gulam, & ventriculum, fluxio-
nem transmittit. Quemadmodū igitur caput
sepenumero prædictorum cuiq; morbi causa
T est,

DE DIFFEREN. FEBRIVM.
est, ita phlegmones in iecore & liene, vici-
narum aliqua partium, aut etiam per iouem
vna longius sitarum, aut plures, quæ excre-
menta generant augent, transmittunt, &
per circuitum infestant: ac nihil miri est, ijs
aliquod malum accidere, quod est simile ex-
cretionis excrementorum ventriculi, quemad-
modum igitur si quis videret quantum quo-
tidie excernitur, causam verò excretionis
ignoraret, admiraretur. Vtique ordinem ita
qui nescit generationis excrementorum in ca-
pite, atque excretionis causam, & ignorat
quamobrem hæc foras effluant, illa verò in a-
liam quandam partem deffluant, dubitat atq;
miratur influxus proportionem. Pari modo
& qui ignorat quæ partes excrementa,
iecori transmittunt: & ob quam causam
transmittuntur, miratur proportionem ex ie-
core accensarum febrium, atqui nouit decum-
bentem in iecur fluxionem, & q̄ primum de-
derit phlegmones initium, & sequentis acces-
sionis laborantem partē habere causam, mi-
rari desinit.

Facultates naturales esse quatuor, tractricem retentricem, coctricem, & expultricem docuit Gal. tribus libris, quos huic contemplationi dicauit, & ego libri. 2. Contr. proinde hic peti magis debet, quam monstrari. Harum facultatum opera in ventre sunt maximè conspicua, utpote in quo maximè aguntur coctiones, & excretiones. Nihilominus reliquæ etiam omnes particulae expellunt à se inutilia, & coquunt utilia, & tunc inutilium congerunt copiam maiorem, cum minus valentem habent vium coctricem, quia quæ trahunt non coquunt, sed corrumpunt. Membra naturalia, cum natura ducantur, non ratione, haud prospiciunt sibi mutuo, sed singula sibi, quâquam ita naturalia sunt comparata, ut omnia omnibus videantur operari: non tamen faciunt, sed singula sibi. Proinde membrum quoduis expellere conatur à se, etiam si fluxionem in aliud membrum mittat, usque adeo, ut nonnumquam vilia membra quorum læsio animanti minimam noxam infererebat, sua excrementa in princeps aliquod membrum deponant (cum scilicet hoc contingit illis esse debilius) & ita vel ipsam mortem inferat. Ita fortia membra mittunt ad debilia & debilia recipiunt non potètia repercutere. Fit ergo humorum expulsio à membro multa excrementa cogerente, in membrum quod tunc temporis

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

contigit esse debilis expultricis, cum membrū
 expeilens irritatur ab excremento, vel quanti-
 tate grauatū, vel qualitate corrosū. Est e-
 nim illud perpetuum, membra naturalia nū-
 quam expellere nisi quæ in ipsis irritatio fiat,
 saltem in animantium partibus quæ sensu ali-
 quo participant. In plantis enim, & partibus
 quæ omnis sensus expertes esse dicimus (nisi
 quem habent imperfectū sensum vt Galenus
 cum platone putat) non ob irritationem, sed
 ob antipathiam inutilium expulsio fiat, sed
 humanis corporibus nisi in affectibus omni-
 no exiguis nullæ partes sunt quibus non com-
 patiantur aliquæ sentientes. Nam & cum osi-
 bus dolet mox periostum. Nihil mirum est,
 in his excretionibus quæ à membris in mem-
 bra fiunt, ordinem aliquem seruari, quando
 in ventre perinde accidat, quod nō miramur.
 Contingit sanè in excretionibus quæ ex ven-
 tre fiunt quotidie, magna ex parte ordo qui-
 dam. Verum hæc omnia mirari desinamus, si
 quæ partes in quas partes mittere, quas redun-
 dantias possint, & soleāt didicerimus. Fluxio-
 num ergo causas melius fuerit, vt nos breuif-
 sime perstringamus; Galenus siquidem diffu-
 se admodum de his disserit, quare illius verba
 particulatim exponere fuerit tediolum & inu-
 tile. Vt humor aliquis de particula in particu-
 lam

lam veniat, facit, aut expulsio à parte ex qua venit, aut tractio à parte inquam venit, aut simulambo: vel præter hæc, successio eius quod vacuatur. De successione eius quod vacuatur nihil hic dicam, nam neq; id caput exigit. Ut reliquis modis humor de parte in partē fluat, causæ quædam faciunt, quarum nonnullæ, in parte ex qua humor fluit, consistunt, nonnullæ in parte, in quam influit. In illa sunt irritatio, & multitudo humorum, & robur expultricis: in hac, calor, & dolor, & imbecillitas. Fortitudo facultatis & irritatio & dolor, & imbecillitas, faciunt expulsionem: calor tractionem multitudo humorum, nunc facit expulsionē, nunc tractionem. Nam calor tractorius est, quod sequens pars capitis abunde declarabit membra autem fortia ex irritata mittunt in partem debilem, & partes circumiacentes, in partem dolentem. Multitudo verò cum graundo irritat, est causa expulsionis: non irritat, est nihilominus causa tractionis. Nam trahens membrum, eo plus extorquet à membro ex quo fit tractio, quo illud habet plus. Neque verò absurditatis quidquam habet fortitudinem virtutis causam esse morbi alterius membri, ita ut si hoc membrum debilius expultricis esset, illud non agrotaret. Nam ut paulo ante monuimus, nullum membrum

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

præcauet aliorum mala, sed sua. ita tamen dictum intelligatur, robur virtutis esse nonnūquam causam morbi, vt non intelligatur, robur quantumcunque id facere. Ita vt quo robur esset maius, eo id promptius faceret, nam ita robur esset mala causa perse, quod non est. Nam si membri transmittentis vis augetetur fieret expulsio, non in membrū aliud, sed extra corpus, atque expurgaretur membrum illud alijs illæsis.

Duplex verò huiusmodi influxus occasio est, vna quam nunc exponere desij, quando ex alijs partibus in debiliores excrementa trāsmittuntur, altera autem quando attrahūtur, de qua iam differendum, exordio sermonis petito: ab ijs quæ omnibus perspicua sunt: si enim thapsiam illinias cuipiam, videbis breui tempore partem hanc calidiorem esse factā, & in tumorem non exiguum attolli. Sic verò & si partem quampiam iuxta ignem calefeceris, aut vehementer fricueris, vel resina unxeris, aut mediocriter calida pice, & deinde paulo post confertim auellas, aut si etiam cuipiam parti calidum admoneris medicamē

tum: Videbis enim in omnibus ipsam attolli in tumore quia calor ipse vel ad se trahere vel suscipere fluxionem soleat, neq; enim necesse est in præsens talia definire, quū id quod instituto vtile est, etiam sine hac inquisitione iam habemus. Quippe semper in partes vehementius incalcescentes influere videtur, in plethoricis quidem & excrementosis corporibus abunde multum, in ijs autem quæ excrementis vacant, exiguum. Influit verò maxime etiam in eas quæ dolent partes. Sic igitur sæpe cui extrema digiti pars minima acuta, puncta est, statim dolet, & paulo post, omnes quæ circiter sunt partes phlegmone laborant, & in tumorem maximum attolluntur. Quibusdam verò etiam bubones sub alis erumpunt ubi aliquid fluxionis, rara & spongiosa quæ illic sunt corpora, quos adenas nominant, ad miserint: quibusdam autem in medio brachio id fieri conspicitur, quibus scilicet insignis aden ibidē consistit. Evidētissimè verò id quod dicimus videre licet, ubi vlcusculū aliquod parū, phlegmones atq; doloris expers prope

DE DIFFEREN. FEBRIV M.

Vnguem fuerit. Si enim hoc contemnatur, ne
 que coeat, & ad cicatricem ducatur, eo q̄ ad
 nata ipsi caro ab Vngue comprimitur, primū
 quidem dolet, deinde totus digitus, interdū ve
 rò etiam eorum brachiale, aut pes in maximā
 attollitur phlegmonem. Ita igitur dolor attra
 hit in partes, quæ dolore laborant, fluxionem,
 non tamen huius causam hic dicere necesse
 est: alibi enim cōmodius est dicta, nec illius in
 præsentia indigemus, videntur ergo iam cau
 sæ fluxionum, ex ipsis partibus fluxione labo
 rantibus ortæ, esse duplices, vna quidem ex ca
 lore in eis accenso: altera ex dolore qui exci
 tatur. Quod verò aut plus, aut minus, aut me
 lius aut deterius influat, causa nō solū in ipsis
 partibus fluxione laborantibus consistit, sed
 quod melius vel deterius, causa in partibus
 mittentibus est, quod plus minusue in vtrisque;
 calor enim vehemens ac dolor, plus, debilior
 aut, minus attrahit. Sic & corpora excremē
 tis vacua, exiguū quiddam trahētibus mittūt
 excrementossa verò & plenitudine laboran
 tia, tanto plus, quanto ab ipso naturali habitu
 longius recesserunt.

LIBER SECVNDVS. 149

Quinto de simp. med. facul. cap. 16. docet Galenus calorem trahere, & trahentium medicamentorum essentiam in calore, & partiũ tenuitate consistere. Quare rapsiæ aut resinæ, aut picis illitio, & fricatio, partes in tumorem attollunt, potissimum si corpus vniuersum, aut membrũ aliquod redundans succi sit. Caloris propria vis est trahere, non minusquam fundere & extenuare, & agere alia quædam. Quare frustra laborant barbarorum quidã, tractionem à calido, ad tractionem vacui conan-
ter, transferre, quod per se calori inest, per accidens tribuentes. Sed hoc alio loco monstratum est. Ad dolentem particulam fluxio concitatur, quia membra circuniacentia instigata dolore ipso, se comprimunt versus dolentem partem, vt expellant molestiæ causam, & compressione humorem illũ trudent. Docet hæc Galenus 13. meth. cap. 3. Si quid tibi occurrit scrupuli lege caput tertium septimo libro nostrarum controuersiarum. Illud satis constat, ridiculum esse triuiale illũ sermonem, qui circumfertur, membra sana in dolentem partem mittere humores & spūs, vt superias illi ferant. Nã apertè hic sermo membris naturalibus donat prouidentiam.

Hæ igitur fluxionum differentie, siue par-

T 5 tium

DE DIFFEREN. FERRIVM.

tium fluxiones admittētium debilitate fiūt.
Alia verò ob harum debilitatem, ac mittentium excrementa, robur. Omnes enim quæ sine vulnere & collisione partesprehendunt phlegmones, excrementis quibusdam, ex robustioribus in imbecilliores decumbentibus, procreantur. Tales verò phlegmones confestim simul accendunt febres, quando videlicet ob magnitudinē, aut vicinitatē calor ex eis ad cor peruenerit. Putrescunt igitur in omnibus phlegmonibus decumbentia excrementa propter causas prius dictas. Non similiter autem putrescunt omnia, eò quòd quædā sint pituitosa, alia melancholica, nonnulla biliosa. Vbi verò ipsa putruerunt, calor præter naturam in parte phlegmone obfessa accenditur, simul quidem calefaciens quacunque primæ tangunt, phlegmone laborantes partes, deinde illis, continuas, ex quibus rursus alia ratione vicinitatis calefacta, rursusque alia ab illis vsque ad cor interdum deferunt calorem. Quinam verò sit in partibus phlegmone obfessis affectus in libro de inaequali intemperie dictum est, & item in libro de tumoribus

bus præter naturam. Quod vero necesse sit contentum in ipsis sanguinem sæpe numero putrescere, simul cum ijs quæ influxerunt, in hoc dicetur.

Dictum iam antea est, fortia membratransmittere sua excrementa in debilia. In phlegmone cur putrescant humores dictum est in nono capite, quod hoc antecessit. Affecta particula quapiam inflammatione hominem corripit febre, dictum est capite sexto, libri primi huius operis. Quando ea febris quæ ex inflammatione pendet, sit diaria, & quando putrida, dictum in 7. cap. primi. Nihil ergo hic est, noua enarratione indigens.

Quod vero ab vna parte in aliam decubuit excrementum, interdum adeò multum, prauumque est, vt partis fluxione laborantis facultatem lædat: interdum adeò mite & exiguum, vt suscipiens corpus nihil offendant. Porro si facultatē adeò læserit vt exoluatur, neque iā euincat, ea quæ prius vincebat, tūc sanguinē iā putrescere duplici ratione est necesse, & quia humor minimē euictus à proprio calore, reliquam habet in putredinē mutationē, & quia cum excrementis putrescentibus simul putres-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

putrescit. Sin nō tantū lēdat facultatē, Vt exoluta penitus quiescat, semiprauus, & tanquam semiputridus in tali cōstitutione sanguis efficitur, vicinitate quidem putrescentiū excrementorum simul putrescens, persistens tamen in sua ipsius natura, quantum in ratione facultatis ipsum gubernantis consistit. Vt cumque verò se res habet, in prima putredine calor accensus, est omnino acrior & mordacior eo qui est secūdum naturam, eatenus verò crescit, quandiu excrementorum natura sufficit. Hæc enim ad calorem qui ex ipsis accenditur, similem quandam rationem habet, qualem ligna ad ignem. Ex ipsis namque lignis, dum alterantur generatur ignis. Non tamen in infinitum tempus ad alterationem sufficiunt, sed finis alterationis ipsis est, humoris innati consumptio, quum eo vsque cremari possint, donec aliquid innati humoris habuerint, eo autem consumpto, cremari desinunt, ac reliquæ eorum cinis nominatur. Quin etiam putrescentium humorum calor similiter permanet, dum omnino fuerint assati. Consentaneum verò est reliquias humorū

terre-

terrestres exiguas esse, non quemadmodum lignorum plurimas, propterea quod in substantia eorum humidum non siccum elementum præualet. Ita verò si externorum humorum quempiam coquere volueris, velut oleum aut vinum, quam minimum terrestre eius relinques, reliquum autem omne extenuatum, in vaporem & aërem abibit. Proinde tota substantia feruefactorum in putredine humorum, à calore extenuatorum, in vigore atque inclinatione febrium dispergitur: excrementum verò omnino exiguum, vel nullū remanet, in crassioribus quidem humoribus exiguum, in senioribus autem nullum. Quod si nullam debilitatem partis phlegmone laborantis facultas contraxerit, neque rursus excrementa mittātur, & morbus desit, & post hac aut iterum febricitauerit homo, neque sequenti die neque tertio neque quarto. Quod si ob eandē causam, ob quā ab initio parti transmissa sunt excrementa mittantur, aut si hac quidem non amplius mittātur, sed permaneat facultatis imbecillitas, denuo febricitare hominem necesse est. Subijciatur enim primo facultas

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

tas partis robusta, tempore verò interueniente eisdem in partibus quæ prius transmisserrunt, acervata esse excrementa, & qualitate & quantitate ijs qui initio transmisserrant paria. Hoc verò accidit ijs, quibus affectus mittentium idè, & attracti ad ipsas alimentum quantitas & qualitas eadem permanet. Necesse enim est, ut arbitror, æquale ac simile quod ab eadem alteratur facultate, æqualia & similia facere excrementa. Quin etiam coacervationis eorum tempus, necessario æquale erit. Partes enim quæ aluntur, quo ad similem habuerint constitutionem, ab eodem nutrita alimento, æqualia quantitate, & similia qualitate, atq; eodè tempore excrementa coacervabunt. Quin etiam in eodem circuitu incitabuntur, ad expellenda ea, atque mittenda ad imbecilliores. Si quidem tunc primùm facultas excretrix, ad suam functionem excitatur, ubi vel multitudine excrementorum grauatur, vel qualitate molestatur.

Haftenus dixit causas fluxionum, eas scilicet quibus contingit humorem in partem aliquam

quam incumbere, modo ad causas febrü paroxysmorū accedit propius, dicens excrementum quod in partem aliquam incubuit, in illa corruptiones humorum efficere dupliciter, aut sola permissione, quia scilicet humores particulæ, excrementis venientibus admixti cōputrescūt, aut etiā debilitata facultate coctrice mēbri recipientis: tunc enim non ex dicta causa modo, putrescunt in ea humores, sed etiam quia à debilitata facultate non vincūtur. Vtunque fiat vt humores in illa incipiunt putrescere, ita putredinalis calor & febris incipit crescere, duratque tantum, quantum ipsa excrementa non dissipata, aut cremata integre, nō aliter quàm ignis qui inflammatis lignis succensus est, non antè cessat, quàm ligna in cineres redacta sunt. Hoc enim etiam contingit in putrescentibus humoribus, scilicet vt ex lignis cinis superest, ita ex consumptis putredine humoribus, quamquā tenuior multò, quanto humores liguis tenuiores sunt, atque ita ex ipsis humoribus, nō eadē semper restāt reliquiæ, sed ex crassioribus, quales pituita & melācholia, crassiores, ex tenuiorib⁹, quales flauæ bilis spēs quædā, tenuiores, ex tenuissimis & serosis, quales quiccores appellantur aut sanies, omnino nullæ. Sunt enim hi humores omnino similes aquæ in modo

DE DIFFEREN. FEBRIVM. 2
do substantiæ. Quare ex hac feruore cōsum-
pta, nihil videmus superesse, ita in illis accide-
re coniectandum est. Ergo primo facta febris
tunc cessat, cum illa prior humorum putres-
centium portio consumpta est. Quare si nihil
noxæ manet in recipiente particula, neque
quidquam amplius mittitur, nulla amplius fe-
bris superueniet, si verò eadē manet in mem-
bris recipientibus dispositio ad recipiendum,
& in mittente ad congerendum, constat trans-
acto aliquo interuallo, eo scilicet quo, suffi-
iciens irritare humoris quantitas, cōgeretur,
fiet noua fluxio, & noua putredo, & altera fe-
bris, & rursum perseuerantibus eisdem cau-
sis, fiet tertia, quæ cum ex eisdem causis, & eo-
dem modo habentibus, fiat (nisi quid ægrotus
in victu erret) necessariò æqualis erit secundæ,
& in eodē reperet tēpore. Itaq; dicta iam est
causa, cur febres aliquæ intermittentes sint, &
cur plerunque æquales, & æqualibus tempori-
bus succedant sequentes antecedentibus.

*De iſſce Verò omnibus, in commētarijs de
facultatibus naturalibus definitum est, in qui-
bus exercitatum eſſe oportet, eū qui quæ nūc
dicuntur, cum demonstratione addiſcere vo-
luerit,*

uerit, magnis quidem alijs præmijs, ex tali cō-
templatione, ad curandi rationem ipsi propo-
sitis. Nam vt omnia alia omittam, quæ in eo
libro sum dicturus, vnius tantummodo men-
tionem faciam, quod maximè in promptu est,
& sepe numero à me factum, lippitudinis sci-
licet per circuitum accessionem habentis. Exi-
stimo enim non parum incitamentum fore le-
ctori, ad eam quam nunc tradimus addiscen-
dam contemplationē. Nos enim contra quam
ij qui se nominant oculares, huiusmodi lippi-
tudines semper curauimus. Quū enim illi sem-
per oculis negocium facefferēt, nos interdum
balneo, nonnunquam meri potione, vt inquit
Hippocrates, aliquādo sanguinis missione, in-
terdum vtrisque, vel clystere cum sanguinis
missione, vti sumus. Atque accidit vt inter-
dum ijs adhibitis, statim desierit, quandoque
etiā vbi capiti fuisset prospectum. Oēs enim
qui ita curati sunt, aut nullā omnino amplius
accessionē habuerūt, aut semel saltē, sed mul-
to minore quā antea. Sed de curatorijs quidē
discretionibus, ac inditijs, nunc dicere, tem-
pestiuum non est.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Galenushic dicit tractationem de facultatibus naturalibus, ad præsentem tractationē necessariam esse, & interim dicit ad curationem plurimum conferre, quod vt ab exemplo monstret, tantilū digressus, curationis ophthalmiæ circuitus habentis, inētionem facit. Hæc scilicet vt habet 31. aphorismo. 6. sectionis soluitur venę sectione, aut medicamēto, aut fomēto, aut balneo, aut vini potu. Non tñ his indistinctè vtendum est, sed est singulis auxilijs sua opportunitas, quam qui facultatū naturalium munera ignoraret, haud posset obseruare, neque causam qua illa prosunt scire. Nam fomentum, & balneum, & vini potio, conferunt cum plenum nō est corpus: fomentū, scilicet, cum nihil iam influit aliunde in oculos. Et is qui illic est humor non est valde crassus (nam si talis est cōfert in ea occasione vini potio) balneū cum modicum iam influit, idque mordax, corpore nō pleno: si enim plenum est, mittendus est sanguis, aut expurgandum. Sed qua hæc ratioe? qua alia? quā quod plena & fortia, mittunt in membra, debilia, & dolentia? & calida trahunt, præcipuè ex plenis corporibus? quæ ratio in facultatum naturalium notitia, tota sita est?

Quod verò accidat interdū totū caput, vel nihil perpeßum, sed sanguine prauo atque excrementoso

crementoso nutritū, plura coacervare excre-
mēta, & magis prava quā antea, ita vt natu-
rales effluxus, ac perspiratus eis nequaquā suf-
ficiāt: sed natura cogatur excrementū ad im-
becillio rem aliquam partem propellere: aut si
humores secundum naturā se habeant, ipsum
autem caput laboret, aut etiam ambo concur-
rant, coacervari excremēta, & in aliquā dea-
cumbere partem, præsens sermo demonstrare
studet. Etenim quoad influens humor similis
fuerit, & capitis affectus idem, eo vsq; excre-
ta æquali coacervabuntur tempore similia &
æqualia, & oculorū accessiones similes fient.
Eodem modo si non totius capitis, sed alicu-
ius in eo partis, scilicet mēbranarū, vel cere-
bri affectus fuerit, ita vt ex tali alimento, tale
aliquid, tantūque acervet, tāto tēpore excre-
mētum: deinde expellat excrementū id quā pri-
mū, vbi ab eo insigniter molestatur, accidet
& tunc per circuitū infestari, vel oculos, vel
aures, vel aliquid aliud tale, in q̄ debilius expul-
sū fuerit, id quod redūdat. Quod si igitur in o-
culis auribus, alijsque multis partibus talibus,
manifestè videtur accessio per circuitū fieri

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

Ut ostēſū eſt, quid mirū in pleuritide, perineu-
monia, phrenitide, & omnibus alijs, quorū nō
licet intueri phlegmonas, ſimiliter influere ex-
crementū, eodemque modo febrem accende-
re? quum tamen pars phlegmone obſeſſa, nul-
lo alio proprio affectu laboret, ex quo pradi-
cta generari queant, quā quod ijs quæ eo
tempore excrementa mittūt, imbecillior eſt?

TRanſacta digreſſione redit ad inſtitutum,
dicens quibus ex cauſis contingat mem-
brum aliquod congerere multa excrementa:
hincque ruruſus colligit periodorum cauſas: v-
titur verò capitis exemplo, quamquam eadē
eſt aliorum ratio. Caput, aut quia alteratricē
facultatem in ſe ipſo habet debilem, aut quia
recipit aſſiduē ex toto corpore vapores, aut
cauſa vtriuſque, ſolet congerere tā multa ex-
crementa, vtiā non ſint illi ſatis ad vacua-
tionem naturales viæ, naſus ſcilicet, & au-
res, & palatum. Tunc conſentaneum eſt (im-
mo ita conſpicimus) mittere id quod redun-
dat in partem aliquam debilem, vt in oculos,
aut aures: accidit etiā emiſſa humoris quadā
portione aliam colligi idque eodem tempore
quo priorem: quare & oculorum, auriumve
mala, per circuitus exaceruabūtur, neque ſolū

id

id in oculis & auribus, sed & in delites centibus partibus vt pleuritide, & pulmone, eadē de causa, verisimile est accidere.

Neque etiam illud mirum est, quod non vno statō tempore omnia coaceruentur excrementa, quia enim sanguis qui pro alimento deferitur, non semper similis est, neque affectus partium quæ aluntur idem, idcirco aliud aliq tempus ad tanti excrementi coacervationem sufficit, à quo primum quidem natura partis molestatur, cogiturque veluti alienum à se, id quod molest at, propulsare.

Dicta est causa, qua non oportet mirari, scilicet quod eadem sit congerentis membri debilitas, aut humorum malitia. Ratio verò hæc nihil habet perpetuum, sed contingens, quare contrarium quoque potest accidere, vt scilicet febris sequens non repetat æquali tempore quo præcedens, sed aut anticipet aut cunctetur. Nimirum causæ omnes repetitionis possunt vno die permutari. Alimentum quod ad membrum venit, potest esse deterius aut melius, plus aut minus, pars quoque ipsa quæ alitur, potest etiā esse aliter affecta, plus minusve dolens, calidior aut frigidior,

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

gidior, fortior, aut debilior.

Neque sanè quod ipsarum accessionū lōgi-
tudo inæqualis sit, mirari oportet. Quū enim
neq; species, neq; multitudo excrementorum
vna, neq; similiter accēdi omnibus, aut discu-
ti cōuenit. Nam plura quidem, & frigidiora,
& lenta, & crassa, longiores efficiunt acces-
siones: Pauciora vcrò & calidiora, & tenuio-
ra, breuiores ad hæc non parū conducente to-
tius corporis constitutione, eo tempore, & fa-
cultatis robore. Rarius namque corpus, quan-
tum in se est, breuiores efficit accessiones, den-
sius autem lōgiores. Et robur quidem faculta-
tis, breuiores, imbecillitas autem multo longio-
res, facultas enim valida promptius à se expel-
lit id quod est alienum: corporis autem rari-
tas, id quod effertur haud retinet. Quapropter
ita affectis, celeriter vacuari id quod redun-
dat, est necesse, si etiam alia similia sint. Pari-
ratione quibus è contrario corpus efficitur, ijs
tardius excerni excrementa est necesse, facul-
tate excremēta debiliter expellēte: angustia
verò meatuū, ea quæ efferūtur detinente, om-
nibus autē simul cōcurrētibus, aut longissima
ut breuissima accessio fit. Lōgissima quidē

ob crassitudinem, & multitudinē excrementi & facultatis imbecillitatem, meatuumque angustiam: breuissima verò propter tenuitatem, & paucitatem excrementi, & facultatis robur, ac viarum amplitudinem.

Dicta etiam paulo antè est causa, qua contingit paroxysmos æquales fieri, sequentes prioribus. Verùm neque illa habet perpetuitatem, sed contingentiam, fieri enim etiam potest ut inæquales fiant, minores inquam. Causæ huius eadem sunt, quas dixit tertio capite huius ipsius libri.

Eadem ratione neque quā ob causam nonnullæ quidem accessiones, ad integritatē desinunt, aliqua verò non, difficile est inuenire, Quando enim prioris accessionis tempus adeò breue fuerit, ut priusquam secunda incipiat, iam desierit, totum intervallum quod inter principium secundæ, & prioris finem existit, febre vacat. Si verò secunda priusquam omnino prior desinat, inuaserit, nullum inter has medium relinquitur intervallum. Hoc igitur, ut diximus, est facultatis, in parte excrementa recipientis, existentis, sui similis manentis, hoc est,

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

adhuc, ut antea quoque, sanguinem, qui in ipsa continetur vincentis. Si verò aliquando imbecilla efficiatur, idque ei causa sit, ut non solum excrementa, sed ipse etiā sanguis, corrumpatur, ac putrescat, & febris accendatur, alterum inde quoque quoddam initium, quæ per circuitus fiunt, accessionum, orietur. Si igitur prædictus adhuc seruetur calor, duplex febriū inter se implexarū species erit. Quod si verò ille desinat, recipietis autem fluxionē affectus permaneat, quæ de mittente dicta sunt prius, etiam de hac intelliges. Nam & hæc ipsa pars, quædam in se excrementa efficiet duplici ratione, quemadmodum etiam illa, & quia cōtentus in ea sanguis est prauus, & quia facultas imbecilla est. Similiter si ex aliqua quavis causa, facultas partis interdum adeò debilis sit reddita, ut proximus sanguis illi potius sit onus quàm alimentum, corrumpetur, et si calidus fuerit, facile putrescet: si subfrigidus ac pituitosus, non statim quidem, sed progressu temporis, is quoque eundem acquirere affectum: quin etiā ubi quælibet pars nequeat concoquere in se genita excrementa,

ta, aut ad aliam propulsare, tale sibi ipsi initium febricitandi, quale ea quæ transmittit alteri, efficiet. Cur verò alteri excrementa trāsmittere nequeat, prima quidem causa in mittentis & suscipientis facultate est, altera verò in viarum obstructione, quæ ex lentis, crassis, & multis humoribus, fieri solet. Nihil igitur miri est, si etiam absque eo quod altera alteri mitat excrementum, quemadmodum caput mittebat oculis, ex ijs quæ in ipsa adhuc manent excrementis, in eundem ad quem ea quæ aliena suscipit, peruenerit affectum. Quæ enim naturales effluxus obstruxerunt ea quoque processu temporis putrescere necesse est, & causam fieri ob quam multitudo excrementorum in parte coaceruetur, quæ ipsam vacuari, ac vt solita erat diffolari, vetent. Putrescunt igitur similiter illis, ea quoque, quæ postea coaceruantur, & omnia simul statim in parte febrilem calorem accendunt. Antea verò demonstratum est, vbi calor quispiam accenditur, vel etiam augetur, in eam partem ex alijs sanguinem influere. Igitur necesse est, vt tempore quo influit, partes illæ sanguine destitu-

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

ta refrigerentur, pars autem laborans graue-
tur ac distendatur, & qui influxit sanguis al-
teretur, duabus de causis, & quia putrescen-
tibus iam excrementis permiscetur, & quia
impactus minimè diffatur. quocirca instar
humidorum lignorum confertim in exiguam
flāmam coniectorū accenduntur, atq; id om-
ne tēpus principium accessionis appellatur. Vbi
Verò calor superat materiam, tale tēpus incre-
mentū & ascensus vocatur. Eo autem tēpore
calor multitudine ita augetur, vt non solum
deurat locum, qui est putredinis veluti focus,
sed etiā cōtinuitate per vniuersum disperga-
tur, corpus: & Vbi ad summum feruorem, qui
accenduntur humores peruenerint, talis acce-
sionis pars, vigor nominatur, vniuersum autē
laborantis corpus tunc ignitum esse videtur,
calore in totum animalis corpus equaliter ex-
tenso: deinde Verò, si quidem humores tennes
fuerint, & facultas valida, corpusque rarum,
plurima feruefactorum humorum pars in su-
dorem fusa vacuatur. Si Verò illi crassi fue-
rint, facultas autem expultrix imbecilla, &
via angustæ, nihil quidem sensibile effluit,
sed

sed id solum quod ita extenuatum est, vt in tenui iam halitus degenerauerit naturam. Nuncupatur Verò id tempus inclinatio quædam feruentium humorum, perspiratio existēs. Sed vbi in parte affectus remanet, necesse est alterum in ipsa procreari excrementum quum id quod rursus in eam trahitur alimentum non totum exquisitè vincatur, quod rursus vt antea dictum est, ab excrementis putridis in parte relictis, & à propria prauitate initium putrefactionis accipit, & vbi admodum incaluerit, rursus in ipsam influit, quemadmodum prius dictum est ex alijs animalis partibus sanguis, ac rursus eodem modo, principium, incrementum, rigor, & inclinatio accessionis fit. atque hoc per circuitum fieri haud desinit, donec affectus in parte primum gignente excrementa, seruatur, est autem duplex eiusmodi affectus, alter quidem partis imbecillitas, in qua gignuntur excrementa, alter Verò ex ipsis, quæ quotidie, generantur, coaceruatus. Nō enim existimes, in externis vasis, in quibus elixatum cibarium nidorosum est factum, quendam relinqui affectum, in partibus autē in quibus

DE DIFFEREN.FEBRIVM.

quibus humores putrescunt nullum. Tunc verò eum affectum solui magis est impossibile, quando vniuersum corpus vitiosis humoribus refertum, aut etiam plethoricum fuerit, ac multo magis si in ijs omnium meatuum excrementa educentium: angustia fuerit, quem admodum vtrique & sanatio subsequeretur, si etiam meatus expurgaretur, vt pars fluxilis esset, & facultas robusta foret, & affectus emendatus, atque vniuersum corpus nec vitiosis humoribus refertum, nec plethoricū. Donec autem hæc permanent, circuitum quoque accessionem permanere est necesse. Sic itaque in mulieribus etiam accidit. In his enim quoad æqualis & similis mēstruorum causa permanet: idem etiam ipsorum circuitus seruatur. De his verò omnibus in libro de rheumaticis affectibus plenius differitur neque nunc in confirmandis ijs, quæ antea demonstrata sunt, inmorari consentaneum, nec rerum in præsens vtilium capita præterire. Maxime autem vtile est, inter hæc cognoscere, quòd aliqua partes aliis fluxiones transmittunt, quemadmodum caput oculis: quædam

verò

Vorò ab excrementis in se genitis, febris initium accipiunt, & quod ijs omnibus commune excrementorum putredo est. Propriū autem huic quidem obstructio & infarctus vasorum, propter scilicet humores lentos, aut crassos, aut multos. Alteri verò angustia meatuum, vel sensibilium, vel insensibilium: alteri autem cuidam, quòd vacua quæ sint in toto corpore spatia, oppleta sint, & præterea plenitudo ad vires adsit, quemadmodum in libro de plenitudine monstratum est.

QUod in primis verbis præscriptæ dictionis dicitur satis est manifestum, nempe accessiones aliquas nunquam venire ad integritatem, eo quòd antequam prior finiat, alia succedat: quæ febres anticipantes à quibusdam aut subintrantes appellantur, harum causa, nulla alia quàm causa earum quæ oblongitudinē octauo capite appellatæ sunt à Galeno productæ: quarum causa illic est dicta. Animaduertendum verò hic est, quod ab eo dicitur posse fieri febrē cū periodis particula aliqua congerente multa excrementa etiam si ea in aliam partem nō remittat, ut si in viscere aliquo, excrementa quæ ex hodierno alimen

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

alimento collecta sunt, incipiant, putrescere, incipiet calor putredinalis in illo fieri, quo ex coporis habitu trahente humores, non aliter ac inflammatio solet ad se sanguinem allicere, fiet externorum refrigeratio, vsque dū crescente putredine calor prodeat, & ea plurimū aucta, febris fiat vigor, & deinde consumptis putrefactione excrementis deferbeat, atque ita omnia particularia tempora percurrat: itaque nihil est intellectu difficile, accessionem febris fieri excrementis in particula collectis. Quare si ab his excrementis quæ in ipsa particula generantur vna, ab ijs quæ influunt altera accessio fiat, erit ita duplex febris. Liber de rheumaticis affectibus quem Galen. citat iniuria temporis perijt cum multis aliis. Sed illud à me in præsentia dicendum, erit in febris his, accessiones habentibus, semper esse motionem humoris de parte in partem. Nā cum omnino quieti putrescunt humores, continentes febres fiunt. Itaque semper est pars ex qua humores veniunt, & pars in quam veniunt, quamquam vt modo diximus, fieri potest vt in parte ex qua humores veniunt, nullū sit vitium, sed pars colligens excrementa, & non remittens in aliam, ipsa sibi principium præstet alliciendæ ad se fluxionis. Tamen plerunque pars transmittēs collegit multa excrementa

menta ob dictas antea causas, & recipiens est debilis, non valens ex se illa trudere. Hæ verò partes nonnūquam sunt peculiare, vt cum hepar collegit multa & mittit in ventrem, aut in pulmonem: nonnunquā verò nō sunt peculiare, sed totum venosum genus colligit multa excrementa, & ex certis interuallis extra se in musculos & carnes reijcit: nonnūquā pars mittens est peculiaris quedam, recipiens verò non est talis: vt cum ventriculis colligit multos succos, quos ex certis interuallis in totum corporis habitum diffundit: nonnūquam potest contraheri, vt ex toto corporis habitu in peculiare aliquod membrum fluxio incumbat neque verò id in febribus solum ita accidit, sed in aliis affectibus rheumaticis multo clarius, fit epylepsia toto corpore mittente in cerebrum, aut ventriculo solo mittente in cerebrum, aut etiam digito pedis mittente auram in caput, quod Galenus ipse se vidisse narrat 3. de locis aff. accidit nonnūquam in febribus quæ per accessiones fiunt, alias venas in alias mittere, nullo humore prodeūte extra venas, & hæ quidem sunt continuæ cum accessionibus. Animaduertendum rursus hic censeo, quod. 1. de arte curatiua ad gl. capit. 3. dicitur membra quædam in quibusdam febribus solere insigniter laborare, vt ventriculum in quotidiana

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

tidiana, hepar in tertiana, lienem in quartana
Nam quamquam nullum horum sit perpetuum, est tamen quod magna ex parte accidit
proindeque in his febribus, horum membrorum firmitudinis ratio est habenda. Iuuabitur enim quamplurimum medicus ad curationem, si membrum congerens excrementa in febribus inuenerit, cognoscitur verò illud haud difficulter, ex doloribus, qui potissimū in initio accessionum fiant, vt cuidam quotidianae febre laboranti ex dolore vehementi crurum incipiebat accessio, qui crescente febre soluebatur. Vnde coniectabam membra congerentia excrementa, & febrium materiā suppeditantia, esse crura. Neque vero id erat mirum, cum in puero illo epyleptico solus pedis diggitus primaria affectione laboraret.

Februm igitur per circuitum accessionem habentium, haud scio an vlla generationis causa sit omissa. Earum autem quæ ordine carēt nonnullæ ex humori transmutatione, nonnullæ ob victus rationis errorem, ad talem constitutionem deueniunt. Maxime igitur mutatur sanguis putrescens. Nam vt antea dictum est: partim quidem flava bilis efficitur, partim

partim Verò nigra. Quantum Verò humores in corpore agrotantium mutantur, tantum etiam accessionum circuitus. Quocirca nihil mirum si in huiusmodi mutationibus, ordo quoque mutatur. Mutantur verò maxime, Vbi id q̄ incœpit putrescere in aliqua parte aliud existit, aliud autē ex alijs influit, quod vel in illis solis tale existit, aut in toto corpore redundat, similiter quaecumque agri in Viētus ratione delinquunt, hæc quoque nihilo minus circuitum ordinem corrumpunt. Ut enim in sanis prauus Viētus morborum causa est, eodem, arbitror, modo vel etiam magis in agrotantibus ex ijs quæ deliquerint accessiones incidunt. Non solum autem agrotantes, sed etiam tempore quo à morbo conualescunt, promptè ex quouis delicto læduntur. Igitur per quacumque insignem lesionem, vel anticipare multum circuitiones cogunt, vel alterius generis à prioribus quasdam gignunt, à quibus accessionem ordo corrumpitur. Sæpenumero autem ob circuituum complicationem medicis ignoratam, ægroti visi sunt sine ordine habere accessio-

X nes.

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

nes. Sed tales quidem circuitus inordinati re vera non sunt, sed tantummodo videntur, quicumque autem re vera sunt, aut ob permutationem humorum febrem effitientium aut propter errorem in victus ratione, accidunt.

HActenus reddita est causa febrium, ordinem quendam seruantium in paroxysmis, modò causam reddit, qua contingit nonnullas omni ordine carere, quæ proinde erraticæ appellantur. Ea verò est duplex, humoris in multiplices formas transmutatio, ita vt nullam multo tempore retineat, & febriçantium errata. Scilicet fieri potest, vt febris quæ non ante tertium diem erat inuasura, secundo die inuadat, causa erroris, facta scilicet ab errore erratica: Prima causa satis docet, tunc temporis. Maximè febres erraticas venturas, cum is humor putrescet, qui maximè in multiplices formas mutari possit: huiusmodi verò constat esse inter omnes sanguinem, cum huius tenuis pars transeat in bilem, & crassa in melancholiam. Ergo quod ad humores attinet, tunc maximè fient febres erraticæ, cum in parte quapiam peculiari sanguis putruerit, atque multo magis, cum

cum non exquisitus sanguis, sed omnes humores simul: tunc enim sine ordine, prout nunc putredo casu in humorem hunc magis incubuerit, hic paroxismus fiet, deinde ille, prout in illum, postea alius, prout in alium. Dixi verò cum in parte quapiam peculiari putruerit, quia cum in venis omnibus sit hæc putredo, continentes proueniunt febres, vt antea diximus. Eadem hac erraticarum febrium causa, de qua modo loquimur, verum est quod ab Hippocrate dicitur tertio aphorism. quod ad tempora attinet, autumno febres quartanas, & erraticas, maximè fieri: quartanas, quia melancholia abundat, (causa non est huius loci) erraticas, quia tempus maximè multiplex, & inæquali temperamento, multiplices merito, facit humorum permutationes, quamquam alia quoq; causa fiunt erraticæ febres in autumno, quam Galen. reddit. 3 prognost. commen. 29. quia scilicet eo tempore biliosiores succi, qui ex æstate superfuerunt, in atram bilem migrant, ideoque humorum durante permutatione, atrabilis in alio membro ferbet, in alio minus, in alio mouetur, in alio non, fiuntque ita febres erraticæ, vsq; dum facta integrè permutatione, vnicus toto corpore affectus sit, melancholicus inquam tuncque firmatur morbus in quartanam febrem

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

bre. Ex his satis liquet, falso Fuchium dicere, atram bilem inter omnes humores maximè facere erraticas febres. Galen. siquidem non dixit, vt ille intelligit, atræ bili illud esse natura insitum, moueri in vno membro & in alio quiescere, in vno ferbere, in alio non; sed dixit hoc per tempus illud accidere, dum permutatio fit. Nam cum iam migravit humor in atram bilem, minimè omnium potest erraticas febres efficere, quia vt alio loco diximus, solus hic humor non potest, vstione, aut putrefactione aut alteratione, in aliud humoris genus transferri, quare necessario perseverat in sua natura bilis atræ, ex secunda causa satis aperte colligitur (vt modo vltimæ quæstioni, earum quas in principio huius capituli proposui respondeam) febrem pituitosam repetere per singulos dies, & biliosam per tertios, & melancholicam per quartos, non causa proprietatis occultæ, sed causa proportionis causarum efficientium ad materiam, & causa quantitatis & qualitatis humoris. Nam error quicumque potest permutare diem paroxysmi, tamen error non potest permutare humoris proprietatem, quamquam quantitatem & qualitatem permutet. Quare illud quoque manifestum est, nihil valere argumentum Dioclis aduersum Hippocratem.

cratem, cuius mentionem facit Galen. primo epidem. part. 3. ad confirmandum nullas esse quintanas, neque septimanas, neque nonanas febres. Inquit enim cum tres tantum humores sint, ex quibus intermittentes febres fiant, tres tantum fore illarum periodos. Verum cum non pendeat periodus ex proprietate, sed ex quantitate ac qualitate humoris imbecilla ratio est, nihil enim prohibet ex eodem humore, minori tantum quantitate, longiorem fieri periodum. Quare consentaneè loquitur Auicena quisebres illas omnes ex melancholicis succis fieri, suspicatus est, sed cum non multa illorum est copia, has enim febres quas Hippocrates vidit, Galenus negavit non quidem fieri posse, sed vidisse se, ego non dubito posse contingere, quippe qui vidi iam bis. Sed de hac re latius scripsi libro quinto Controuersia. sed modo quæ desunt apponamus. Nihil mirum est, medicum in primis diebus haud posse discernere febres compositas ab erraticis, verum expectans tempus vnius hebdomadæ, attendensque febrium ipsarum formam, & responsum, non possit falli, nisi inexercitatus valde sit: nam videbit aperte in erraticis nullum esse typum, in compositis verò esse typum compositum. Ut si quis corripiatur primo die febre, & secundo

DE DIFFEREN. FEBRIVM.

do altera, & tertio alia, & quarto nulla, non-
dū constat an febris erret: sed si post hæc quin-
to die fiunt duæ accessiones, & sexto nulla, &
septimo vna, & octauo alia, iam constat com-
positam esse tertianam cum quartana, atque
adeo febrem primi diei fuisse tertianam,
cui respondit alia in tertio: & febrem se-
cundi fuisse quartanam: quantum habuif-
se duas, aliam respondentem tertianæ tertij
aliam quartanæ secundi. Sed hæc ex tractatio-
ne de typis erunt manifesta: modo illud vnū
dico, distingui compositas ab erraticis per ty-
pum multarum accessionum formā enim sin-
gularum febriū non sufficiet considerare. Nā
vt in compositis sunt diuersæ formæ, ita & in
erraticis, quæ ex humorū mutatione induunt
varias species.


*Reliquum verò febrivm continentium ge-
nus, quarum vniuersum tempus vna accessio
est, aut semper equalis, aut decrescens, aut in-
crescens vsque ad indicationem ex tali causa
fieri solet, quidem omnium febrivm Praxago-
ras statuit, humorum in cava vena putredine
esse existimans. Sed absolutior & verior ser-
mo hoc quidem modo euaderet, Quicumque
morbi*

morbi per circuitus obtinent accessiones, partium succedunt affectibus, vel mittentium, vel suscipientium, vel trahentium excrementa, eo quo paulo ante diximus modo: qui vera sine circuitibus in ijs nullus locus peculiaris laborat, sed omnes qui in venis & arterijs continentur, potissimum qui in maximis & calidissimis sunt, aut propter aliam quãdam causam vt in diarijs, aut etiam ob putredinẽ ferbefaeti, accendunt febrem vnam, continentẽ appellatam, ab initio ad finem vsque minimẽ intermittentem, eatenusque duratẽ, ac deurentem hominem, quoad ipsam gignentes humores consumpti fuerint, aut cocti, aut vtrũque passi.

Modo reddit causam, eius quod in primis verbis capitis huius proposuit, & hucusque dicere distulit, cur scilicet febres aliquæ continentes sint. Est verò in superioribus declarata satis præscripta hic dictio. Hic appellat febrem diariam, continentem sine putredine.

FINIS.

X 4



INDEX EO-

rum, quæ in hoc opere continen-
tur primus numerus indicat
foliū secundus faciem.

A.

Archigenes non est locutus de semitertia
na vt Hipp. folio. 135. pag. 2.

Auicena amethodus est in restigendis pi-
tuitæ speciebus. 121. pa. 1.

Accidenti quotalc nihil magis intimum quā
in esse. 21. pa. 1.

Angustie viarum duo modi. 31. pa. 2.

Aer cur possit tantorum malorum esse causa.
34. pa. 2.

Animaduersio infusi translationi. 52. pa. 2.

Ab initio prehendere quid sit apud Galenum
disputatur. 56. pag. 2.

Arteriæ post balneum in heticis aliis partibus
sunt calidiores. 47. pa. 1.

B.

Bilis ex sanguine mitior aliis speciebus.
138. pa. 1.

Bubones parere possunt diarias & putri-
das. 46. pa. 1.

Bilis

INDEX.

Bilis flaua vſtione facit febrem. 115.pa.1

C.

C Aloris differentia ex tribus. 7.pa.1

Caleſcere & caluiſſe vt differant. 13.pa.1

Contagioſi morbi qui ſint. 19.pa.2

Cauſas procatarticas negantiu eſſe morbiſicas
error vbi, & conuictus. 39.pa.1.

Cauſa procatartica vt poſſent conferre adcu
rationem diſputatur. 22.pa.2

Caloris cauſarum quinque genera. 26.pa.2

Cutis conſtrictio vt ſit febris cauſa. 28.pa.1

Cibi prauſ ſucci qui ſint. 28.pag.2.

Coctio in prima vrina apparens proprium &
inſeparabile diari. 51.pa.2.

Continuarum quadruplex poſſe fieri genus.

103.pa.2.

Cauſus quid ſit. 101.pa.2.

Calorem & frigus ſimul in eadē exquisita par
ricula ſentiri eſt impoſibile. 117.pag.2

Calor vt trahat. 149.pa.1

D

D Eliramenta ferina ab atra bile ſiunt ple-
runque ſine febre. 115.pa.1.

Diuidere genus improprias differentias diſi-
cile. 4.pa.1

Diuiſio febrium trimembris non eſt vere ex
materia. 14.pa.1

Dolor vt continet fluxionem. 149.pa.1

INDEX:

Duritiei quinque causæ. 67.pa.1.

E.

E Pialæ duæ etimologia. 116.pa.2.

Error sine magna causa vtentium multis
medicamentis. 28.pa.2.

ἐπίδροσις seu inuasio seu accessio quid sit.

60.pa.2.

Epiala & rigor sine febre ex eadem materia.

119.pa.2.

ἐπισήμασι seu annotacio quid sit. 60.pa.2

Exantemata quæ dicantur, 29.pa.1.

Equalitas collectiua pulsus & caloris & vtriusque
liber accensus inseparabilis à diaria nō
propie. 52.pa.1

Ex mitiori materia cæteris paribus humor gi-
gnitur. 140.pa.2

Expiruitosa febre & biliosa quatuor continua-
tiones fieri possunt. 129.pa.1

Exquisita semitertiana appellatur in qua neu-
ter humor ab altero superatur. 135.pa.1

F.

Febrem tertianam productā esse semiter-
tiana Agatinus falso existimabit. 135.p.2

Febres quotidianæ in regionibus frigidis
& humidis. 97.pa.1.

Febris essentia in solo cordis calore est. 5.pa.2

Febrem cur non definiuit Gal. 5.pa.1.

Febriū differentia quas tradit Galen. medice
sunt

INDEX.

- sunt non essentielles ex re ipsa. 10.pa.2
- Febriū essētiales differētiās quas dā esse. 11.p.1
- Febris cōtinēs vbi habeat calorē factū.14.p.2
- Febrē putridam semper incipere à diaria ma
le coligunt ex quodam Gal.loco. 16.pa.1
- Falluntur fere omnes enarratores in primi li
bri particione. 19.pa.1.
- Famis nomen quid significet. 29.pa.1
- Facultates naturales quatuor. 149.pa.1.
- Febre quæ naturæ facilius & quæ difficilius ca
pianur. 40.pa.1
- Frigida & sicca natura, non tam melancholi
ca quam pituitosa. 42.pa.2.
- Febris pestilens an semper putrida. 45.pa.2.
- Febres accidentes genere sunt diarie.46.pa.1
- Febres qua ratione distinguantur horrore fri
gore & rigore. 97.pa.2.
- Febris continua fit ex humore putrecente in
tra vasa. 99.pa.1.
- Febrium putridarum & reliquarum differē
tia. 100.pa.1
- Febris continens cum putredine fieri putrecē
te sanguine. 102.pa.2
- Febrium causę. 106.pa.1
- Febris humoralis non est vsq; dū humor pu
trescat. 114.pa.2.
- Febris epiala duplex generatio. 122.pa.2
- Febris epiala & non recelerens rigor cum uni
cant

INDEX.

- cant in materia. 120.pa.1
 Febrem fieri ex sanguine putrecēte nec Gal.
 negat, nec vult illud Auicena. 137.pa.2.
 Febris ex putrefacto sanguine quodāmodo,
 biliosa est. 137.pa.2
 Febris simplex mitis & secura apud Galen. &
 Hippo. 140.pa.1.
 Febres continentes ex sanguine cur euadant
 rarissime in quartanas. 140.pa.1
 Febris ex pituita cur calorem in aequalem re-
 ferat. 171.pa.1.

G.

- G**Raudo sæpe est febris caūsa. 91.pa.2
 Gale. non admodum caute loqui depre-
 henditur. 92.pa.1.
 Gal. pituitam diuidit ex modo substantiæ &
 ex saporibus. 121.pa.1.
 Gal. aliquando ex gradibus siccitatis nunc ex
 roris consupitione accipiunt hecticæ diffe-
 rentias. 121.pa.1
 Gal. non omisit aliquem modū. 76. & 77.pa.1.
 Generationis pituitæ. 122.pa.1.
 Gal. quas vocat quæstiones logicas. 123.pa.1
 Galeni locus enarratur aliter ac solet. 32.pa.1.
 Galeni loca componuntur. 60.pa.2

H

- H**Emitritei duplex duntaxat esse genus.
 135.pa.2.

Hepia-

INDEX.

- Hepialæ febris etimologia. 117.pa.1
 Hepialum quid apud Gal. Ibidem.
 Hippo. Horatio ex sexto epidemiæ exponitur
 7.pag.1.
 Hippo. breuiloquium coniungere consuevit
 dignociones cum differentiis. 20.pa.1
 Horæ æquinotiales sunt horologiales. 107.p.2
 Hippo. solus ante Gale. recte diuisit febres.
 5.pag.1.
 Horror nec proprium nec inseparabile putri-
 da. 57.pa.1.
 Hæcticæ febris differentia. 70.pa.1. & 24.pa.1
 Hæcticam fieri ab initio. Ibidem.
 Hæcticam incipientem per se & à diaria nec
 peritissimū medicum dignoscere indica-
 tur. 79.pa.2.
 Hæctica simul & putrida posse laborare ho-
 minem. 78.pa.2
 Hæcticæ incipientis à principio signa. Ibidem
 Hæcticam nullam sine siccitate esse. 82.pa.2
 Hæcticæ cur incalēcant à cibo. 83.pa.1
 Hæcticis moras modo proxime signa. 86.pa.1
 Hæctica marasmodies quibus morbis soleat
 succedere. 86.pa.2
 Hæctica secundæ speciei fieri potest nō pregre-
 sa prima spe. 86.pa.2.

I.

Inflāma-

INDEX.

I Nflammatas partes vocat omnes laboran-
tes calida fluxione. 38.pa.1.

Iracibilis facultas cedis. 28.pa.1

Ira quid sit. 28.pa.1.

Inequalitas febrilis quid sit. 52.pa.1.

Inequalitas coecliuua non inseparabilis à pu-
trida. 112.pa.1

Inequalitas febrilis propria & inseparabilis.
58.pa.1.

Inequalitas manifesta proprium putridæ non
inseparabilæ. 57.pa.2

Incalescere à cibo proprium & inseparabile
putridarum 52.pa.1

Inclinatio cum sudore aut madore quando
vna die naturaliter facta integritas excipit
vltimum signum & proprium & insepara-
bile diaræ. 53.pa.1

L.

L Assitudinis nomine quid intelligat hic
Gal. 68.pa.1.

Lipirudo quid. 43.pa.2

Librum de typis statim post hunc legi oportet. 129.pa.1

Locus variæ lectionis enarratur. 82.pa.2

Liber de rheumaticis passionibus desidera-
tur. 159.pa.1

M.

Magnū & parū abusiue dicuntur dequali-
bus. 11.pa.2.

INDEX.

- Motus calorem facere. 27.pa.2
 Multa an pauca facilius putrescāt. 31.pa.2
 Marasmus prorsus est inseparabilis & cur.
70.pa.2.
 Marcor naturalis & marcor frigidus & torri-
 dus. 72.pa.1
 Marcorem nec calidum nec frigidū esse non
 posse probatur. 72.pa.2.
 Mors naturalis & sine violentia. 73.pa.1
 Marasmi signanouem. 74.pa.2.
 Methodus agnoscendi hecticam cum putrida
 coniuntam. 86.pa.2
 Melancholia natura calida & sicca. 113.pa.1-
O.
O Phthalmiæ curatio. 153.pa.2
O Oris vetriculi passio ab humore acri aut
 frigido pulsū maxime viciat. 58.p.2
P.
P Ecce in diuisionibus tribus modis con-
 ringit. 4.pa.1.
 Putredo caloris causa. 27.pa.2.
 Putredo nō semper fit ex obstructione. 33.p.2
 Pestilens constitutio quæ sit. 35.pa.1.
 Peste qui facillime & qui difficillime cori-
 pantur. 37.pa.1.
 Propriū quod modis dicatur & eius rationes.
51.pa.1.
 Pulsus magnus & celer cum quiete exter-
 na producta proprium & insepara-

INDEX.

- bile diarijs. 51.pa.2
 Pulsus quietes non fiunt per accidens. 51.pa.2
 Pulsus æqualitas omnimoda proprium & inseparabile diaris. 52.pa.1
 Putridarum signa. 54.pa.2
 Putrida an possit cum diaria componi. 55.p.1
 Pulsus compresus quid sit. 58.pa.1
 Pulsus compresus non accidens ratione alicuius symptomatis est signum proprium putridarum sed non separabile. 58.pa.2
 Pulsus parvus ac velox in principiis accessionū cur fiat. 62.pa.2
 Putridę febres breuiorem habent externam quietem quam alię. 62.pa.2.
 Primas vrinas esse crudas aut obscure coctas proprium & inseparabile putridarum vtrūque seorsum est proprium non tamen inseparabile.
 Pulsus durum non esse inseparabilem à febre, contra Archigenem disputatur.
 67.pa.1.
 Pulsus durus à nullo genere febrium est inseparabilis. 67.pa.1
 Pulsus tertianę exquisitę. 108.pa.2
 Pulsus tertianę simplicis. 111.pa.2
 Prodicus bilem vocabat phlegma. 118.pa.2.
 Plegmatis etimologia. Ibidem.
 Pituitę de quibus succis dicatur. 120.pa.1.
 Pi

INDEX.

- Pituita species. Ibidem.
- Pituita gipsea non est humer. 121.pa.2.
- Pituita dulcis duobus modis. Ibidem.
- Pituita falsa putrefactione fit. 121.pa.2.
- Pituita acida fit incoctione. Ibidem.
- Pituita computrecentia migret in aliam speciem. 123.pa.1.
- Pituita amara cur non fiat bilis permissione. 121.pa.2.
- Pituita acida facit rigorem falsa horrore dulcis. 159.pa.1.
- Parris mittentis & recipientis differentia. 160.pa.1.
- Partes certae in quibusvis generibus frigus febrium solent laborare. 122.pa.2.
- Q**uartana febris quae sit. 112.pa.2.
- Q**uartana cur habet longum intervallum. 113.pa.1.
- Quartanae & tertianae paroxysmi sunt aequales. 113.pa.1.
- Quaestiones logicas quas vocet Gal. 123.pa.1.
- R**igoris mansuetudo quodammodo proprium & inseparabile diariis. 53.pa.1.
- Repetitionis febrium per circuitus causa. 142.pa.1. & 144.
- Rigoris sine febre causa. 116.pa.1.
- Y Ro

INDEX.

- Refutatur opinio putantium omnes putridas
febres fieri ex bile. 96. pa. 1.
Rigoris frigoris & horroris differentia. 88. p. 1.
ἐνυμνασμός quid sit. 62. pa. 1.
Robur ut possit esse causa morbi. 147. pa. 2.

S.

- S**piritus naturā recusat Gal. tradere. 17. p. 1.
Spiritus & aër essentia differre. Ibidem.
Suppuratio qui motus sit. 49. pa. 1.
Suavitas caloris proprium diariæ inseparabi-
le quodammodo. 52. pa. 1.
Signa omnia quæ speciei alicuius sunt propria
sunt etiam propria generis. non tamen quæ
inseparabilia speciei sunt etiam inseparabi-
lia generis. 64. pa. 2.
Senes & pueri cur morbis capiantur pituitosis
96. pa.

- Succi quomodo alterati febres pariāt. 114. p. 1.
Succus crudus qui sit. 118. pa. 1.
Sucus vitreus praxagoræ & crud⁹ Philippi nō
est idem. Ibidem
Semitertianæ quatuor quodammodo differē-
tiæ & earum vnica peculiariter vocatur.
129. pa. 2.

- Semiterciana cur horrida. 129. pa. 2.
Semitertianæ duæ spes. 135. pa. 2.
Sorites seu soritica perplexitas quid sit. 136. p. 1.

T.

Tertia-

INDEX.


T ertiana producta male vocatur semiter- tiana ab Agarino.	136.pa.1.
Tertiana simplex quæ sit.	111.pa.1.
Tertiana exquisita quæ sit.	106.pa.2.
Tertianæ exquisitæ signa.	107.pa.1.
V.	

V aleriola notatur.	140.pa.1.
Vstio & putrefactio vt differant.	115.pa.1.
Vigilia vt siccer.	68.pa.1.
Velocitas contractionis pulsus proprium, & inseparabile signum putridarum.	59.pa.2.

FINIS.

COMPLVTI.

Excudebat Andreas de Angulo.
Anno. 1569.



Errata.

¶ Fol. 54. fac. 2. lin. 4. initium leg. inditiū fo. 59
 fac. 1. lin. 24. mentisnem leg. mentionem. fol.
 60. fac. 2. li. 7. quæ, le. q; fol. 63. fa. 1. li. 2. & le.
 est. ibidem li. 3. abest le. adest. ibidē lin. 5. pro-
 prium leg. inseparabile. fo. 67. fa. 1. li. 7. empo-
 re leg. tempore, fo. 72. fa. 2. li. 18. solutus le. soli-
 tus, fol. 73. fa. 1. lin. 4. quic, le. q; fo. 78. fa. 2. li. 2.
 putra, leg. putrida. fo. 79. fa. 1. li. 9. dicere. leg.
 discere. Ibidem, li. 17. inquā leg. inq; fo. 87. fa.
 1. lin. 14. opportunus, leg. opportune, fol. 104.
 fa. 2. lin. 7. declabitur, leg. declarabitur, fo. 114.
 fac. 2. li. 10. herpate, le. herpete, fo. 117. fac. 2. li.
 17. lypiria, leg. epiala. fol. 122. fac. 1. lin. 12. duli,
 leg. dulci, fol. 128. fac. 2. lin. 24. haud quaq; , le.
 haud quaquā, fo. 137. fac. 1. lin. 5. fractus, lege.
 farctus.





